

Investigation of Genotype Variation of Damask Rose (*Rosa damascena* Mill.) in Iran Based on the Rate of Essence and some Morphologic and Physiologic Traits

B. Kaviani^{1*}, R. Mohammadipour¹, D. Hashemabadi¹, M.H. Ansari², R. Onsinejad¹, A.R. Berimavandi²

1- Department of Horticultural Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2- Department of Agronomy and Plant Breeding, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

(*- Corresponding author's Email: behzad.kaviani@iau.ac.ir)

Received: 29 April 2022

Revised: 19 July 2022

Accepted: 26 July 2022

Available Online: 26 July 2022

How to cite this article:

Kaviani, B., Mohammadipour, R., Hashemabadi, D., Ansari, M.H., Onsinejad, R., & Berimavandi, A.R. (2025). Investigation of genotype variation of damask rose (*Rosa damascena* Mill.) in Iran based on the rate of essence and some morphologic and physiologic traits. *Journal of Horticultural Science*, 39(3), 359-372. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22067/jhs.2022.76452.1167>

Introduction

Damask rose (*Rosa damascena* Mill.) is used as a multi-purpose species. The flower essential oil of this plant has many applications in various industries. There is a wide variety of morphological, phonological, flower shape, yield and yield of essential oils among genotypes and different populations of Damask rose in various ecological conditions in Iran. Evaluation of genetic diversity among Damask rose of Iran is important in order for breeding purposes. Some studies on phenotype, essential oil and genetic diversity were also carried out among different cultivars of rose flowers in other parts of the world. Significant diversity has been reported among the populations and genotypes of rose in different ecological conditions for many traits. Identifying superior species, cultivars and populations is important for commercial cultivation and more essential oil production. It is difficult to understand genetic diversity in roses because natural hybridization and spontaneous mutations with high abundance occurs in this plant. Morphological differences can be due to the geographical coordinates, natural hybridization and mutations. The purpose of this study was to investigate and compare the genetic variety of Damask rose in Guilan, Ilam, Golestan, Tehran and Kashan in order to introduce superior genotype based on essence content and some other morphological and physiological traits.

Materials and Methods

Five genotypes of Damask rose including Kashan, Ilam, Golestan, Tehran and Guilan genotypes were evaluated as plant materials. Plant materials were collected from mentioned-above regions as root-sucker and transferred to the farm of Research Institute of Forests and Rangelands of the country. The experimental design used was a completely randomized block, which was performed with 3 replications and was considered for each 5-suckers' repetition (total: 75 suckers). In each replication, three specimens of each genotype were planted in pits with diameter and depth of 50-60 cm. The distance between scions per rows was 2.5 meters and row spacing from each other was 2 meters. During the experimental period, the bushes were irrigated using drip (trickle) irrigation method. The sampling was performed to measure morphological and physiological parameters after the blooms were opened in early May. Evaluated parameters were plant height, leaf length, leaf width, leaf area, petal number, stamen number, carpel number, fresh weight of petals, petal anthocyanin levels, petals essential oil



©2022 The author(s). This is an open access article distributed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/10.22067/jhs.2022.76452.1167>

levels, chlorophyll content and leaf carotenoids. Data were analyzed by ANOVA and, if significant, Tukey analysis was used. SPSS software was employed for statistical analysis.

Results and Discussion

The results showed that the highest amount of essential oil (0.042 and 0.038%) was extracted from the petals of Ilam and Kashan genotypes, respectively. The highest petal weight (2.70 and 2.30 g) was related to the petals of Ilam and Kashan genotypes, respectively. The highest petal length and width were obtained in these two genotypes. The largest number of petals (71.80 per each plant) was related to Guilan samples. The highest amount of chlorophyll a was related to Ilam genotype and the highest amount of chlorophyll b, carotenoids and anthocyanin was related to Kashan genotype. In the present study, rose flower genotypes collected from different parts of Iran showed significant diversity in relation to morphological and physiological properties, especially essence. The results of the present study showed that there was a significant correlation between the amount of essence in the petals and the weight and dimensions of the petals. Similar findings related to the correlation between flower yield and its components in roses flowers were presented in some studies. Some studies have shown that the weight of the flower has a very strong, positive and significant correlation with the flower yield. Despite the geographical distance between some genotypes, the high similarity coefficient between them may indicate the common origin or continuous and purposeful genotypes. On the other hand, the low similarity coefficient between genotypes proposes relatively low geographical connection and different primary origin. In the present study, there was a low correlation between the amount of essence in the petals and the weight and dimensions of the petals in the Ilam and Kashan genotypes with the Golestan and Guilan genotypes. Generative traits, including flower characteristics, are more suitable for genetic and evolutionary evaluations than vegetative traits. The results of some researchers in Iran and elsewhere in the world showed that flower yield per plant is associated with some other traits, including flower number, dimensions and weight of flowers, and the number of branches in the plant. The genetic analysis of rose flower genotypes showed that some genotypes collected from different areas are genetically relevant and some are separate. This subject shows effective role of ecological conditions in changing and variability of different species and varieties. The results indicated that the difference in the amount of essential oil compounds is mostly influenced by environmental and physiological factors.

Conclusion

The morphological differences observed among the flower genotypes indicate the presence of valuable germplasm and a strong potential for trait improvement. These differences also demonstrate the feasibility of selecting superior genotypes using morphological markers to enhance flower yield within the country. Overall, the Ilam and Kashan genotypes are recommended as promising candidates for use in breeding programs.

Acknowledgement

We thank Islamic Azad University, Rasht Branch for its assistance.

Keyword: Essential oils, Flower yield, Genetic variation, Rosaceae family, *Rosa damascena* Mill.

بررسی تنوع ژنوتیپی گل محمدی (*Rosa damascena* Mill.) در ایران براساس میزان اسانس و برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک

بهزاد کاویانی^{۱*} - رعنا محمدی پور^۱ - داود هاشم آبادی^۱ - محمدحسین انصاری^۲ - رسول انسی نژاد^۱

احمدرضا بریموندی^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

چکیده

گل محمدی (*Rosa damascena* Mill.) به عنوان یک گونه گیاهی چند منظوره (خوراکی، دارویی، معطره و زینتی)، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و اسانس گل این گیاه کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارد. تنوع گسترده‌ای از نظر عملکرد گل و اسانس در بین ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی در شرایط متفاوت بوم‌شناختی در ایران مشاهده شده است. ارزیابی تنوع ژنتیکی در میان گل‌های محمدی ایران به منظور اصلاح ژنوتیپ‌های این گل‌ها با ویژگی‌های باغی مناسب حائز اهمیت زیادی است. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های جمع‌آوری شده از استان‌های گیلان، ایلام، گلستان، تهران و کاشان به منظور معرفی ژنوتیپ برتر و بهره‌برداری از آن در برنامه‌های اصلاحی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد و برای هر تکرار ۵ پاجوش در نظر گرفته شد. نمونه‌ها از نظر عملکرد اسانس، تعداد حلقه‌های مختلف گل و ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه‌برداری برای اندازه‌گیری شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک، بعد از باز شدن غنچه‌های گل در اوایل اردیبهشت ماه انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان اسانس (۰/۰۴۲ و ۰/۰۳۸ درصد)، به ترتیب از گلبرگ‌های ژنوتیپ‌های آیلام و کاشان به دست آمد. بیشترین وزن گلبرگ (۲/۷۰ و ۲/۳۰ گرم)، به ترتیب مربوط به گلبرگ‌های ژنوتیپ‌های آیلام و کاشان بود. بالاترین طول و عرض گلبرگ نیز در این دو ژنوتیپ به دست آمد. بیشترین تعداد گلبرگ (۷۱/۸۰ در هر بوته) مربوط به نمونه‌های گیلان بود. بالاترین میزان کلروفیل a، مربوط به ژنوتیپ آیلام و بالاترین میزان کلروفیل b، کاروتنوئید و آنتوسیانین، مربوط به ژنوتیپ کاشان بود. در مجموع، ژنوتیپ‌های آیلام و کاشان به دلیل عملکرد بالا در تولید اسانس و اغلب صفات ریخت‌شناختی و فیزیولوژیکی به عنوان ژنوتیپ‌های برتر و ذخایر توارثی مناسب برای برنامه‌های اصلاحی پیشنهاد می‌شوند. گسترش رویشگاه‌های گل محمدی اطلاعات مفیدی را برای تولید انبوه در آینده و مدیریت منابع ژنتیکی فراهم می‌نماید.

واژه‌های کلیدی: اسانس‌ها، تنوع ژنتیکی، خانواده گل سرخ، عملکرد گل، *Rosa damascena* Mill.

مقدمه

بسیاری از کشورها از جمله ایران، بلغارستان، ترکیه و هندوستان و در شرایط اقلیمی مختلف کشت می‌شود. این گونه حاصل دورگ‌گیری *R. gallica* و *R. phoenicea* است (Kumar Pal, 2013). تنوع گسترده‌ای از نظر صفات مورفولوژیک، فنولوژیک، عملکرد گل، بازده و عملکرد اسانس در بین ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی در ایران وجود دارد. شناسایی ژنوتیپ‌های برتر براساس مقایسه صفات فوق برای تولید اسانس بیشتر با کیفیت بهتر، همچنین برای برنامه‌های اصلاحی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با تکیه بر مقایسه این صفات در ژنوتیپ‌های گل محمدی در پنج استان، مبادرت به معرفی ژنوتیپ‌های برتر به منظور بهبود کمیت و کیفیت این گونه کرده است.

گل محمدی (*Rosa damascena* Mill.)، از خانواده گل سرخیان (Rosaceae)، یکی از مهم‌ترین گونه‌های جنس *Rosa* با ارزش زینتی، دارویی، خوراکی و بهداشتی-آرایشی است که به منظور تولید روغن‌های ضروری (اسانس‌ها) استفاده می‌شود. این گونه در

۱- گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

۲- گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

(*) نویسنده مسئول: Email: behzad.kaviani@iau.ac.ir

<https://doi.org/10.22067/jhs.2022.76452.1167>

جنس *Rosa* به‌طور طبیعی در سراسر نواحی معتدله نیمکره شمالی گسترش یافته است (Kumar Pal, 2013). از گل محمدی، به‌عنوان گل ملی ایران نام برده می‌شود. از این جنس، ۱۴ گونه اصلی، هشت دورگ و سه گونه مشکوک در ایران گزارش شده است (Yousefi et al., 2021). از نظر عادت گل‌دهی، دو نوع تابستانه و پاییزه وجود دارد (Pirseyedi et al., 2005). انواع تابستانه به‌دلیل داشتن اسانس بیشتر با عطر قوی‌تر، در باغ‌های تجاری رز در مناطق مختلف ایران کشت می‌شوند. اسانس این گل خاصیت آنتی‌اکسیدان دارد (Yousefi, 2019). با توجه به اهمیت این گونه، سطح زیر کشت آن در ایران افزایش روزافزونی پیدا کرده است (Sefidkon, 2017). تنوع قابل توجهی در بین جمعیت‌های گل محمدی در شرایط مختلف اکولوژیک برای برخی صفات از جمله صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد و اسانس وجود دارد (Tabaei-Aghdaei et al., 2005; Yousefi, 2019). عملکرد گل تحت کنترل تعدادی ژن قرار دارد و عوامل محیطی روی آن تأثیرگذار است. شناسایی اجزای عملکرد و تنوع موجود می‌تواند مبنای گزینش ژنوتیپ‌های برتر از نظر عملکرد گل و اسانس باشد (Haghi Kashani et al., 2012).

سه نوع نشانگر برای ارزیابی تفاوت‌ها و شباهت‌ها بین افراد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد: نشانگرهای مورفولوژیک (فنوتیپی)، نشانگرهای بیوشیمیایی (پروتئین‌ها به‌ویژه آیزوایم‌ها) و نشانگرهای مولکولی (DNA). برخی پژوهش‌ها در زمینه بررسی تنوع ژنتیکی گل محمدی با استفاده از عملکرد گل و نشانگرهای مورفولوژیک در مناطق مختلف ایران انجام شده است (Kodori & Tabaei-Aghdaei, 2007; Haghi Kashani et al., 2012; Yousefi, 2019). بررسی تنوع در ترکیب شیمیایی اسانس ۲۵ ژنوتیپ گل محمدی کشت‌شده در استان کرمانشاه نشان داد که براساس چهار روند متفاوت برای این ترکیب‌های شیمیایی، ژنوتیپ‌ها نیز در چهار گروه قرار می‌گیرند (Yousefi et al., 2016). در پژوهشی، اسانس نمونه‌های مختلف گل محمدی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل بیانگر وجود تنوع در ترکیب‌های اسانس نواحی مختلف بود (Jaymand et al., 2004). نتایج بررسی نمونه‌های جمع‌آوری‌شده این گل از نقاط مختلف کشور نشان از وجود تنوع در صفات ریخت‌شناختی و عملکردی و نوع اسانس داشت (Tabaei-Aghdaei et al., 2005). مطالعه روی ۲۶ ژنوتیپ گل محمدی جمع‌آوری‌شده از استان‌های کرمان، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نشان داد که ۱۴ ژنوتیپ در یک گروه واحد قرار دارند. این موضوع نشان‌دهنده نزدیکی ژنتیکی آن‌ها به یکدیگر است (Kiani et al., 2010). شناسایی ژنوتیپ‌های گل محمدی در منطقه کاشان با مقایسه صفات مورفولوژیک نشان داد که این ژنوتیپ‌ها خصوصیات مورفولوژیک یکسان دارند (Davazdah-

Emami, 2002). از طرف دیگر، مقایسه این ژنوتیپ‌ها در سطح وسیع‌تری از کشور با استفاده از پنج صفت مورفولوژیک تنوع این صفات را نشان داد (Tabaei-Aghdaei et al., 2007). مطالعه روی ۳۷ ژنوتیپ غیربومی و ۱۲ ژنوتیپ بومی گل محمدی استان کردستان نشان داد که عوامل بوم‌شناختی تأثیر معنی‌داری بر خصوصیات گل و اسانس دارد. در ادامه این تحقیقات، نتایج بررسی عملکرد گل و اجزای آن در ۱۲ ژنوتیپ محلی گل محمدی استان کردستان نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها تفاوت‌های معنی‌داری وجود دارد (Yousefi, 2019). در ژنوتیپ‌های مختلف استان کرمان، اختلاف معنی‌داری از نظر عملکرد و اجزای عملکرد گل مشاهده شد (Kodori & Tabaei-Aghdaei, 2007). در چندین پژوهش مختلف، تنوع زیادی از نظر بازده و عملکرد اسانس در نمونه‌های مختلف گل محمدی گزارش شد (Batooli & Safaie-Ghomi, 2012; Yousefi & Jaimand, 2019; Yousefi, 2018). بنابراین، به نظر می‌رسد که موقعیت جغرافیایی و بوم‌شناختی و شرایط آب‌وهوایی نقش مؤثری در تنوع ژنتیکی گیاهان دارند و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات اصلاحی باشد.

برخی مطالعات روی تنوع فنوتیپ، تنوع اسانس و تنوع ژنتیکی در میان ارقام مختلف این گل در سایر نقاط جهان نیز انجام شده است (Rusanov et al., 2013). بررسی خصوصیات گل ژنوتیپ‌های مختلف رز (*Rosa alba* L.) در مرکز پژوهش رزها در بلغارستان، حضور دو فنوتیپ مجزا را آشکار کرد که به‌طور معنی‌داری از نظر ویژگی‌های گل از جمله وزن گل و تعداد گلبرگ متفاوت بودند (Rusanov et al., 2013). نتایج اغلب این مطالعات نشان داد که ژنوتیپ‌های مختلف، صفات فنوتیپی (به‌ویژه وزن گل، تعداد گلبرگ و مقدار و اجزای تشکیل‌دهنده اسانس) متفاوتی داشتند. همچنین، تنوع قابل توجهی در بین جمعیت‌ها و ژنوتیپ‌های گل محمدی در شرایط مختلف بوم‌شناختی ایران از نظر بسیاری از صفات از جمله خصوصیات و عملکرد گل و نیز مقدار اسانس گزارش شده است. شناسایی گونه‌ها، ارقام و جمعیت‌های برتر به‌منظور کشت تجاری و تولید اسانس بیشتر، حائز اهمیت است.

تنوع ژنتیکی، ویژگی یک جمعیت است که در آن افراد، صفات ژنتیکی مختلفی را نشان می‌دهند. درک تنوع ژنتیکی در جنس رز به‌دلیل دورگ‌گیری‌های طبیعی و جهش‌های خودبخودی مشکل است. از آنجایی که گل‌های محمدی ایران برخی تنوع‌های مورفولوژیک را نشان می‌دهند، مشخص نیست که منشأ مواد گیاهی از چه تعداد ژنوتیپ مشتق می‌شود. این تفاوت‌ها می‌تواند ناشی از مختصات جغرافیایی محل رویش آن‌ها باشد یا می‌تواند حاصل دورگ‌گیری‌های طبیعی و جهش‌ها باشد. بنابراین، مشخص شدن

نگهداری شدند. سپس محلول با سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ گردید. محلول رویی جدا گردید و میزان جذب در طول موج ۵۵۰ نانومتر اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد.

(۱)

$$100 \times \frac{e \times b \times c}{d \times a} = \text{آنتوسیانین (میلی گرم بر 100 گرم وزن خشک)}$$
 که در آن، e: وزن نمونه، b: اندازه نمونه، c: محلول کل، d: حجم نمونه برداشته شده و a: عدد قرائت شده توسط اسپکتروفتومتر هستند.

میزان اسانس گلبرگ

از دستگاه کلونجر با روش تقطیر با آب برای اندازه گیری میزان اسانس یا روغن های ضروری گلبرگ ها استفاده شد. در هر تکرار، تعداد ۱۰ گل انتخاب گردیدند.

میزان کلروفیل و کاروتنوئید برگ

از هر تکرار، سه برگ به طور تصادفی انتخاب شدند و مقدار کلروفیل آن ها با استفاده از کلروفیل متر و مقدار کاروتنوئید از طریق روش ول بورن (Lichtenthaler & Buschmann, 2001) به دست آمد. مقدار ۰/۰۵ گرم از بافت تازه برگ در هاون چینی قرار داده شد و با استفاده از ازت مایع کاملاً ساییده شد. مقدار ۲۰ میلی لیتر استون ۸۰ درصد نیز به آن اضافه گردید. محلول حاصل با سرعت ۶۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شد. محلول با کاغذ صافی صاف گردید و با آب مقطر به حجم ۲۰ میلی لیتر رسانده شد. سپس مقداری از محلول داخل بالن قرار گرفت و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر به طور جداگانه در طول موج های ۶۶۳ نانومتر برای کلروفیل a، طول موج ۶۴۵ نانومتر برای کلروفیل b و طول موج ۴۷۰ نانومتر برای کاروتنوئید قرائت شد.

(۲)
$$\text{کلروفیل (میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ)} = 7.18 \times A_{663} + 17.32 \times A_{645}$$
 مقدار کلروفیل خوانده شده توسط دستگاه کلروفیل متر با استفاده از معادله ۳ به میزان واقعی تبدیل گردید.

(۳)
$$\text{کلروفیل (میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ)} = 0.1751 \times \text{عدد خوانده شده توسط کلروفیل متر} + 4.69 \times A_{660} - 0.268 \times (20.2) A_{645} + (8.02) A_{665}$$

اجزاء گل

در پایان زمان گل دهی، از هر بوته، سه گل به طور تصادفی انتخاب شدند و تعداد گلبرگ های آن ها شمارش شد. میانگین گلبرگ هر سه گل به عنوان تعداد گلبرگ در یک تکرار در نظر گرفته شد.

تنوع ژنتیکی در میان گل های محمدی ایران به منظور اصلاح ژنوتیپ های این گل ها با ویژگی های باغی مناسب اهمیت زیادی دارد. بررسی منابع آشکار کرد که گزارشی در ارتباط با مقایسه ژنوتیپی گل محمدی در پنج استان گیلان، ایلام، گلستان، تهران و کاشان وجود ندارد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه تنوع ژنوتیپی گل محمدی در این استان ها به منظور معرفی ژنوتیپ برتر و بهره برداری از آن در برنامه های اصلاحی و اقتصادی، براساس میزان اسانس و برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دیگر بود.

مواد و روش ها

مواد گیاهی و طرح آزمایشی

تعداد پنج ژنوتیپ گل محمدی شامل ژنوتیپ های کاشان، ایلام، گلستان، تهران و گیلان به عنوان مواد گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مواد گیاهی به صورت پاجوش در اواخر پاییز از مناطق فوق جمع آوری شدند و به مزرعه مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور (۱۵ کیلومتری شمال غربی تهران با طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۱۰ دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۴ دقیقه شمالی و ارتفاع ۱۳۲۰ متر از سطح دریا) منتقل گردید. طرح مورد استفاده، طرح بلوک های کاملاً تصادفی بود که در سه تکرار اجرا شد و برای هر تکرار پنج پاجوش (در مجموع: ۷۵ پاجوش) در نظر گرفته شد. نحوه کاشت ژنوتیپ ها به صورتی بود که در هر تکرار، سه نهال از هر نمونه در داخل چاله هایی با قطر و عمق ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر کاشته شدند. فاصله بین نهال ها در هر ردیف، ۲/۵ متر و فاصله ردیف ها از یکدیگر، دو متر در نظر گرفته شد. در طول دوره آزمایش، بوته ها با استفاده از روش قطره ای، آبیاری شدند. عملیات داشت شامل وجین علف های هرز در مواقع لازم انجام شد. بعد از باز شدن غنچه ها در اوایل خرداد ماه، نمونه برداری برای اندازه گیری شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک صورت گرفت.

اندازه گیری شاخص ها

وزن تر گلبرگ

گلبرگ ها بعد از باز شدن گل در هر بوته، جدا شدند و وزن تر آن ها با استفاده از ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد.

میزان آنتوسیانین گلبرگ

آنتوسیانین گلبرگ ها به روش ونگر (Timberlake, 1980) اندازه گیری شد. یک گرم از بافت تازه گلبرگ با ۱۰ میلی لیتر متانول اسیدی به خوبی ساییده شد و عصاره حاصل به لوله آزمایش منتقل گردید و درب آن بسته شد. لوله ها به مدت ۲۴ ساعت در تاریکی

تعداد پرچم و برچه هر گل شمارش گردید و میانگین تعداد سه پرچم و برچه به عنوان تعداد اجزاء گل هر تکرار تعیین شد.

ارتفاع بوته

در پایان دوره رشد، در ابتدای خرداد، اندازه هر بوته از کف شاخه اصلی تا انتهای بوته اندازه گیری شد.

طول، عرض و سطح برگ

از هر تکرار، به طور تصادفی شش برگ از سه نقطه متفاوت از بوته‌های هر تکرار انتخاب شدند و طول، عرض و سطح آن‌ها اندازه‌گیری و میانگین گرفته شد. برای اندازه‌گیری طول و عرض برگ از خطکش و برای اندازه‌گیری سطح برگ از سطح‌برگ‌سنج استفاده شد.

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه واریانس داده‌ها به وسیله آزمون ANOVA انجام شد و در صورت معنی‌دار بودن، از آزمون توکی برای مقایسه میانگین داده‌های معنی‌دار استفاده شد. برای تحلیل آماری از برنامه نرم‌افزاری SPSS استفاده شد. به منظور گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها از تجزیه خوشه‌ای (آنالیز کلاستر) با استفاده از نرم‌افزار SAS به روش Ward انجام شد.

نتایج

نتایج تجزیه واریانس (جدول ۱)، بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار بین ژنوتیپ‌های مورد مقایسه از نظر همه صفات مورد مطالعه بود. بر این اساس، بین ژنوتیپ‌های گل محمدی مورد بررسی از لحاظ صفات تعداد گلبرگ، وزن گلبرگ، طول گلبرگ، عرض گلبرگ، ارتفاع بوته، طول برگ، سطح برگ، تعداد پرچم، تعداد برچه، میزان اسانس گلبرگ، مقدار کلروفیل برگ، مقدار کاروتنوئید برگ و مقدار آنتوسیانین گلبرگ، اختلاف معنی‌داری ($p \leq 0.01$) مشاهده شد.

تعداد، وزن، طول و عرض گلبرگ

بیشترین تعداد گلبرگ (۷۱/۸۰) در ژنوتیپ گیلان و کمترین تعداد آن (۳۴/۶۰) در ژنوتیپ تهران شمارش شد (جدول ۲). بین تعداد گلبرگ در ژنوتیپ‌های آیلام و گلستان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بیشترین وزن گلبرگ (۲/۷۰ گرم)، طول گلبرگ (۳/۸۰ سانتی‌متر) و عرض گلبرگ (۳/۹۰ سانتی‌متر) از ژنوتیپ آیلام به دست آمد. کمترین وزن گلبرگ (۱/۳۰ گرم) نیز از ژنوتیپ گلستان حاصل شد. طول گلبرگ (۳/۳۰ سانتی‌متر) در ژنوتیپ کاشان نیز بالا بود. کمترین طول گلبرگ (۲/۳۰ سانتی‌متر) و عرض گلبرگ (۱/۹۰ سانتی‌متر) در ژنوتیپ گیلان اندازه‌گیری شد. بین ژنوتیپ‌های تهران،

کاشان و گلستان از نظر شاخص عرض گلبرگ تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (جدول ۱ و ۲). جدول همبستگی بین صفات مختلف (جدول ۳) نشان داد که تعداد گلبرگ با ارتفاع بوته، سطح برگ، عرض گلبرگ و وزن گلبرگ همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌داری ($p \leq 0.01$) داشت. همبستگی این صفت با کلروفیل a و b و تعداد برچه قوی، مثبت و معنی‌دار ($p \leq 0.05$) بود. وزن گلبرگ نیز با سطح برگ و عرض گلبرگ همبستگی مثبت را نشان داد. عرض گلبرگ با ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن گلبرگ، تعداد گلبرگ و اسانس گلبرگ همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌داری داشت. همچنین طول گلبرگ با طول برگ و تعداد پرچم همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌داری نشان داد. همبستگی بین طول گلبرگ با کلروفیل a و آنتوسیانین گلبرگ نیز قوی، مثبت و معنی‌دار بود.

ارتفاع بوته و طول و سطح برگ

ارتفاع بوته (۱۵۲ و ۱۴۸ سانتی‌متر)، به ترتیب در ژنوتیپ‌های آیلام و گلستان بالاتر از بقیه ژنوتیپ‌ها بود. ارتفاع بوته (۹۲ سانتی‌متر) در ژنوتیپ تهران پایین‌تر از بقیه ژنوتیپ‌ها بود (جدول ۲). بالاترین طول برگ (۱۴/۲۰ سانتی‌متر) در ژنوتیپ تهران و بالاترین سطح برگ (۶۸/۷۰ میلی‌متر) در ژنوتیپ آیلام مشاهده شد. ژنوتیپ گیلان با طول برگ ۹/۸۰ سانتی‌متر و سطح برگ ۴۲/۷۰ میلی‌متر، کمترین طول و سطح را بین ژنوتیپ‌های مختلف داشت (جدول ۲). ارتفاع بوته با کلروفیل a، طول برگ، آنتوسیانین گلبرگ، عرض گلبرگ و تعداد گلبرگ همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌داری داشت. همچنین طول برگ با کلروفیل a و b، ارتفاع بوته، طول گلبرگ، آنتوسیانین گلبرگ، تعداد پرچم و تعداد برچه همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌داری داشت. همچنین همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌داری بین سطح برگ با وزن گلبرگ، تعداد گلبرگ و عرض گلبرگ مشاهده شد (جدول ۳).

تعداد پرچم و برچه

تعداد پرچم (۵۲/۶۰) و تعداد برچه (۴۳/۸۰) در ژنوتیپ گیلان کمتر از بقیه ژنوتیپ‌ها بود. از طرف دیگر، بیشترین تعداد پرچم (۱۱۰/۷۰) و برچه (۹۳/۵۰)، به ترتیب در ژنوتیپ‌های گلستان و تهران شمارش گردید (جدول ۲). همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌داری بین تعداد پرچم با طول گلبرگ و برگ مشاهده شد. همبستگی بین تعداد پرچم با کلروفیل a نیز مثبت و معنی‌دار بود (جدول ۳). این جدول همچنین نشان می‌دهد که همبستگی بین تعداد برچه با کلروفیل a و b، طول برگ، آنتوسیانین گلبرگ و تعداد گلبرگ بسیار قوی، مثبت و معنی‌دار بود.

جدول ۱- تجزیه واریانس برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی
Table 1-The ANOVA of some morphological and biochemical traits for different Damask rose genotypes

منبع تغییرات S.O.V	درجه آزادی df	میانگین مربعات Mean squares													
		کاروتنوئید Carotenoid	کلروفیل b Chl. b	کلروفیل a Chl. a	طول برگ Leaf length	ارتفاع بوته Plant height	اسانس گلبرگی Petal essential oil	آنتوسیانین گلبرگی Petal anthocyanin	سطح برگی Leaf area	تعداد پرچه Pistil number	تعداد پرچم Stamen number	عرض گلبرگی Petal width	طول گلبرگی Petal length	وزن گلبرگی Petal weight	تعداد گلبرگی Petal number
ژنوتیپ Genotype	4	6.19**	15.40**	21.80**	212.05**	962.10**	0.80**	0.31**	300.10**	1294.30**	14.82**	1.75**	65.50**	2.08**	614.60**
خطا Error	10	0.052	1.33	0.806	1.55	20.8	0.00006	0.0079	10.71	16.05	1.003	0.089	0.604	0.022	1.001
ضریب تغییرات CV (%)	-	1.67	9.44	3.75	10.29	3.69	22.91	9.68	5.74	6.76	1.11	11.25	24.84	7.60	2.08

** معنی دار در سطح احتمال ۰/۰۱

** : Significant at the 0.01 probability level

جدول ۲- برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در ژنوتیپهای مختلف گل محمدی
Table 2- Some morphological and biochemical traits for different Damask rose genotypes

ژنوتیپ Genotype	کاروتنوئید Carotenoid ($\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$)	کلروفیل b Chlorophyll b ($\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$)	کلروفیل a Chlorophyll a ($\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$)	طول برگ Leaf length (cm)	ارتفاع بوته Scion height (cm)	اسانس گلبرگ Petal essential oil (%)	آنتوسیانین گلبرگ Petal anthocyanin ($\mu\text{M}\cdot\text{g}^{-1}$)	سطح برگ Leaf area (mm)	تعداد برچه Pistil number	تعداد پرچم Stamen number	عرض گلبرگ Petal width (cm)	طول گلبرگ Petal length (cm)	وزن گلبرگ Petal weight (g)	تعداد گلبرگ Petal number
ایلام Ilam	13.04b*	9.50c	25.42a	10.00c	152.00a	0.042a	0.50c	68.70a	58.58b	95.40c	3.90a	3.80a	2.70a	42.65c
گلستان Golestan	13.05b	11.55b	24.56ab	12.70b	148.00a	0.024c	0.48c	55.40c	55.54b	110.70a	2.55ab	3.14ab	1.30b	40.60c
گیلان Guilan	12.34c	11.90b	23.77b	9.80c	120.00b	0.031b	0.78b	42.70d	43.80c	52.60d	1.90b	2.30b	1.50b	71.80a
تهران Tehran	13.64ab	12.65b	22.80d	14.20a	92.00d	0.034ab	1.03a	60.60b	93.50a	93.20c	2.40ab	3.10ab	1.95ab	34.60d
کاشان Kashan	15.98a	15.69a	23.00c	12.80b	105.00c	0.038a	1.21a	57.20c	44.90c	100.10b	2.50ab	3.30a	2.30ab	50.54b

* در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف همسان نیستند، در سطح احتمال ۵ درصد آزمون توکی، تفاوت معنی‌دار دارند.
* Means with different letters on the same column are significantly different ($p < 0.05$) based on Tukey test.

جدول ۳- همبستگی بین صفات اندازه‌گیری شده گل محمدی
Table 3- The correlation between measured traits of *Rosa damascena* Mill.

کاروتنوئید Carotenoid	کلروفیل b Chlorophyll b	کلروفیل a Chlorophyll a	طول برگ Leaf length	ارتفاع بوته Scion height	اسانس گلبرگ Petal essential oil	گلبرگ Petal anthocyanin	سطح برگ Leaf area	تعداد پرچه Pistil number	تعداد پرچم Stamen number	عرض گلبرگ Petal width	طول گلبرگ Petal length	وزن گلبرگ Petal weight	تعداد گلبرگ Petal number
1.000													
Carotenoid													
-0.273	1.000												
Chlorophyll b													
-0.723**	0.751**	1.000											
Chlorophyll a													
-0.484**	0.755**	0.895**	1.000										
Leaf length													
ارتفاع بوته													
-0.850**	0.216	0.761**	0.460**	1.000									
Scion height													
اسانس گلبرگ													
-0.712**	0.083	0.203	0.078	0.258	1.000								
Petal essential oil													
آنتوسیانین گلبرگ													
-0.803**	0.755**	0.961**	0.873**	0.690**	0.421*	1.000							
Petal anthocyanin													
سطح برگ													
0.078	0.184	-0.180	-0.466**	-0.092	0.142	-0.148	1.000						
Leaf area													
تعداد پرچه													
-0.076	0.970**	0.568**	0.618**	-0.018	0.037	0.590**	0.283	1.000					
Pistil number													
تعداد پرچم													
-0.028	0.009	0.353*	0.594**	0.217	-0.410*	0.229	0.922*	-0.112	1.000				
Stamen number													
-0.669**	-0.156	0.135	-0.278	0.594**	0.622**	0.206	0.507*	-0.252	-0.576**	1.000			
عرض گلبرگ													
Petal width													
-0.058	0.182	0.429*	0.719**	0.145	-0.297	0.350*	0.915*	0.079	0.968**	-0.646**	1.000		
طول گلبرگ													
Petal length													
وزن گلبرگ													
0.115	-0.048	-0.203	-0.556**	0.099	-0.142	-0.282	0.886*	-0.003	-0.723**	0.546**	-0.828**	1.000	
Petal weight													
-0.215	0.417*	0.353*	-0.016	0.457**	-0.096	0.245	0.750*	0.372*	-0.477**	0.511**	-0.528**	0.839**	1.000
تعداد گلبرگ													
Petal number													

** و * : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۰/۰۱ و ۰/۰۵.
** and * : Significant at the 0.01 and 0.05 probability level, respectively

اسانس گلبرگ

آنتوسیانین، ارتفاع بوته، تعداد گلبرگ و تعداد برچه در مقایسه با سایر گروه‌ها به هم نزدیک‌تر بودند. ژنوتیپ گروه دوم از نظر شاخص‌های تعداد پرچم، تعداد گلبرگ طول گلبرگ، عرض گلبرگ نسبت به گروه‌های اول و سوم متمایز بود. این تمایز در اغلب این شاخص‌ها کاملاً معنی‌دار است. ژنوتیپ‌های گروه سوم از نظر شاخص‌های میزان اسانس گلبرگ، میزان کلروفیل b، کاروتنوئید، میزان آنتوسیانین، وزن گلبرگ، عرض گلبرگ، طول برگ و سطح برگ در مقایسه با سایر گروه‌ها به هم نزدیک‌تر بودند.

بحث


پنج ژنوتیپ گل محمدی براساس صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک با یکدیگر مقایسه شدند. صفات مورفولوژیک به‌میزان بالایی به شرایط محیطی وابسته هستند، اما صفات فیزیولوژیک کمتر تحت تأثیر محیط قرار می‌گیرند. ترکیب این صفات انتخاب ژنوتیپ‌های برتر را قابل اعتمادتر می‌کند. در پژوهش حاضر، ژنوتیپ‌های گل محمدی جمع‌آوری شده از نواحی مختلف ایران، تنوع قابل توجهی را در ارتباط با ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌ویژه مقدار اسانس نشان دادند. گل، ارزشمندترین اندام گیاهی در برنامه‌های به‌نژادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقدار اسانس در گلبرگ‌های ژنوتیپ‌های آیلام و کاشان بیشتر از سایر ژنوتیپ‌ها بود. این دو ژنوتیپ همچنین از وزن و ابعاد گلبرگ بالاتری برخوردار بودند. یافته‌های مشابه در ارتباط با همبستگی بین عملکرد گل و اجزاء آن در گل محمدی در برخی مطالعات مشاهده گردید (Kodori & Tabaei-Aghdaei, 2007; Yousefi & Jaimand, 2019; Yousefi, 2018). تعداد گل در بوته، وزن تر هر گل و تعداد گل در هر شاخه می‌تواند معیار انتخاب مناسبی برای بهبود عملکرد گل در ژنوتیپ‌های گل محمدی باشند (Zeinali et al., 2007). این محققان نشان دادند که وزن گل در هر بوته با عملکرد گل در بوته همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌داری داشت. همچنین، همبستگی بین تعداد گل و عملکرد آن مثبت، معنی‌دار و متوسط بود. یافته‌های پژوهش حاضر، نتایج به‌دست‌آمده توسط این محققان را تأیید می‌کند. علی‌رغم فاصله جغرافیایی بین برخی ژنوتیپ‌ها، ضریب تشابه بالا بین آن‌ها ممکن است نشان از منشأ مشترک یا گزینش‌های مداوم و هدفمند ژنوتیپ‌ها داشته باشد. از طرف دیگر، ضریب تشابه پایین بین ژنوتیپ‌ها، ارتباط جغرافیایی نسبتاً کم و منشأ اولیه متفاوت را پیشنهاد می‌کند (Pirseyedi et al., 2005). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین مقدار اسانس و وزن و ابعاد گلبرگ‌ها در ژنوتیپ‌های آیلام و کاشان و ژنوتیپ‌های گلستان و گیلان همبستگی پایینی وجود داشت.

در بررسی انجام‌شده روی اسانس گلبرگ، از نظر آماری بین ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی اختلاف معنی‌داری وجود داشت و تفاوت‌ها قابل توجه بودند. بیشترین مقدار اسانس (۰/۰۴۲ و ۰/۰۳۸ درصد)، به‌ترتیب از گلبرگ‌های ژنوتیپ‌های آیلام و کاشان، استحصال شد. از طرف دیگر، کمترین مقدار اسانس (۰/۰۲۴ درصد)، از گلبرگ‌های ژنوتیپ گلستان به دست آمد (جدول ۲). اسانس گلبرگ با عرض گلبرگ همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌دار و با آنتوسیانین گلبرگ همبستگی قوی، مثبت و معنی‌دار داشت (جدول ۳).

رنگدانه‌های برگ و گلبرگ

نتایج مقایسه میانگین داده‌های حاصل از اندازه‌گیری مقدار کلروفیل و کاروتنوئید برگ و آنتوسیانین گلبرگ نشان از برتری ژنوتیپ کاشان داشت (جدول ۲). بنابراین، بالاترین مقدار کلروفیل b (۱۵/۶۹ میکروگرم بر گرم)، کاروتنوئید (۱۵/۹۸ میکروگرم بر گرم) و آنتوسیانین (۱/۲۱ میکرومول بر گرم) مربوط به ژنوتیپ کاشان بود. پایین‌ترین غلظت کلروفیل b (۹/۵۰ میکروگرم بر گرم) مربوط به ژنوتیپ آیلام و پایین‌ترین غلظت کاروتنوئید (۱۲/۳۴ میکروگرم بر گرم) مربوط به ژنوتیپ گیلان بود. ژنوتیپ‌های گلستان و آیلام، به‌ترتیب با غلظت ۰/۴۸ و ۰/۵۰ میکرومول بر گرم، کمترین غلظت آنتوسیانین را در گلبرگ داشتند. بالاترین غلظت کلروفیل a (۲۵/۴۲ میکروگرم بر گرم)، مربوط به ژنوتیپ آیلام و پایین‌ترین غلظت آن (۲۲/۸۰ میکروگرم بر گرم) مربوط به ژنوتیپ تهران بود. جدول همبستگی صفات (جدول ۳) نشان داد که کلروفیل a با تعداد گلبرگ، طول گلبرگ و تعداد پرچم همبستگی قوی، مثبت و معنی‌دار ($p \leq 0.05$) و با کلروفیل b، طول برگ، ارتفاع بوته، آنتوسیانین گلبرگ و تعداد برچه همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌داری ($p \leq 0.01$) داشت. کلروفیل b با چهار صفت (کلروفیل a، طول برگ، آنتوسیانین گلبرگ و تعداد برچه) همبستگی بسیار قوی، مثبت و معنی‌دار و با یک صفت (تعداد گلبرگ) همبستگی قوی، مثبت و معنی‌داری داشت. همبستگی بین آنتوسیانین گلبرگ با کلروفیل a و b، طول برگ، ارتفاع بوته و تعداد برچه، بسیار قوی، مثبت و معنی‌دار و با اسانس گلبرگ و طول گلبرگ همبستگی قوی، مثبت و معنی‌داری داشت.

دندروگرام تجزیه خوشه‌ای با روش Ward (شکل ۱)، پنج ژنوتیپ گل محمدی را براساس شاخص‌های اندازه‌گیری شده در سه گروه قرار داد. در گروه اول؛ ژنوتیپ‌های گلستان و آیلام، در گروه دوم؛ ژنوتیپ گیلان و در گروه سوم؛ ژنوتیپ‌های تهران و کاشان قرار داشتند. ژنوتیپ‌های گروه اول از نظر شاخص‌های میزان کاروتنوئید، میزان



شکل ۱- گروه‌بندی ژنوتیپ‌های گل محمدی در تجزیه خوشه‌ای با استفاده از میزان اسانس و برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی (رنگدانه‌ها) براساس روش Ward

Figure 1- Grouping of *Rosa damascena* Mill. genotypes in cluster analysis using essence content and some morphologic and biochemical (pigments) traits based on Ward method

براساس ویژگی‌های مورفولوژیک ارائه شده است (Tabaei-Aghdaei & Rezaei, 2003; Tabaei-Aghdaei *et al.*, 2003; Tabaei-Aghdaei *et al.*, 2004a, b; Jaymand *et al.*, 2004; Yousefi *et al.*, 2005; Babaei *et al.*, 2007; Tabaei-Aghdaei *et al.*, 2007; Yousefi *et al.*, 2009; Kiani *et al.*, 2010; Yousefi, 2019). وجود تنوع و تفاوت بین صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپ‌های مختلف، زمینه لازم را برای اقدامات اصلاحی از جمله انتخاب ژنوتیپ برتر و دورگ‌گیری فراهم می‌کند. در ارزیابی قرابت و دوری بین ژنوتیپ‌های مختلف با یکدیگر، در طبقه‌بندی براساس نظام فیلوژنتیک، صفات زایشی مانند ویژگی‌های گل از ارزش بیشتری نسبت به صفات رویشی مانند ویژگی‌های برگ برخوردار هستند. علت اصلی این برتری این است که صفات زایشی کمتر از صفات رویشی تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می‌گیرند. بررسی همبستگی بین صفات از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هنگامی که برای صفتی گزینش انجام می‌شود، لازم است به تأثیر آن صفت بر صفات دیگر توجه شود (Haghi Kashani *et al.*, 2012). بهبود توأم همه صفات مناسبی که با یکدیگر همبستگی مثبت دارند، گام بلندی در اصلاح نباتات است. تعداد، ابعاد و وزن گلبرگ، مهم‌ترین اجزاء عملکرد گل هستند و گزینش مستقیم روی این صفات

ارزیابی تنوع ریخت‌شناختی ژنوتیپ‌های گل محمدی ایران (استان‌های فارس، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی) نشان داد که تفاوت بین نمونه‌ها در نمونه‌های استانی که دارای فاصله جغرافیایی بیشتری بودند، مشهودتر بود (Kiani *et al.*, 2010). طبایعی عقدائی و همکاران (Tabaei-Aghdaei *et al.*, 2007) نیز در یافته‌های خود براساس مقایسه پنج صفت ریخت‌شناختی در بین ژنوتیپ‌های گل محمدی تفاوت‌های بارزی را بین ژنوتیپ‌های مربوط به استان‌های شمالی (گیلان، مازندران و گلستان) در مقایسه با سایر استان‌ها با توجه به شرایط متمایز آب‌وهوایی این مناطق گزارش کردند. بررسی همبستگی بین صفات و یافتن همبستگی بالا بین صفات مهم‌تر، ارزش بالایی در برنامه‌های اصلاحی و انتخاب ژنوتیپ‌های برتر دارد. بهبود توأم همه صفاتی که همبستگی مثبتی با عملکرد دارند، در بهبود عملکرد مؤثر بوده است (Zeinali *et al.*, 2007).

شناسایی دقیق ژنوتیپ‌ها، پیش‌نیاز بهره‌برداری کامل از آن‌ها است. مبنای انتخاب این ژنوتیپ‌ها، میزان عملکرد کمی و کیفی گل می‌باشد که به‌عنوان ارزشمندترین اندام گیاه در برنامه‌های اصلاحی و به‌نژادی به شمار می‌رود (Kodori & Tabaei-Aghdaei, 2007). برخی گزارش‌ها در ارتباط با مقایسه ژنوتیپ‌های گل محمدی

همراه با میزان اسانس می‌تواند منجر به انتخاب ژنوتیپ‌های با عملکرد بالا شود.

مطالعه روی ۲۰ ژنوتیپ گل محمدی آشکار کرد که عملکرد گل در هر بوته به‌طور مستقیم با تعداد گل در هر بوته و تعداد شاخه در گیاه مرتبط است. همچنین، تعداد گل در هر بوته، تعداد گل در هر شاخه و تعداد شاخه گل‌دهنده در گیاه به‌عنوان مهم‌ترین اجزاء تشکیل‌دهنده عملکرد گل در بوته در نظر گرفته می‌شوند (Singh & Kariyar, 2001). آنالیز بیومتریکی گل ۳۸ ژنوتیپ رز از مجموعه منابع ژنتیکی موجود در یکی از مناطق بلغارستان، حضور دو فنوتیپ مجزای گل را آشکار کرد که به‌طور معنی‌داری از نظر وزن گل، تعداد گلبرگ و تعداد بساک متفاوت بودند (Rusanov et al., 2013). نتایج این پژوهش همانند نتایج پژوهش حاضر، تفاوت معنی‌داری را بین اسانس‌های ژنوتیپ‌های مختلف نشان داد، اگرچه فراوانی برخی ترکیبات اسانس در دو گروه مجزا، متفاوت بود. این تفاوت در اسانس به‌منظور تولید صنعتی مواد گیاهی با کیفیت حائز اهمیت است. آنالیز تنوع ژنتیکی ۱۲ ژنوتیپ گل محمدی در ایران نشان داد که برخی ژنوتیپ‌های جمع‌آوری‌شده از نواحی مختلف، از نظر ژنتیکی با یکدیگر مرتبط و برخی نسبت به یکدیگر مجزا هستند (Pirseyedi et al., 2005). این موضوع نقش مؤثر شرایط بوم‌شناختی در تغییر و تنوع ژنوتیپی گونه‌ها و ارقام مختلف را نشان می‌دهد. مطالعه روی ۲۶ ژنوتیپ جمع‌آوری‌شده از استان‌های فارس، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نشان داد که ۱۴ ژنوتیپ در یک گروه قرار داشتند که نشان‌دهنده شباهت ژنتیکی تعداد زیادی از ژنوتیپ‌های گل محمدی جمع‌آوری‌شده از استان‌های فارس، اصفهان و کرمان بود (Kiani et al., 2010). بررسی تنوع ژنتیکی ۱۲ ژنوتیپ محلی گل محمدی در استان کردستان نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها از لحاظ عملکرد گل و اجزاء آن (ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعداد، طول، عرض، قطر و وزن گل و گلبرگ) اختلاف معنی‌داری وجود داشت که می‌تواند زمینه اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد گل را فراهم نماید (Yousefi, 2019). در این بررسی مشخص شد که عملکرد گل با تعداد گل، ارتفاع گیاه، تعداد، طول و عرض برگ، قطر گل، وزن تر و خشک گل و گلبرگ همبستگی مثبت و معنی‌داری دارد.

مطالعه مورفولوژیک و فنولوژیک روی ۲۰ ژنوتیپ گل محمدی جمع‌آوری‌شده از نقاط مختلف ایران نشان داد که بین برخی از صفات مورد مطالعه مانند تعداد گل در بوته و عملکرد گل، رابطه مثبت قوی وجود داشت (Haghi Kashani et al., 2012). تغییر صفات تعداد

گل در بوته و وزن تر هر گل، ۹۴ درصد تغییرات عملکرد گل در بوته را توجیه می‌کند. تعداد گل در بوته، بالاترین اثر مستقیم را بر عملکرد دارد. طبق نظر این محققان، تعداد گل در بوته و وزن تر گل می‌تواند به‌عنوان معیار مناسب برای عملکرد گل در هر ژنوتیپ گل محمدی در نظر گرفته شوند. در بررسی صفات عملکردی، مورفولوژیک و فنولوژیک ۴۸ ژنوتیپ این گل از سراسر ایران مشخص شد که اختلاف بین همه صفات مورد بررسی در بین سال‌های آزمایش و در بین ژنوتیپ‌های مختلف معنی‌دار بود (Yousefi et al., 2021). در ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی استان کرمان، اختلاف معنی‌داری از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد گل مشاهده شد (Kodori & Tabaei-Aghdaei, 2007). نتایج تجزیه خوشه‌ای روی ۲۵ ژنوتیپ این گل کشت‌شده در استان کرمان‌شاه آن‌ها را در چهار ژنوتیپ مجزا قرار داد (Yousefi et al., 2016). نتایج حاکی از آن بود که تفاوت در مقدار ترکیبات اسانس، بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی و فیزیولوژیک قرار دارد. ارزیابی عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌ها در استان کرمان نشان داد که ژنوتیپ 'رفسنجان' از نظر عملکرد گل نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها برتری دارد (Kodori & Tabaei-Aghdaei, 2007). برخی مطالعات، تنوع قابل‌توجهی را در بازده اسانس و عملکرد اسانس در نمونه‌های مختلف گل محمدی نشان داده است (Batooli & Safaie-Ghomi, 2012; Yousefi & Jaimand, 2018). تفاوت ریخت‌شناختی بین ژنوتیپ‌های مختلف این گل نشان‌دهنده وجود ژرمپلاسم و ظرفیت مناسب برای بهبود صفات و امکان گزینش بهترین ژنوتیپ‌ها با استفاده از مارکرهای مورفولوژیک در جهت افزایش عملکرد گل در کشور است (Tabaei-Aghdaei et al., 2005).

نتیجه‌گیری

یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین ژنوتیپ‌های 'گیلان'، 'ایلام'، 'گلستان'، 'تهران' و 'کاشان' از لحاظ همه صفات مورد اندازه‌گیری اختلاف معنی‌داری وجود داشت. این اختلاف می‌تواند زمینه لازم را برای اقدامات اصلاحی در جهت بهبود عملکرد گل فراهم کند. ژنوتیپ‌های با مقدار اسانس بالا در گلبرگ، دارای وزن و ابعاد گلبرگ بالاتری بودند. در مجموع، ژنوتیپ‌های ایلام و کاشان به‌عنوان ژنوتیپ‌های برتر برای برنامه‌های اصلاحی پیشنهاد می‌شوند.

References

1. Babaei, A., Tabaei-Aghdaei, S.R., Khosh-Khui, M., Omidbaigi, R., Naghavi, M.R., Esselink, G.D., & Smulders, M.J.M. (2007). Microsatellite analysis of Damask rose (*Rosa damascena* Mill.) accessions from various regions in Iran reveals multiple genotypes. *BMC Plant Biology*, 7, 12–19. <https://doi.org/10.1186/1471-2229-7-12>
2. Batooli, H., & Safaie-Ghomi, J. (2012). Comparison of flower constituents of three *Rosa damascena* Mill. genotypes in Kashan region. *Journal of Medicinal Plants*, 11(9), 157–166. (In Persian). <https://doi.org/10.1001.1.2717204.2012.11.42.35.3>
3. Davazdah-Emami, S. (2002). Identification of *Rosa damascena* cultivars in Kashan. Final Report of Research Project, Agricultural Research Center, Isfahan, Iran. (In Persian).
4. Haghi Kashani, A., Arab, M., Tabaei Aghdaei, S.R., Zeinali, H., & Roozban, M.R. (2012). The relationship between flower yield and yield components in Damask roses (*Rosa damascena* Mill.) in different region of Iran. *Journal of Crops Improvement*, 14(1), 13–19. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22059/jci.2012.25040>
5. Jaymand, K., Rezaei, M.B., Tabaei Aghdaei, S.R., & Barazandeh, M.M. (2004). Evaluation of rose essential oil of different areas of Isfahan province. *Pajooresh & Sazandagi*, 65, 86–91. (In Persian).
6. Kiani, M., Zamani, Z., Khalighi, A., Fattahi Moghaddam, M.R., & Kiani, M.R. (2010). Collection and evaluation of morphological diversity of Damask rose genotypes of Iran. *Iranian Horticultural Science Journal*, 41(3), 223–233. (In Persian). <https://doi.org/10.1001.1.2008482.1389.41.3.2.0>
7. Kodori, M.R., & Tabaei-Aghdaei, S.R. (2007). Collection and evaluation of morphological diversity of Damask rose genotypes of Iran. *Iranian Horticultural Science Journal*, 23(1), 100–110. (In Persian). <https://doi.org/10.1001.1.2008482.1389.41.3.2.0>
8. Kumar Pal, P. (2013). Evaluation, genetic diversity, recent development of distillation method, challenges and opportunities of *Rosa damascena*: A Review. *Journal of Essential Oil Bearing Plants*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/0972060X.2013.764176>
9. Lichtenthaler, H.K., & Buschmann, C. (2001). Chlorophylls and Carotenoids - Extraction, Isolation and Purification. Current Protocols in Food Analytical Chemistry (CPFA), (Supplement 1), Unit F4.2.1-F4.2.6 (2001) (John Wiley, New York).
10. Pirseyedi, M., Mardi, M., Davazdahemami, S., Kermani, M., & Mohamadi, A. (2005). Analysis of the genetic diversity of 12 Iranian Damask rose (*Rosa damascena* Mill.) genotypes using amplified fragment length polymorphism markers. *Iranian Journal of Biotechnology*, 3, 225–230. (In Persian).
11. Rusanov, K., Kovacheva, N., Rusanova, M., & Atanassov, I. (2013). Flower phenotype variation, essential oil variation and genetic diversity among *Rosa alba* L. accessions used for rose oil production in Bulgaria. *Scientia Horticulturae*, 161, 76–80. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2013.07.010>
12. Sefidkon, F. (2017). The necessity of using cultivars and genotypes of *Rosa damascena*. *Journal of Nature of Iran*, 3(4), 88.
13. Singh, S.P., & Kayiyar, R.S. (2001). Correlation and path analysis for flower yield in *Rosa damascena* Mill. *Herb, Spices and Medicinal Plants*, 8(1), 43–51. https://doi.org/10.1300/J044v08n01_06
14. Tabaei-Aghdaei, S.R., Babaei, A., Khosh-Khui, M., Jaimand, K., Rezaei, M.B., Assareh, M.H., & Naghavi, M.R. (2007). Morphological and oil content variations amongst Damask rose (*Rosa damascena* Mill.) landraces from different regions of Iran. *Scientia Horticulturae*, 113, 44–48. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2007.01.010>
15. Tabaei-Aghdaei, S.R., & Rezaei, M.B. (2003). Study of flower yield variation in *Rosa damascena* L. genotypes of Kashan. *Iranian Journal of Rangeland and Forest Plant Breeding and Genetic Resources*, 9, 111–122. (In Persian). <https://doi.org/10.22092/ijrfpbgr.2002.115795>
16. Tabaei-Aghdaei, S.R., Rezaei, M.B., & Jaimand, K. (2003). Evaluation of genetic variation in floral parts and essential oils concentration of *Rosa damascena* genotypes collected from Kashan/Iran. *Iranian Journal of Rangeland and Forest Plant Breeding and Genetic Resources*, 11, 219–247. (In Persian). <https://doi.org/10.22092/ijrfpbgr.2003.115510>
17. Tabaei-Aghdaei, S.R., Soleimani, E., Jafari, A.A., & Rezaei, M.B. (2004a). Evaluation of flower yield and morphological characteristics of *Rosa damascena* Mill genotypes from west parts of Iran, using multivariate analysis. *Iranian Journal of Rangeland and Forest Plant Breeding and Genetic Resources*, 12, 203–220. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22092/ijrfpbgr.2004.115471>
18. Tabaei-Aghdaei, S.R., Sahebi, M., Jafari, A.A., & Rezaei, M.B. (2004b). Evaluation of flower yield and morphological characteristics of 11 *Rosa damascena* Mill. using multivariate analysis. *Iranian Journal of Medicine and Aromatic Plants*, 20, 199–211. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22092/ijrfpbgr.2004.115471>

19. Tabaei-Aghdaei, S.R., Soleimani, E., & Jafari, A.A. (2005). Evaluation of morphological variation in *Rosa damascena* Mill genotypes from six central province of Iran. *Iranian Journal of Medicine and Aromatic Plants*, 21, 233–246. (In Persian). <https://doi.org/10.22092/ijmapr.2005.115190>
20. Timberlake, C.F. (1980). Anthocyanins-occurrence, extraction and chemistry. *Food Chemistry*, 5(1), 69–80. [https://doi.org/10.1016/0308-8146\(80\)90065-5](https://doi.org/10.1016/0308-8146(80)90065-5)
21. Yousefi, B. (2019). Evaluation of genetic diversity of flower yield and its components in 12 local genotypes of *Rosa damascena* Mill. in Kurdistan province. *Iranian Journal of Horticultural Science*, 50(3), 723–732. (In Persian). <https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.259075.1454>
22. Yousefi, B., Ghasempoor, H.R., Yousefi, B., Tabaei Aghdaie, S.R., & Jaimand, K. (2016). Variations in chemical components of essential oils in 25 accessions of damask rose (*Rosa damascena* Mill.). *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants*, 32(1), 98–114. (In Persian). <https://doi.org/10.22092/ijmapr.2016.106140>
23. Yousefi, B., & Jaimand, K. (2018). Chemical variation in the essential oil of Iranian *Rosa damascena* landraces under semi-arid and cool conditions. *International Journal of Horticultural Science and Technology*, 5(1), 81–92. <https://doi.org/10.22059/ijhst.2018.256329.234>
24. Yousefi, B., Tabaei-Aghdaei, S.R., & Amiri, A. (2021). Study on yield and flower yield components, essential oil percentage, and some morphological and phonological traits in 48 different accessions of damask rose (*Rosa damascena* Mill.) in Kermanshah province. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research*, 37(4), 612–627. (In Persian).
25. Yousefi, B., Tabaei-Aghdaei, S.R., & Assareh, M.H. (2005). Study of cutting rhizogenesis and sapling growth variation in *Rosa damascena* genotypes in Kurdistan. *Iranian Journal of Rangeland and Forest Plant Breeding and Genetic Resources*, 13, 1–27. (In Persian). <https://doi.org/10.22092/ijrfpbgr.2005.115212>
26. Yousefi, B., Tabaei-Aghdaei, S.R., Darvish, F., & Assareh, M.H. (2009). Flower yield performance and stability of various *Rosa damascena* Mill. landraces under different ecological conditions. *Scientia Horticulturae*, 121(3), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2009.02.004>
27. Zeinali, H., Tabaei Aghdaei, S.R., Askarzadeh, M., Kianipour, A., & Abtahi, S.M. (2007). Study of relationship between flower function and components in *Rosa damascena* genotypes. *Science-Research Periodical of Fragrant and Medicinal Herbs in Iran*, 23(2), 195–203. (in Persian).