

The effect of different types of mulching and different levels of water stress on yield and yield components of *Asparagus officinalis*

Mansoore Kermani^{1*}, Shahram Amirmoradi¹

1- Assistant Professor, Department of Agriculture, Payam Noor university, Tehran, Iran

*Corresponding Author Email: Kermani.m@pnu.ac.ir

Introduction

Drought stress is one of the most important and most common limiting factors for plant growth in arid and semiarid regions. *Asparagus (Asparagus officinalis)* is the most important species of asparagus and the fresh stem of this plant is harvested as its edible part and used as a vegetable and medicine. Asparagus is very rich in vitamins, flavonoids, saponins, and glutathione, which have anti-cancer properties, protect nerve cells, and protect the heart. Asparagus is a herbaceous, perennial plant growing to 100–150 cm tall, with two types of stems. One of the stems called spear, which is edible and has no leaves. The second, called fern which has needle leaves and is non-edible. This plant has thick and fleshy roots called rhizome (crown), which is resistant to winter cold and can remain in the ground for up to 25 years and give economic crops for up to 10-15 years. According to some studies, commercial cultivars of asparagus are sensitive to abiotic stresses such as drought stress. Drought stress during the growth of fern can reduce the production of stored carbohydrates in the crown roots and lead to a decrease in yield in the next season. Also, drought stress increases the fiber and reduces the quality of asparagus. Mulch is any material that is spread or laid over the surface of the soil and used for reasons such as saving water consumption by reducing evaporation from the soil surface, controlling soil erosion, adjusting soil temperature, controlling the growth of weeds, and improving the absorption of soil nutrients. Several researches have reported that the use of mulch is effective in increasing the resistance of plants to drought stress and also reducing the negative effects of drought stress on yield and its components.

Materials and Methods

This research was conducted as a factorial experiment based on a randomized complete block design in three replications in the crop year of 2021-2022 in a two-year asparagus field near Mashhad city. The experimental factors were the types of mulch (barley straw, asparagus straw and plastic) and drought stress levels including irrigation after 50 mm (no stress), 70 mm (mild stress), 100 mm (moderate stress) and 150 mm (severe stress) evaporation from pan class A. Planting of transplants in the field was done manually on April 9 2021. Each experimental plot with dimensions of 4 x 10 meters included 4 rows with a distance of 100 cm and a distance of 50 cm between plants. Weeding was done manually. Fertilization was done according to the soil analysis and the recommendations of the soil science laboratory. The date of applying water stress was from April 4 to September 1 2022. The average of traits recorded in the first harvest (April 21) and the second harvest (September 6) were used for variance analysis. Data analysis was done using MSTAT-C software and mean comparisons were done using LSD method at 5% probability level. The graphs were drawn using Excel software.

Results and Discussion

The results showed that fresh stem yield, number of harvestable stems, stem length, stem diameter, stem fresh and dry weight, and total leaf chlorophyll content decreased and leaf proline content increased significantly at different levels of water stress. The content of leaf carotenoids also decreased significantly compared to the control only in severe water stress. The use of mulch in non-stressed conditions caused a significant increase in all studied traits except proline, so that asparagus straw with a 76% increase in stem yield was in the first place, and barley straw and plastic mulch were in the second and third places. Also, mulching reduced the negative effects of water stress on all traits, so that the non-use of mulch in mild, moderate and severe stress caused a 21%, 36% and 46% reduction in shoot yield, respectively, and the use of asparagus straw caused 10 %, 13% and 16% decrease in the yield of stems.

Conclusion

Water stress, as the most important factor of physiological limitation in plants, negatively affects growth, development and yield of plants. The use of plant residue mulches, especially asparagus straw, between the rows of asparagus cultivation can increase the yield in conditions without drought stress, and in drought stress conditions. the yield can be protected from the negative effects of stress to a large extent.

Keywords: Water stress, Evaporation pan class A, Fresh stem yield, Asparagus

اثر انواع خاک پوش و سطوح مختلف تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه مارچوبه

(*Asparagus officinalis*)

منصوره کرمانی^{۱*}، شهرام امیرمرادی^۱

۱- استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: Email: Kermani.m@pnu.ac.ir

چکیده

این پژوهش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در یک مزرعه دوساله مارچوبه رقم ATLAS نزدیک شهرستان مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل انواع خاک پوش (کاه جو، کاه مارچوبه و پلاستیک) و سطوح تنش آبی شامل آبیاری پس از ۵۰ (بدون تنش)، ۷۰ (تنش خفیف)، ۱۰۰ (تنش متوسط) و ۱۵۰ (تنش شدید) میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A بود. تاریخ اعمال تنش‌های آبی از ۱۵ فروردین ماه تا ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ بود. نتایج نشان داد که عملکرد ساقه تر، تعداد ساقه قابل برداشت، طول ساقه، قطر ساقه، وزن تر و خشک ساقه و میزان کلروفیل در سطوح مختلف تنش آبی کاهش و میزان پرولین افزایش معنی‌داری داشت. محتوای کاروتنوئیدها نیز فقط در تنش آبی شدید کاهش معنی‌داری نسبت به شاهد پیدا کرد. استفاده از خاک پوش در شرایط بدون تنش باعث افزایش معنی‌دار تمامی صفات مورد مطالعه به جز پرولین شد، به طوری که کاه مارچوبه با ۷۶٪ افزایش در عملکرد ساقه تر نسبت به شاهد در اولین رتبه قرار داشت و پس از آن کاه جو و پلاستیک در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند. همچنین خاک پوش باعث تقلیل اثرات منفی تنش آبی بر تمامی صفات شد، به طوری که عدم کاربرد خاک پوش در شرایط تنش خفیف، متوسط و شدید به ترتیب باعث کاهش ۲۱٪، ۲۶٪ و ۴۶٪ در عملکرد ساقه تر شد. اما کاربرد کاه مارچوبه به عنوان بهترین خاک پوش در شرایط تنش خفیف، متوسط و شدید به ترتیب باعث کاهش ۱۰٪، ۱۳٪ و ۱۶٪ در عملکرد ساقه تر گردید.

واژه های کلیدی: تنش آبی، تشتک تبخیر کلاس A، عملکرد ساقه تر، مارچوبه.

مقدمه

مارچوبه با نام علمی *Asparagus officinalis* گیاهی علفی، چند ساله و دوپایه از خانواده مارچوبگان (Asparagaceae) است که بومی آسیا، اروپا و شمال آفریقا می‌باشد. این گونه از نظر اقتصادی مهمترین جنس مارچوبه است و ساقه تازه این گیاه به عنوان بخش خوراکی آن برداشت شده و به صورت سبزی و دارو مصرف می‌شود (Mousavizade et al., 2021). این گیاه دارای ریشه‌های ضخیم و گوشتی به نام

ریزوم^۱ است که در مقابل سرمای زمستان مقاوم بوده و می‌تواند تا ۲۵ سال در زمین باقی بماند و تا ۱۰-۱۵ سال محصول اقتصادی بدهد. مارچوبه دارای دو نوع ساقه هوائی با ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر است. یکی ساقه‌های نیزه‌ای^۲ که مصرف خوراکی داشته و برگ ندارد. دوم ساقه شوییدی^۳ که دارای برگ‌های سوزنی بوده و غیر خوراکی است (Grubben & Denton, 2004).

مارچوبه از نظر ویتامین‌ها، فلاوتوئیدها، ساپونین‌ها و گلوکوتانیون بسیار غنی است (Negi et al., 2010) که خواص ضد سرطانی، محافظت از سلول‌های عصبی و محافظت از قلب دارند (Manach et al., 2004). این گیاه به عنوان یک گیاه دارویی مفید در طب آسیایی (مقوی، ملین، ضد سرفه و ضد سرطان) و اروپایی (برای درمان بیماری‌های التهابی مجاری ادراری) مطرح است (Naghdi Abadi et al., 2011). مالچ یا خاک‌پوش به معنی پوشش غیرزنده است که در کشاورزی به دلایلی از جمله صرفه جویی در مصرف آب از طریق کاهش تبخیر از سطح خاک، کنترل فرسایش خاک، تعدیل درجه حرارت خاک، کنترل رشد علف‌های هرز، بهبود جذب عناصر غذایی خاک، تاثیر بر رشد کیفی گیاه و در نهایت افزایش عملکرد محصول استفاده می‌شود (Kouchaki et al., 2000). همچنین با استفاده از خاک‌پوش می‌توان کمبود مواد غذایی خاک را جبران و نیتروژن خاک را افزایش داد (Ghanbari et al., 2018). از انواع خاک‌پوش‌های طبیعی (آلی) می‌توان به لاش، برگ، کاه، خاک اره و برگ یا پوست گیاهان اشاره کرد. از انواع خاک‌پوش‌های مصنوعی (غیر آلی) نیز می‌توان از پشم شیشه، فویل فلزی، کاغذ، پلاستیک یا فیبر نام برد.

یکی از مسائل مهم در اصلاح نباتات، افزایش مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی است و در این بین تنش آبی از رایج‌ترین تنش محیطی است که روی رشد و عملکرد گیاهان تاثیر منفی می‌گذارد (Kirigwi et al., 2004). بر اساس برخی پژوهش‌ها، ارقام تجاری مارچوبه نسبت به تنش‌های غیر زنده مانند تنش خشکی حساس هستند (Drost & Wilcox-Lee, 1997). تنش خشکی در زمان رشد شاخ و برگ شوییدی می‌تواند باعث کاهش تولید کربوهیدرات‌ها در ریشه ذخیره‌ای شده (Drost & Wilcox-Lee, 1997) و منجر به کاهش محصول در فصل بعدی شود (Drost & Wilcox-Lee 1997; Campi, et al., 2019). همچنین تنش خشکی باعث افزایش فیبر و کاهش کیفیت مارچوبه نیز می‌شود (Wilson et al., 1996). در بررسی اثر تنش خشکی و کاهش طول روز روی مارچوبه رقم GM و UC گزارش شد که تنش خشکی نسبت شاخساره به ریشه را در رقم GM افزایش داد. همچنین تنش خشکی باعث افزایش غلظت پرولین تاج در هر دو رقم و درصد ساکارز تاج و غلظت فروکتان کل در رقم UC شد (Short, 2021).

پژوهش‌های متعددی استفاده از خاک‌پوش را در افزایش مقاومت سورگوم علوفه‌ای (Ghanbari et al., 2021)، کنجد (Behzad et al., 2018)، نعنا فلفلی (Shahriari et al., 2013)، بادنجان (Amiri rodan et al., 2020) و عدس (Alami-Milani, et al., 2013) به تنش خشکی و همچنین تقلیل اثرات منفی تنش خشکی روی عملکرد و اجزای آن موثر گزارش کرده‌اند. در گندم، کاربرد خاک‌پوش سبز (برگ‌های *Jatropha curcas* L.) با محافظت از رطوبت خاک و وضعیت رطوبتی گیاه، باعث جلوگیری از کاهش معنی‌دار محتوای نسبی آب برگ (LRWC)، ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه و محتوای کلروفیل برگ تحت تنش آبی شد (Irshad

1 Crown

2 Spear

3 Fern

(*et al., 2021*). در یک تحقیق گزارش شد که استعمال خاکپوش کاه و کمپوست بین ردیف‌های مارچوبه در کاهش شستشوی خاک توسط رواناب موثر است (*Niziolomski et al., 2020*). نی و همکاران (*Nie et al., 2007*) نیز به تاثیر مثبت انواع خاکپوش بر رشد و عملکرد مارچوبه اشاره کرده‌اند. اما تاکنون پژوهشی درباره تاثیر خاکپوش بر افزایش مقاومت به تنش خشکی در مارچوبه گزارش نشده است. لذا با توجه به فراگیر بودن مشکل کمبود آب در کشورمان به‌ویژه در ماه‌های تابستان، هدف از این تحقیق مقایسه انواع خاکپوش در افزایش عملکرد و همچنین افزایش مقاومت به تنش آبی در مارچوبه است.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در یک مزرعه دوساله مارچوبه رقم ATLAS نزدیک شهرستان مشهد (ارتفاع از سطح دریا ۱۱۵۰ متر، ۵۹ درجه و ۳۴ دقیقه و ۳۶ ثانیه شمالی و ۳۶ درجه و ۳۳ دقیقه و ۷۳ ثانیه شرقی) انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش فاکتور تنش آبی شامل آبیاری نرمال (پس از ۵۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A)، تنش خفیف (آبیاری پس از ۷۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A)، تنش متوسط (آبیاری پس از ۱۰۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و تنش شدید (آبیاری پس از ۱۵۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و فاکتور انواع خاکپوش شامل کاه جو، کاه مارچوبه و پلاستیک بود. میزان مصرف کاه جو و کاه مارچوبه، ۴ کیلوگرم به ازای هر متر مربع بود. خاکپوش پلاستیکی نیز به رنگ سیاه و با ضخامت ۲ میلی‌متر انتخاب شد.

قبل از انجام آزمایش، نمونه‌برداری از خاک در عمق صفر تا ۳۰ سانتی‌متری انجام شد. نتایج پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایش در جدول ۱ نشان داده شده است. کاشت نشا به‌صورت دستی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ انجام شد هر کرت آزمایشی با ابعاد ۴ در ۱۰ متر شامل ۴ ردیف با فاصله ۱۰۰ سانتی‌متر و فاصله بوته ۵۰ سانتی‌متر بود. خاکپوش‌های پلاستیکی در سال اول قبل از کشت نشای مارچوبه روی ردیف‌ها کشیده شد و سپس نشاها با سوراخ کردن پلاستیک در محل کشت، کاشته شدند. خاکپوش‌های دیگر دو هفته پس از استقرار نشاها بر روی ردیف‌های کشت قرار داده شدند. وجین علف‌های هرز به صورت دستی انجام شد. کود دهی با توجه به آنالیز خاک و توصیه‌های آزمایشگاه خاکشناسی بدین صورت انجام شد: کودهای قبل از کاشت شامل سوپرفسفات تریپل به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و سولفات پتاسیم به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت و همراه با شخم در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک قرار گرفت. کود NPK 20-20-20 نیز در دو نوبت (هر نوبت به میزان ۱۰ کیلوگرم در هکتار) در آب آبیاری استفاده شد. آبیاری به‌صورت قطره‌ای و با مدار ۵ روزه انجام گردید. گیاهان در سال زراعی اول رشد رویشی داشته و هیچ محصولی از مزرعه برداشت نشد. مارچوبه پس از گذراندن دوره استقرار در مزرعه به سرمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد مقاومت دارد و بخش هوایی گیاه در پاییز و زمستان خزان نموده و در بهار سال بعد شروع به رشد می‌نماید. چنانچه یخبندان در محدوده سردتر از ۱۸- درجه سانتی‌گراد بتواند باعث یخ زدن خاک شود و ریزوم‌ها در زیر خاک یخ بزنند، گیاه از بین می‌رود. لذا با توجه به شرایط آب و هوایی مشهد، گیاه در فصل پاییز و زمستان به خواب می‌رود.

اعمال تیمارها و برداشت محصول در سال زراعی دوم صورت گرفت. تاریخ اعمال تنش‌های آبی از ۱۵ فروردین تا ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ بود. نمونه‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱ و ۱۴۰۱/۶/۱۵ و پس از حذف ردیف‌های حاشیه‌ای برداشت شدند. صفات مورد اندازه‌گیری شامل عملکرد

ساقه تر، تعداد ساقه، ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن تر و خشک ساقه، میزان کلروفیل کل، میزان پرولین و میزان کاروتنوئیدهای برگ بود. از میانگین صفات ثبت شده در چین اول و دوم برای آنالیزهای آماری در این پژوهش استفاده شد.

جدول ۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد مطالعه

Table 1. Physical and chemical characteristics of studied field soil

بافت خاک Soil texture	هدایت الکتریکی EC (ds/m)	شاخص واکنش PH	پتاسیم Potassium (ppm)	فسفر Phosphorus (ppm)	نیتروژن کل Total Nitrogen (%)	کربن آلی Organic Carbon (%)
رس ۲۶ درصد، سیلت ۴۳ درصد، شن ۳۱ درصد Clay 26%, silt 43%, Sand 31%	2.3	7.3	137	4.7	0.12	0.7

پرولین برگ به روش بتس و همکاران (Bates et al., 1973) اندازه‌گیری شد. بدین صورت که ۰/۲ گرم از بافت برگ در چهار میلی‌لیتر اسید سولفوسالیسیلیک سه درصد سائیده شد و با کاغذ صافی واتمن شماره دو صاف گردید. دو میلی‌لیتر از هموژن با دو میلی‌لیتر معرف نین‌هیدرین (۱/۲۵ گرم نین‌هیدرین در ۵۰ میلی‌لیتر محلول شامل ۳۰ میلی‌لیتر اسید استیک خالص و ۲۰ میلی‌لیتر اسید فسفریک ۶ مولار) و دو میلی‌لیتر اسید استیک گلاسیال در یک لوله آزمایش مخلوط شدند و در حمام آب ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت قرار گرفتند. سپس نمونه‌ها به ظرف محتوی یخ منتقل شدند تا واکنش متوقف شود و پس از آن به دمای اتاق انتقال یافتند. به محتویات داخل لوله آزمایش چهار میلی‌لیتر تولوئن اضافه شد و به مدت ۳۰ ثانیه به شدت مخلوط گردید. پس از مدت ۲۰ دقیقه، جذب لایه رنگی بالایی (محتوی تولوئن و پرولین) در طول موج ۵۲۰ نانومتر توسط اسپکتروفوتومتر قرائت شد و مقدار پرولین بر حسب میکرومول بر گرم وزن تر نمونه با استفاده از منحنی استاندارد طبق رابطه یک تعیین شد.

$$\text{رابطه ۱:} \quad \text{میکرومول پرولین در گرم وزن تر} = \left(\frac{\mu\text{g prolin}}{\text{ml}} \times \frac{\text{ml toloen}}{115.5 \left(\frac{\mu\text{g}}{\mu\text{mol}} \right)} \right) / \frac{\text{gr sample}}{5}$$

برای اندازه‌گیری مقدار کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئیدها از روش آرنون (Arnon, 1967) به شرح زیر استفاده شد: مقدار نیم گرم از بافت تازه گیاهی با استفاده از نیتروژن مایع درون هاون چینی به خوبی له شد. سپس ۲۰ میلی‌لیتر استن ۸۰٪ به نمونه اضافه شد و با سرعت ۶۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ گردید. عصاره جدا شده فوقانی حاصل از سانتریفیوژ به بالن شیشه‌ای منتقل شد. در نهایت مقداری از نمونه داخل بالن در کووت اسپکتروفوتومتر ریخته شد و مقدار جذب به طور جداگانه در طول موج های ۶۶۳ نانومتر برای کلروفیل a، ۶۴۵ نانومتر برای کلروفیل b و ۴۷۰ نانومتر برای کاروتنوئیدها قرائت گردید. سپس با استفاده از رابطه‌های زیر میزان کلروفیل a، b و کاروتنوئیدها بر حسب میلی‌گرم بر گرم وزن تر نمونه به دست آمد.

$$\text{Chlorophyll a} = (19.3 * A_{663} - 0.86 * A_{645}) V/100W$$

رابطه ۲

$$\text{Chlorophyll b} = (19.3 * A645 - 3.6 * A663) V/100W$$

رابطه ۳

$$\text{Carotenoides} = 100(A470) - 3.27(\text{mg chl. a}) - 104(\text{mg chl. b})/227$$

رابطه ۴

V = حجم محلول صاف شده (محلول فوقانی حاصل از سانتریفیوژ)

A = جذب نور در طول موج‌های ۶۶۳، ۶۴۵ و ۴۷۰ نانومتر

W = وزن تر نمونه بر حسب گرم

در نهایت، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار MSTAT-C و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از روش LSD در سطح احتمال ۵ درصد انجام شد. نمودارها با استفاده از نرم افزار اکسل ترسیم شد.

نتایج و بحث

بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر اصلی تنش آبی و انواع مختلف خاک‌پوش بر تمام صفات اندازه‌گیری شده در سطح یک درصد معنی‌دار بود. همچنین اثر متقابل این دو فاکتور بر تمام صفات اندازه‌گیری شده به جز عملکرد ساقه تر معنی‌دار بود. (جدول ۲).

جدول ۲- نتایج تجزیه واریانس اثر خاک‌پوش و سطوح مختلف تنش آبی بر برخی صفات کمی و کیفی مارچوبه

Table 2. Results of variance analysis for effects of mulch and different levels of water stress on some quantitative and qualitative traits of Asparagus

میانگین مربعات (mean of square)										
S.O.V	df	Yield	Harvestable number of stems	Stem length	Stem diameter	Stem fresh weight	Stem dry weight	Chlorophyll Content	Prolin content	Crotenoid content
بلوک block	2	841365.7 ^{ns}	6.396**	37.52**	13.27**	4.521**	3.083**	7.646**	0.028**	0.001**
خاک‌پوش (A) Mulch	3	176872139 **	176.5**	68.24**	91.63**	66.28**	73.39**	477.94**	8.724**	0.025**
تنش آبی (B) Water stress	3	27251641.5**	21.94**	48.68**	20.46**	14.61**	8.278**	66.50**	0.554**	0.004**
تنش آبی × خاک‌پوش Mulch×Water stress (A×B)	9	1359452.3 ^{ns}	2.407*	7.354**	3.836**	2.185**	0.815*	10.74**	0.169**	0.004**
خطای آزمایشی Error	30	738544.5	1.063	1.299	0.738	0.743	0.439	1.379	0.031	0.001

ضریب تغییرات (%) Coefficient of Variations (%)	6.90	6.03	5.26	5.88	4.29	6.68	1.32	3.56	5.13
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ns و ** و * به ترتیب نمایانگر تفاوت معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد و غیر معنی‌دار.

* , ** and ns significant at 5 and 1% probability levels and non-significant, respectively.

جدول ۳- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف تنش آبی بر صفات مورد بررسی در مارچوبه

Table 3. Mean comparison for effect of different levels of water stress on measured traits in Asparagus

سطوح تنش آبی Levels of water stress	عملکرد (تن در هکتار) Yield (ton/ha)	تعداد ساقه قابل برداشت Harvestable number of stems	طول ساقه (سانتی‌متر) Stem length (cm)	قطر ساقه (میلی متر) Stem diameter (mm)	وزن تر ساقه Stem fresh weight	وزن خشک ساقه Stem dry weight	کلروفیل Chlorophyll Content	پروترین Prolin content	کروتونئید Croteneid content
Control شاهد	14410 ^a	18.92 ^a	24.25 ^a	16.33 ^a	21.25 ^a	11.00 ^a	92.08 ^a	4.658 ^c	0.619 ^a
mild stress تنش خفیف	12750 ^b	17.17 ^b	22.00 ^b	14.75 ^b	20.67 ^a	10.08 ^b	89.83 ^b	4.908 ^b	0.606 ^a
moderate stress تنش متوسط	11730 ^c	16.50 ^{bc}	20.83 ^c	14.08 ^b	19.67 ^b	9.50 ^c	88.17 ^c	4.892 ^b	0.594 ^{ab}
severe stress تنش شدید	10910 ^d	15.75 ^c	19.50 ^d	13.25 ^c	18.75 ^c	9.08 ^c	86.58 ^d	5.183 ^a	0.578 ^b

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر صفت بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌داری ندارند. سطوح تنش آبی شامل آبیاری پس از ۵۰ (بدون تنش)، ۷۰ (تنش خفیف)، ۱۰۰ (تنش متوسط) و ۱۵۰ (تنش شدید) میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A است.

Means with similar letters in each trait are not significantly different ($P \leq 0.05$) based on LSD test. Dought stress levels includes irrigation after 50 mm (control), 70 mm (D1), 100 mm (D2) and 150 (D3) mm evaporation from pan class A.

جدول ۴- مقایسه میانگین اثر انواع مختلف خاک‌پوش بر صفات مورد بررسی در مارچوبه

Table 4. Mean comparison for effect of different types of mulch on measured traits in Asparagus

انواع مختلف خاک‌پوش Different types of mulch	عملکرد (تن در هکتار) Yield (ton/ha)	تعداد ساقه قابل برداشت (در بوته) Harvestable number of stems (per plant)	طول ساقه (سانتی‌متر) Stem length (cm)	قطر ساقه (میلی متر) Stem diameter (mm)	وزن تر ساقه (گرم) Stem fresh weight (gr)	وزن خشک ساقه (گرم) Stem dry weight (gr)	کلروفیل (میلی گرم بر ۱۰۰ گرم ماده خشک) Chlorophyll Content	پروترین Prolin content	کروتونئید Croteneid content
Control شاهد	6979 ^d	11.58 ^d	18.17 ^c	11.25 ^d	16.75 ^c	6.250 ^c	81.08 ^c	6.175 ^a	0.541 ^c
Plastic پلاستیک	12640 ^c	17.58 ^c	22.33 ^b	13.50 ^c	20.17 ^b	10.67 ^b	89.33 ^b	4.667 ^b	0.609 ^b

Barley straw کاه جو	14700 ^b	18.83 ^b	23.58 ^a	17.33 ^a	22.00 ^a	11.58 ^a	96.50 ^a	4.375 ^c	0.651 ^a
Asparagus کاه مارچوبه straw	15480 ^a	20.33 ^a	22.50 ^b	16.33 ^b	21.42 ^a	11.17 ^{ab}	89.75 ^b	4.425 ^c	0.597 ^b

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر صفت بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌داری ندارند.

Means with similar letters in each trait are not significantly different ($P \leq 0.05$) based on LSD test.


عملکرد ساقه تر

تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر تنش آبی و خاک‌پوش بر عملکرد ساقه تر در سطح ۱٪ معنی‌دار بود (جدول ۲). افزایش سطوح تنش خشکی اثر نزولی معنی‌داری بر عملکرد ساقه تر داشت، به‌طوری‌که بیشترین عملکرد ساقه تر (۱۴۴۱۰ تن در هکتار) در شرایط آبیاری نرمال و کمترین عملکرد (۱۰۹۱۰ تن در هکتار) در تنش شدید ثبت شد (جدول ۳).

استفاده از خاک‌پوش در شرایط بدون تنش باعث افزایش معنی‌دار در عملکرد ساقه تر شد، به‌طوری‌که کاه مارچوبه با ۷۶٪ افزایش در عملکرد ساقه تر نسبت به شاهد در اولین رتبه قرار داشت و پس از آن کاه جو و پلاستیک در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند (شکل ۱). همچنین خاک‌پوش باعث تقلیل اثرات کاهشی تنش آبی بر عملکرد شد، به‌طوری‌که عدم کاربرد خاک‌پوش در شرایط تنش خفیف، متوسط و شدید به ترتیب باعث کاهش ۲۱٪، ۳۶٪ و ۴۶٪ در عملکرد ساقه تر شد. اما کاربرد کاه مارچوبه به عنوان بهترین خاک‌پوش در شرایط تنش خفیف، متوسط و شدید به ترتیب باعث کاهش ۱۰٪، ۱۳٪ و ۱۶٪ در عملکرد ساقه تر گردید. نتایج اثر متقابل سطوح مختلف تنش آبی و انواع خاک‌پوش بر عملکرد ساقه تر معنی‌دار نشد (جدول ۲). این نتیجه نشان داد که با وجود استفاده از خاک‌پوش‌های مختلف، روند واکنش عملکرد ساقه تر به افزایش سطوح تنش آبی کم و بیش مشابه بود.

پژوهشگران با بررسی اثرات تنش آبی بر مارچوبه گزارش کردند که رشد شاخساره و عملکرد تحت تأثیر تنش خشکی کاهش معنی‌داری نشان داد (Zinkernagel & Kahlen, 2017). محققان علت کاهش رشد و عملکرد گیاه در زمان تنش آبی را به بسته شدن روزنه‌ها و کاهش انتقال دی اکسید کربن و در نتیجه کاهش کربوکسیلاسیون نوری و همچنین دلایل غیر روزنه‌ای مانند اختلال در واکنش‌های فسفوریلاسیون نوری نسبت داده‌اند (Piri et al., 2016).

بر اساس نتایج یک تحقیق، با استفاده از پلی اتیلن در بین ردیف‌های مارچوبه میانگین عملکرد از ۵/۲۷ تن در هکتار به ۶/۲۵ تن در هکتار رسید (Jakse & Kacjan Marsic, 2005). با توجه به تفاوت خاک‌پوش‌های مورد استفاده در مطالعه حاضر و همچنین گزارش‌های محققان، خاک‌پوش‌های حاصل از بقایای گیاهی (خاک‌پوش‌های آلی) با افزایش فراهمی عناصر غذایی مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم و دارا بودن ظرفیت تبادل کاتیونی بالا نسبت به خاک‌پوش‌های غیر آلی، مواد غذایی قابل جذب بیشتری را برای رشد گیاه فراهم می‌کنند و از طریق حفظ تعادل رطوبتی گیاه و کاهش مقاومت مزوفیلی و روزنه‌ای باعث بهبود فتوسنتز و عملکرد می‌شوند (Blaise et al., 2005). در مقابل، خاک‌پوش پلاستیکی به دلیل داشتن ظرفیت تبادل کاتیونی پایین و ناتوانی در تأمین عناصر غذایی مطلوب برای افزایش رشدی گیاه، فقط از طریق تولید سایه، افزایش رطوبت و کاهش دمای خاک، می‌تواند در مقایسه با تیمار شاهد باعث بهبود شرایط رشدی گیاه و همچنین جلوگیری از رشد علف‌های هرز بشود (Hamzehei et al., 2017).



شکل ۱- برهمکنش سطوح مختلف تنش خشکی و انواع خاکپوش بر عملکرد ساقه تر مارچوبه (حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD است)

Figure 1. The interaction of different levels of drought stress and types of mulch on the fresh stem yield of asparagus ((different letters indicate significant differences at the 5% probability level based on the LSD test


تعداد ساقه قابل برداشت

بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر تنش آبی و انواع مختلف خاکپوش بر تعداد ساقه قابل برداشت در سطح ۱٪ و اثر متقابل این دو فاکتور در سطح ۵٪ معنی دار بود. (جدول ۲). با افزایش تنش خشکی تعداد ساقه برداشت در بوته کاهش معنی داری نشان داد، به طوریکه بیشترین تعداد ساقه برداشت (با میانگین ۱۸/۹۲ ساقه در بوته) در شرایط آبیاری نرمال و کمترین آن (با میانگین ۱۵/۷۵ ساقه در بوته) در تنش شدید ثبت گردید (جدول ۳).

کاربرد تمامی خاکپوش‌های مورد استفاده در مطالعه حاضر باعث افزایش معنی دار تعداد ساقه قابل برداشت در مقایسه با شاهد گردید. در این میان، کاه مارچوبه (با میانگین ۲۰/۳۳ ساقه در بوته) بیشترین تاثیر را در افزایش این صفت و پلاستیک (با میانگین ۱۷/۵۸ ساقه در بوته) کمترین تاثیر را در افزایش این صفت داشت (جدول ۴). مقایسه میانگین برهمکنش سطوح مختلف تنش آبی و خاکپوش‌های مختلف نشان داد که کاربرد کاه مارچوبه در شرایط بدون تنش و نیز همه سطوح تنش آبی باعث بیشترین تعداد ساقه در بوته شد. به عبارت دیگر با استفاده از کاه مارچوبه، بالاترین تعداد ساقه قابل برداشت (میانگین ۲۱/۶۷ ساقه در بوته) در شرایط آبیاری نرمال و نیز عدم کاهش معنی دار این صفت در تنش آبی خفیف (میانگین ۲۰/۳۳ ساقه در بوته) و تنش آبی متوسط (میانگین ۲۰ ساقه در بوته) ثبت شد. همچنین کاربرد همه انواع خاکپوش باعث تقلیل اثرات تنش خشکی بر این صفت گردید (شکل ۲).

محققان به تاثیر منفی تنش آبی بر تعداد ساقه مارچوبه شامل ساقه‌های نیزه‌ای و ساقه‌های دارای برگ‌های شویدی اشاره کرده‌اند (Drost & Wilcox-Lee, 1997) که با نتایج پژوهش حاضر در مورد ساقه‌های نیزه‌ای همخوانی دارد. از طرف دیگر، نتایج مطالعه حاضر با نتایج یک تحقیق مبنی بر عدم تغییر معنی‌دار تعداد ساقه مارچوبه در اثر استفاده از خاک‌پوش پلی اتیلن مطابقت ندارد (Jakse & Kacjan, 2005).

محققان اظهار داشتند که استفاده از خاک‌پوش، دمای خاک را افزایش داده و از نوسانات دما در عمق ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتری خاک جلوگیری می‌کند. این امر موجب تسریع رشد ریشه شده و در نتیجه کارایی گیاه برای استفاده از مواد غذایی خاک بیشتر می‌شود و در شرایط تنش رطوبتی نیز از تحمل بالاتری برخوردار خواهد بود (Lamont & Bartol 2004). همچنین استفاده از خاک‌پوش از طریق افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک به طور غیر مستقیم نیز بر رشد گیاه تاثیر مثبت می‌گذارد (Chen et al., 1998). پژوهشگران با توجه به خطرات زیست محیطی استفاده از پلاستیک‌های پلی اتیلن در کشاورزی، خاک‌پوش کلس را به‌عنوان بهترین نوع خاک‌پوش معرفی کردند (Hamzehei et al., 2017).



شکل ۲- برهمکنش سطوح مختلف تنش خشکی و انواع خاک‌پوش بر تعداد ساقه قابل برداشت مارچوبه (حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD است)

Figure 2. The interaction of different levels of drought stress and types of mulch on the number of harvestable stem of asparagus (different letters indicate significant differences at the 5% probability level based on the LSD test)


طول و قطر ساقه

بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر تنش آبی و خاک‌پوش‌های مختلف و اثر متقابل این دو فاکتور بر طول و قطر ساقه مارچوبه در سطح ۱٪ معنی‌دار بود. (جدول ۲). با افزایش تنش خشکی طول و قطر ساقه مارچوبه کاهش معنی‌داری داشت، به‌طوری‌که در شرایط آبیاری نرمال

بیشترین طول (۲۴/۲۵ سانتیمتر) و قطر ساقه (۱۶/۳۳ میلیمتر) و در شرایط تنش شدید، کمترین طول (۱۹/۵۰ سانتیمتر) و قطر ساقه (۱۳/۲۵ میلیمتر) به ثبت رسید (جدول ۳). استفاده از خاکپوش اثر افزایشی معنی‌داری بر صفت طول و قطر ساقه داشت، که در این میان، کاه جو، کاه مارچوبه و پلاستیک در رتبه های اول تا سوم قرار داشتند (جدول ۴).


نتایج اثر متقابل تنش آبی و خاکپوش‌های مختلف بر طول ساقه نشان داد که در شرایط آبیاری نرمال تفاوت معنی‌داری بین استفاده و عدم استفاده از انواع خاکپوش وجود نداشت. اما استفاده از خاکپوش در شرایط تنش آبی، باعث تعدیل اثرات کاهش تنش گردید. به‌طوریکه تنش خفیف، متوسط و شدید در شرایط عدم کاربرد خاکپوش به ترتیب باعث کاهش ۵، ۶/۶۷ و ۱۰/۳۴ سانتیمتر در طول ساقه شد. اما با کاربرد کاه جو در شرایط تنش خفیف، متوسط و شدید به ترتیب کاهش ۱/۶۶، ۲/۳۳ و ۳ سانتیمتر در طول ساقه مشاهده گردید (شکل ۳). نتایج اثر متقابل تنش آبی و خاکپوش‌های مختلف بر قطر ساقه نشان داد که در شرایط آبیاری نرمال، فقط کاه جو و کاه مارچوبه توانستند باعث افزایش معنی‌دار قطر ساقه در مقایسه با شاهد (عدم کاربرد خاکپوش) شوند. اما در شرایط تنش آبی، همه انواع خاکپوش توانستند اثرات کاهش تنش بر قطر ساقه را تقلیل بدهند. به‌عبارت دیگر تنش خفیف، متوسط و شدید در شرایط عدم کاربرد خاکپوش به ترتیب باعث کاهش معنی‌دار ۳/۳۳، ۴/۶۷ و ۷ میلیمتری در قطر ساقه شد. اما با کاربرد کاه جو در شرایط تنش خفیف و متوسط قطر ساقه تغییر معنی‌داری نکرد و در شرایط تنش شدید آبی فقط ۱/۶۷ میلیمتر کاهش در قطر ساقه ایجاد شد (شکل ۴).

هم‌راستا با نتایج پژوهش حاضر، برخی محققین به اثر کاهش تنش آبی بر ارتفاع ساقه مارچوبه اشاره کرده‌اند (Drost & Wilcox, 1997). با کاهش مقادیر آب در گیاه و در نتیجه کاهش تورژسانس سلولی، سرعت تقسیم سلولی، حجم سلول‌های گیاهی، فرآیند ساخت دیواره سلولی و در نهایت اندازه کلی اندام‌های گیاه از جمله ارتفاع و سطح برگ کاهش می‌یابد (Earl & Davis, 2003). نتایج مطالعه حاضر در مورد پلاستیک، با گزارش برخی محققان مبنی بر عدم تغییر معنی‌دار قطر ساقه مارچوبه در اثر استفاده از خاکپوش پلی اتیلن مطابقت دارد (Jakse & Kacjan Marsic, 2005).



شکل ۳- برهمکنش سطوح مختلف تنش خشکی و انواع خاکپوش بر طول ساقه در مارچوبه (حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD است)

Figure 3. The interaction of different levels of drought stress and types of mulch on the stem length of asparagus (different letters indicate significant differences at the 5% probability level based on the LSD test)



شکل ۴- برهمکنش سطوح مختلف تنش خشکی و انواع خاکپوش بر قطر ساقه در مارچوبه (حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD است)

Figure 4. The interaction of different levels of drought stress and types of mulch on the stem diameter of asparagus (different letters indicate significant differences at the 5% probability level based on the LSD test)

وزن تر و خشک ساقه

تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر تنش آبی و خاکپوش بر وزن تر و خشک ساقه در سطح ۱٪ معنی‌دار بود. اثر متقابل تنش آبی و خاکپوش بر وزن تر ساقه در سطح ۱٪ و برای وزن خشک ساقه در سطح ۵٪ معنی‌دار گردید (جدول ۲). افزایش سطوح تنش خشکی اثر نزولی معنی‌داری بر وزن تر و خشک ساقه داشت، به‌طوری‌که بیشترین مقدار وزن تر و خشک ساقه (به ترتیب با میانگین ۲۱/۲۵ و ۱۱ گرم به ازای هر بوته) در شرایط آبیاری نرمال و کمترین مقدار این دو صفت (به ترتیب با میانگین ۱۸/۷۵ و ۹ گرم به ازای هر بوته) در تنش شدید ثبت شد (جدول ۳).


کاربرد تمامی خاکپوش‌های مورد استفاده در مطالعه حاضر باعث افزایش معنی‌دار وزن تر و خشک ساقه در مقایسه با شاهد گردید. در این میان، گاه‌جو از نظر افزایش این دو صفت در رتبه نخست قرار داشت که البته با گاه‌مارچوبه تفاوت معنی‌داری نداشت (جدول ۴). مقایسه

میانگین برهمکنش سطوح مختلف تنش آبی و خاکپوش‌های مختلف بر وزن تر ساقه نشان داد که استفاده از کاه مارچوبه و کاه جو باعث جلوگیری از کاهش معنی‌دار وزن تر ساقه در تمامی سطوح تنش آبی شد (شکل ۵).

نتایج اثر متقابل تنش آبی و خاکپوش‌های مختلف بر وزن خشک ساقه نشان داد که در شرایط آبیاری نرمال، کاه مارچوبه، کاه جو و پلاستیک به ترتیب توانستند باعث افزایش معنی‌دار وزن خشک ساقه در مقایسه با شاهد (عدم کاربرد خاکپوش) شوند. در شرایط تنش آبی نیز همه انواع خاکپوش توانستند اثرات کاهشی تنش بر وزن خشک ساقه را تقلیل بدهند. به عبارت دیگر تنش خفیف، متوسط و شدید در شرایط عدم کاربرد خاکپوش به ترتیب باعث کاهش معنی‌دار ۱۹/۹٪، ۲۹٪ و ۴۱/۶٪ در وزن خشک ساقه شد. اما با کاربرد کاه مارچوبه در شرایط تنش خفیف، متوسط و شدید، وزن خشک ساقه به ترتیب ۱۳٪، ۱۵/۸٪ و ۱۸/۴٪ کاهش یافت (شکل ۶).


تنش خشکی از طریق کاهش محتوای کلروفیل و کربوهیدرات‌های مارچوبه می‌تواند باعث کاهش کمیت و کیفیت ساقه‌های خوراکی مارچوبه بشود (Pressman *et al.*, 1989). نتایج تحقیق حاضر با نتایج یک تحقیق دیگر مبنی بر کاهش معنی‌دار رشد شاخساره مارچوبه در اثر تنش خشکی همخوانی دارد (Zinkernagel & Kahlen, 2017). با افزایش شدت تنش خشکی فتوسنتز خالص کاهش و تنفس گیاه افزایش می‌یابد (Rafiee Manesh *et al.*, 2010). در نتیجه استفاده از آسیمیلات‌های فتوسنتزی برای افزایش رشد رویشی کاهش می‌یابد (Earl & Davis, 2003).

بر اساس گزارش محققان با استفاده از پلی اتیلن در بین ردیف‌های مارچوبه، میانگین وزن تر ساقه از ۳۸/۱۵ گرم به ۴۰/۸۸ گرم افزایش یافت (Jakse & Kacjan Marsic, 2005). خاکپوش‌های حاصل از بقایای گیاهی از طریق کاهش تبخیر از سطح خاک و ایجاد خرد اقلیم مرطوب در اطراف گیاه باعث افزایش ذخیره آب خاک و افزایش شاخص‌های رشدی گیاه می‌شوند (Goel *et al.*, 2019). بر اساس نظر وو و همکاران (Wu *et al.* 2018) خاکپوش‌های گیاهی با فراهمی عناصر غذایی پر مصرف برای گیاه از جمله نیتروژن، فسفر و پتاسیم باعث بهبود شرایط رشدی گیاه می‌شوند. همچنین یکی دیگر از دلایل برتری خاکپوش‌های گیاهی نسبت به خاکپوش پلی اتیلن، تبادل بیشتر اکسیژن و دی اکسید کربن بین فضای بیرون و داخل خاک است (Steinmetz *et al.*, 2016; Shahzad *et al.*, 2019). با توجه به خصوصیات گیاه مارچوبه، رشد مناسب ریشه در اثر تنفس کافی و جذب مواد غذایی، منجر به تولید ساقه‌های بیشتر می‌شود (Grubben & Denton, 2004) و لذا در مطالعه حاضر، تاثیر بیشتر خاکپوش‌های گیاهی در مقایسه با خاکپوش پلاستیکی روی شاخص‌های رشدی گیاه را می‌توان به این دلایل نسبت داد.



شکل ۵- برهمکنش سطوح مختلف تنش خشکی و انواع خاک‌پوش بر وزن تر ساقه در مارچوبه (حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD است)

Figure 5. The interaction of different levels of drought stress and types of mulch on the stem fresh weight of asparagus (different letters indicate significant differences at the 5% probability level based on the LSD test)



شکل ۶- برهمکنش سطوح مختلف تنش خشکی و انواع خاک‌پوش بر وزن خشک ساقه در مارچوبه (حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD است)

Figure 6. The interaction of different levels of drought stress and types of mulch on the stem dry weight of asparagus (different letters indicate significant differences at the 5% probability level based on the LSD test)


میزان کلروفیل

نتایج تجزیه واریانس حاکی از معنی‌دار بودن اثر تنش آبی، خاک‌پوش‌های مختلف و اثر متقابل این دو فاکتور بر میزان کلروفیل مارچوبه در سطح ۱٪ معنی‌دار بود. (جدول ۲). با افزایش شدت تنش خشکی میزان کلروفیل برگ کاهش معنی‌داری نشان داد، به‌طوری‌که بیشترین محتوای کلروفیل (با میانگین ۹۲/۰۸ میلی‌گرم بر ۱۰۰ گرم ماده خشک) در شرایط آبیاری نرمال و کمترین آن (با میانگین ۸۶/۵۸ میلی‌گرم بر ۱۰۰ گرم ماده خشک) در تنش شدید ثبت گردید (جدول ۳).

استفاده از خاک‌پوش اثر افزایشی معنی‌داری بر میزان کلروفیل برگ داشت که در این میان، کاه جو (با ۱۹٪ افزایش)، کاه مارچوبه (با ۱۰/۷٪ افزایش) و پلاستیک (با ۱۰/۳٪ افزایش) در رتبه‌های اول تا سوم قرار داشتند که البته کاه مارچوبه و پلاستیک از این نظر تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند (جدول ۴).

بررسی اثر متقابل تنش آبی و خاک‌پوش‌های مختلف نشان داد که همه انواع خاک‌پوش باعث افزایش معنی‌داری محتوای کلروفیل در شرایط آبیاری نرمال شدند. در تیمار کاه جو، محتوای کلروفیل در همه سطوح تنش آبی کاهش معنی‌داری نسبت به شرایط آبیاری نرمال پیدا نکرد. سایر خاک‌پوش‌ها نیز باعث تقلیل اثرات کاهش‌ی تنش آبی بر محتوای کلروفیل شدند (شکل ۷).

بر اساس گزارش پرسمن و همکاران (Pressman *et al.*, 1989) تنش خشکی باعث کاهش محتوای کلروفیل در مارچوبه شد و با افزایش زمان تنش خشکی، روند نزولی معنی‌داری در محتوای کلروفیل مشاهده شد. در شرایط تنش آبی، رنگیزه‌ها و پلاستیدها در اغلب گیاهان آسیب می‌بینند و با کاهش ضخامت تیلاکوئیدها و کاهش کلروفیل، میزان فتوسنتز کم می‌شود (Follows & Boyer, 1996). همچنین فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز، کلروپیلاز و ترکیبات فنلی می‌تواند یکی دیگر از دلایل کاهش غلظت کلروفیل در شرایط تنش خشکی باشد (Ashraf *et al.*, 1994). لذا همانطور که در تحقیق حاضر مشاهده شد، حفظ رطوبت خاک از طریق استفاده از خاک‌پوش می‌تواند باعث جلوگیری از کاهش کلروفیل و حفظ فتوسنتز و رشد گیاه شود. نتایج این تحقیق مبنی بر تعدیل اثرات کاهش‌ی تنش خشکی روی محتوای کلروفیل در اثر استفاده از خاک‌پوش، با یافته‌های بهزاد نژاد و همکاران (Behzad Nejad *et al.*, 2018) در مورد کنگد مطابقت داشت.



شکل ۷- برهمکنش سطوح مختلف تنش خشکی و انواع خاکپوش بر میزان کلروفیل در مارچوبه (حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD است)

Figure 7. The interaction of different levels of drought stress and types of mulch on the amount of chlorophyll of asparagus (different letters indicate significant differences at the 5% probability level based on the LSD test)


میزان پرولین

تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تنش آبی، خاکپوش و اثر متقابل این دو فاکتور بر میزان پرولین در سطح ۱٪ معنی دار بود (جدول ۲). تنش خشکی باعث افزایش معنی دار میزان پرولین نسبت به شرایط بدون تنش شد. بیشترین میزان پرولین (۵/۱۸ میکرومول بر گرم وزن تر) در شرایط تنش شدید و کمترین میزان پرولین (۴/۶۵ میکرومول بر گرم وزن تر) در شرایط آبیاری نرمال ثبت شد و بین میزان پرولین در تنش خفیف و متوسط تفاوت معنی داری وجود نداشت (جدول ۳). کاربرد تمامی خاکپوش های مورد استفاده در مطالعه حاضر باعث کاهش معنی دار میزان پرولین در مقایسه با شاهد گردید. در این میان، کاه جو، کاه مارچوبه و پلاستیک در رتبه های اول تا سوم قرار داشتند که البته کاه جو و کاه مارچوبه از این نظر تفاوت معنی داری با هم نداشتند (جدول ۴).

نتایج اثر متقابل تنش آبی و خاکپوش نشان داد که کاه جو و کاه مارچوبه باعث کاهش معنی دار میزان پرولین در شرایط آبیاری نرمال و نیز جلوگیری از افزایش معنی دار پرولین در تمامی سطوح تنش (در مقایسه با شرایط بدون تنش) شده اند (شکل ۸).

در اکثر گیاهان میزان پرولین تحت تنش های زیستی و غیر زیستی افزایش می یابد (Tan et al., 2008). از جمله نقش های فیزیولوژیکی متعدد پرولین می توان به نقش آن به عنوان تنظیم کننده اسمزی و محافظت کننده از آنزیم های سیتوپلاسمی و ساختمان غشا اشاره کرد (Levitt, 1980). تنش خشکی باعث کاهش پتانسیل آب خاک می شود لذا گیاه با تجمع ترکیبات اسمزی مانند پرولین و کربوهیدرات های محلول، پتانسیل اسمزی خود را کاهش داده و به عبارتی دیگر تنظیم اسمزی صورت می گیرد تا جذب آب ادامه یابد. در فرایند تنظیم اسمزی تورژسانس در شرایط تنش خشکی ادامه می یابد (Ashraf, 2010). از نتایج پژوهش حاضر این گونه استنباط می شود که استفاده از خاکپوش

در تمامی سطوح تنش آبی شرایط رطوبتی گیاه را تعدیل و میزان پرولین تولید شده را که تحت شرایط تنش به تنهایی افزایش چشمگیر می‌یابد کمتر کرده است.



شکل ۸- برهمکنش سطوح مختلف تنش خشکی و انواع خاک‌پوش بر میزان پرولین در مارچوبه (حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD است)


Figure 8. The interaction of different levels of drought stress and types of mulch on the amount of prolin of asparagus (different letters indicate significant differences at the 5% probability level based on the LSD test)

میزان کاروتنوئیدها

تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر تنش آبی، خاک‌پوش‌های مختلف و اثر متقابل این دو فاکتور بر میزان کاروتنوئیدهای مارچوبه در سطح ۱٪ معنی‌دار بود. (جدول ۲). بر اساس نتایج مقایسه میانگین محتوای کاروتنوئیدها تحت تأثیر تنش آبی خفیف و متوسط قرار نگرفت و این صفت فقط در تنش آبی شدید کاهش معنی‌داری نسبت به شاهد پیدا کرد (جدول ۳). استفاده از همه انواع خاک‌پوش اثر افزایشی معنی‌داری بر میزان کاروتنوئیدها داشت که در این میان، کاه جو (با میانگین افزایش ۱۶/۸٪ نسبت به شاهد) در رتبه نخست قرار داشت (جدول ۴). نتایج برهمکنش تنش آبی و خاک‌پوش نشان داد که استفاده از خاک‌پوش در شرایط بدون تنش آبی، تأثیر معنی‌داری روی محتوای کاروتنوئیدها نداشت، اما در شرایط تنش آبی همه انواع خاک‌پوش توانستند باعث جلوگیری از کاهش معنی‌دار محتوای کاروتنوئیدها در تمامی سطوح تنش شوند (شکل ۹).

برخی محققان به تأثیر کاهشی تنش خشکی بر محتوای کاروتنوئیدهای گیاهان اشاره کرده‌اند (Ghorbanali *et al.*, 2012; Zahedi *et al.*, 2019). شرایط تنشی می‌تواند باعث افزایش گونه‌های فعال اکسیژن در سلول بشود. لذا کاهش محتوای کاروتنوئیدها می‌تواند به

دلیل اکسید شدن آنها توسط اکسیژن فعال و آسیب به ساختار آنها باشد (Follows & Boyer, 1996). پس حفظ رطوبت خاک به دلیل استفاده از خاکپوش موجب جلوگیری از آسیب دیدن رنگیزه‌ها می‌شود. در این تحقیق افزایش میزان کاروتنوئیدها در اثر کاربرد خاکپوش، نشان دهنده موثر بودن آن در شرایط تنش آبی است.



شکل ۹- برهمکنش سطوح مختلف تنش خشکی و انواع خاکپوش بر میزان کاروتنوئیدها در مارچوبه (حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD است)

Figure 8. The interaction of different levels of drought stress and types of mulch on the amount of carotenoids of asparagus (different letters indicate significant differences at the 5% probability level based on the LSD test)

نتیجه گیری نهایی

تنش آب بعنوان مهم‌ترین عامل محدودیت فیزیولوژیک در گیاه، رشد و نمو و عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد ساقه تر، تعداد ساقه قابل برداشت، طول ساقه، قطر ساقه، وزن تر و خشک ساقه و میزان کلروفیل کل برگ در سطوح مختلف تنش آبی کاهش و میزان پرولین افزایش معنی‌داری داشت. محتوای کاروتنوئیدها نیز فقط در تنش آبی شدید کاهش معنی‌داری نسبت به شاهد پیدا کرد. استفاده از خاکپوش در شرایط بدون تنش باعث افزایش معنی‌دار تمامی صفات مورد مطالعه به جز پرولین شد، به‌طوری‌که کاه مارچوبه با ۷۶٪ افزایش در عملکرد ساقه تر نسبت به شاهد در اولین رتبه قرار داشت و پس از آن کاه جو و پلاستیک در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند. همچنین خاکپوش باعث تقلیل اثرات منفی تنش آبی بر تمامی صفات شد، به‌طوری‌که عدم کاربرد خاکپوش در شرایط تنش خفیف، متوسط و شدید به ترتیب باعث کاهش ۲۱٪، ۳۶٪ و ۴۶٪ در عملکرد ساقه تر شد. اما کاربرد کاه مارچوبه به عنوان بهترین خاکپوش در شرایط تنش خفیف، متوسط و شدید به ترتیب باعث کاهش ۱۰٪، ۱۳٪ و ۱۶٪ در عملکرد ساقه تر گردید. لذا توصیه

می‌شود با توجه به شرایط اقلیمی کم باران در کشورمان، از خاک‌پوش حاصل از بقایای گیاهی بویژه کاه مارچوبه در بین ردیف‌های کشت مارچوبه استفاده شود. چرا که این نوع خاک‌پوش می‌تواند باعث افزایش عملکرد در شرایط بدون تنش خشکی بشود و در شرایط تنش خشکی نیز عملکرد را تا حد زیادی از اثرات منفی تنش مصون نگه دارد.

References

1. Alami-Milani, M., Amini, R., Dabbagh Mohammadinasab, A., Shafaghkhalvanegh, J., Asgharzade, A., & Emaratpardaz, J. (2013). Yield and yield components of lentil (*Lens culinaris* Medick.) affected by drought stress and mulch. *International Journal of Agriculture and Crop Sciences*, 5(11), 1228-1231.
2. Amiri Rodan, M., Hassandokht, M. R., Sadeghzadeh-Ahari, D., & Mousavi, A. (2020). Mitigation of drought stress in eggplant by date straw and plastic mulches. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 19(7), 492-498. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2020.09.006>
3. Arnon, A. N. (1967). Method of extraction of chlorophyll in the plants. *Agronomy Journal*, 23, 112-121.
4. Ashraf, M. Y., Azim, A. R., Khan, A. H., & Ala. S. A. (1994). Effect of water stress on total phenols, peroxidase activity and chlorophyll content in wheat (*Triticum aestivum* L.). *Acta Physiologia Plantarum*, 16, 185-191.
5. Ashraf, M. (2010). Inducing drought tolerance in plants: some recent advances. *Biotechnology Advances*, 28(1), 169-183. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2009.11.005>
6. Bates, L. S., Waldren, R. P., & Teare, I. D. (1973). Rapid determination of free proline for water-stress studies. *Plant and Soil. Short Communication*, 39, 205-207. <https://doi.org/10.1007/BF00018060>
7. Behzad Nejad, J., Tahmasebi Sarvestani, Z., Aien, A., & Mokhtassi Bidgoli, A. (2018). Effect of Drought Stress and Straw Mulch of Wheat on Morpho-Physiological Characteristics of Sesame. *Journal of Crop Ecophysiology*, 12(3), 393-410. (In Persian with English abstract).
8. Blaise, D., Bonde, A. N., & Chaudhary, R. S. (2005). Nutrient uptake and balance of cotton plus pigeonpea strip intercropping on rainfed vertisols of central India. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, 73, 135-145. <https://doi.org/10.1007/s10705-005-0073-5>
9. Campi, P., Mastrorilli, M., Stellacci, A. M., Modugno, F., & Palumbo, A. D. (2019). Increasing the effective use of water in green asparagus through deficit irrigation strategies. *Agricultural Water Management*, 217, 119-130. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.02.039>
10. Chen, X. S., Guo, S. F., Wang, J. K. & Zhang, J. (1998). Effect of mulching cultivation with plastic film on soil microbial population and biological activity. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 9, 435-439.
11. Drost, D., & Wilcox-Lee, D. (1997). Soil water deficits and asparagus: I. Shoot, root, and bud growth during two seasons. *Scientia Horticulturae*, 70, 131-143. [https://doi.org/10.1016/S0304-4238\(97\)00041-1](https://doi.org/10.1016/S0304-4238(97)00041-1)
12. Earl, H. J., & Davis, R. F. (2003). Effect of drought stress on leaf and canopy whole radiation use efficiency and yield of maize. *Agronomy Journal*, 95, 688-696. <https://doi.org/10.2134/agronj2003.6880>
13. Follows, R. J., & Boyer, J. S., (1996). Structure and activity of chloroplast of sunflower. Leaves having various water potentials. *Planta*, 132, 229-239. <https://doi.org/10.1007/BF00399722>
14. Ghanbari, M., Modares-Sanavy, S. A. M., & Mokhtassi-Bidgoli, A. (2018). *Mulch*. Research & Innovation Center, ETKA Organization Press, 158 pp. (In Persian).

15. Ghanbari, M., Mokhtassi-Bidgoli, A., Zanganeh, Z., & Ghanaei-Pashaki, K. M. (2021). The effect of organic mulch on morpho-physiological and biochemical characteristics of forage sorghum (*Sorghum bicolor* L.) in response to different irrigation regimes. *Journal of Crop Science Research in Arid Regions*, 3(1), 77-95. (In Persian with English abstract).
16. Ghorbanali, M., Bakhshi Khaniki, Gh., & Zakeri, A. (2012). Investigation on the effects of water stress on antioxidant compounds of *Linum usitatissimum* L. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants*, 27(4), 647-658. (In Persian with English abstract).
17. Goel, L., Shankar, V. & Sharma, R. K. (2019). Investigations on effectiveness of wheat and rice straw mulches on moisture retention in potato crop (*Solanum tuberosum* L.). *International Journal of Recycling Organic Waste in Agriculture*, 8, 345-356. <https://doi.org/10.1007/s40093-019-00307-6>
18. Grubben, G., & Denton, O. (2004). Plant resources of tropical Africa. *Nordic Journal of Botany*, 23, 298.
19. Hamzehei, J., Abbasi, H., & Vaziri Amjad, Z. (2017). The effect of different mulches on yield, yield components of maize and weed dry weights. *Journal of Agriculture Improvement*, 19(1), 105-117. (In Persian with English abstract).
20. Irshad, M., Ullah, F., Fahad, S., Mehmood, S., Ullah Khan, A., Brtnicky, M., Kintl, A., Holatko, J., Irshad, I. El-Sharnouby, M., El Sabagh, A., Datta, R., & Danish, S. (2021). Evaluation of *Jatropha curcas* L. leaves mulching on wheat growth and biochemical attributes under water stress. *BMC Plant Biology*, 21(1), 303-315. <https://doi.org/10.1186/s12870-021-03097-0>
21. Jakse, M., & Kacjan Marsic, N. (2005). Comparison of asparagus (*Asparagus officinalis* L.) cultivars and the effect of covering beds. *Acta Agriculturae Slovenica*, 85(2), 313-320.
22. Kirigwi, F. M., Van Ginkel, M., Trethowan, R., Seaes, R. G., Rajaram, S. & Paulsen, G. M. (2004). Evaluation of selection strategies for wheat adaptation across water regimes. *Euphytica*, 135, 361-371. <https://doi.org/10.1023/B:EUPH.0000013375.66104.04>
23. Kouchaki, A., Hoseini, M., & Hashemi Dezfooli, A. (2000). *Sustainable Agriculture*. Mashhad University, Jahad Publications, Iran. 162 pp. (In Persian).
24. Lamont, W. J., & Bartol, J. W. (2004). *Production of vegetables, strawberries, and cut flowers using plasticulture*. Natural Resource, Agriculture, and Engineering Service (NRAES). Ithaca. 156 pp.
25. Levitt, j. (1980). *Responses of Plant Environmental Stresses*. Vol(2). Water, Radiation, Salt and other Stresses. Academic Press. 324 pp.
26. Manach, C., Scalbert, A., Morand, C., Remesy, C. & Jimenez, L. (2004). Polyphenols: food sources and bioavailability. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 79(5), 727-747. <https://doi.org/10.1093/ajcn/79.5.727>
27. Mousavizadeh, S. J., Gil, J., Castro P., Hassandokht, M. R., & Moreno, R. (2021). Genetic diversity and phylogenetic analysis in Asian and European Asparagus subgenus species. *Genetic Resources and Crop Evolution*. 68: 3115- 3124. <https://doi.org/10.1007/s10722-021-01262-w>
28. Naghdi Badi, H., Qavami, N., Mehrafarin, A., & Qaderi, A. (2011). A Review on Garden Asparagus (*Asparagus officinalis* L.) as a Medicinal and Multipurpose Plant. *Journal of Medicinal Plants*, 10 (39), 1-13. (In Persian with English abstract).
29. Negi, J. S., Singh, P., Joshi, G. P., Rawat, M. S., & Bisht, V. K., (2010). Chemical constituents of asparagus. *Pharmacognosy Reviews*, 4(8), 215-220. <https://doi.org/10.4103/0973-7847.70921>

30. Nie, L., Wang, M., & Liu, Y. (2007). Effect of different mulch methods on growth and early yield of green asparagus. https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-NMGM200703016.htm
31. Niziolowski, J. C., Simmons, R. W., Rickson, R. J. & Hann, M. J. (2020). Efficacy of mulch and tillage options to reduce runoff and soil loss from asparagus interrows. *Catena*, 191, 104557. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104557>
32. Piri, H., Ansari, H. & Parsa, M. (2016). Quantitative and qualitative performance of forage sorghum at different salinity and irrigation water levels in subsurface diameter irrigation system. *Journal of Water Research in Agriculture*, 30(4), 467-482. (In Persian with English abstract).
33. Pressman, E., Schaffer, A. A., Compton, D., & Zamski, E. (1989). The effect of low temperature and drought on the carbohydrate content of asparagus. *Journal of Plant Physiology*, 134, 209-213. [https://doi.org/10.1016/S0176-1617\(89\)80057-4](https://doi.org/10.1016/S0176-1617(89)80057-4)
34. Rafiee Manesh, S., Ayenehband, A., & Nabati Ahmadi, D. (2010). The effect of different levels of irrigation and withholding irrigation on grain yield and yield components of Corn hybrid S.C.704 under Ahvaz condition. *Crop Physiology Journal*, 2(7), 93-105. (In Persian with English abstract).
35. Shahriari, S., Aziz, M., Aroiee, H., & Ansari, H. (2013). Effect of different irrigation levels and mulch application on growth parameters and essential oil content of peppermint (*Mentha piperita* L.). *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants*, 29(3), 568-582. (In Persian with English abstract).
36. Shahzad, K., Bary, A. I., Collins, D. P., Chalker-Scott, L., Abid, M., Sintim, H. Y. & Flury, M. (2019). Carbon dioxide and oxygen exchange at the soil-atmosphere boundary as affected by various mulch materials. *Soil and Tillage Research*, 194, 104335. <https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104335>
37. Short, W. (2021). *The effect of drought stress and decreasing day lengths on the acquisition of freezing tolerance in asparagus (Asparagus officinalis L.) under controlled conditions*. M.Sc. Thesis, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada
38. Steinmetz, Z., Wollmann, C., Schaefer, M., Buchmann, C., David, J., Troger, J., Munoz, K., Fror, O. & Schaumann, G. E. (2016). Plastic mulching in agricultura. Trading short-term agronomic benefits for long-term soil degradation? *Science of the Total Environment*, 550, 690-705. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.153>
39. Tan, J., Zhao, H., Hong, J., Han, Y., Li, H. & Zhao, W. (2008). Effects of exogenous nitric oxide on photosynthesis, antioxidant capacity and proline accumulation in wheat seedlings subjected to osmotic stress. *World Journal of Agricultural Sciences*, 4(3), 307-313.
40. Wilson, D. R., Sinton, S. M., & Fraser-Kevern, H. A. (1996). Irrigation response of established asparagus. *Acta Horticulturae*, 415, 333-341. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1996.415.47>
41. Wu, X. H., Wang, W., Xie, X. L., Yin, C. N., & Hou, H. J. (2018). Effects of rice straw mulching on N₂O emissions and maize productivity in a rain-fed upland. *Environmental Science and Pollution Research*, 25, 6407-6413. <https://doi.org/10.1007/s11356-017-0989-8>
42. Zahedi, M., Hosseini, M. S., Karimi, M. (2019). The effects of drought stress and brassinosteroid solution spray on some morphological, physiological and biochemical characteristics of wild pear (*Pyrus bioisieriana* Buhse. *Journal of Plant Process and Function*, 8(29), 181-192. (In Persian with English abstract).
43. Zinkernagel, J., & Kahlen, K. (2017). Water relations of asparagus crop under different water supply and implications for plant-based irrigation scheduling. *Acta Horticulturae*, 1150, 385- 390. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1150.54>

نسخه پیلز انتشار