



## مقایسه مواد معدنی و ترکیبات زیست فعال شش گونه سبزی در مرحله میکروگرین در دو سیستم آبکشت و کشت خاکی

لاله پورشاه آبادی<sup>۱</sup> - سید حسین میردهقان<sup>۲\*</sup> - حمیدرضا رosta<sup>۳</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

### چکیده

میکروگرین‌ها مرحله‌ای از رشد سبزی‌ها هستند که به واسطه داشتن ارزش غذایی بالا محبوبیت خاصی در بین مصرف کنندگان پیدا کرده‌اند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر مرحله رشد گیاه (میکروگرین و برگ‌های بالغ) در سیستم‌های کشت (آبکشت و کشت خاکی) بر ویژگی‌های رشدی نظری وزن تر و خشک اندام هواپی، وزن تر و خشک ریشه و سطح برگ، ترکیبات زیست فعال شامل کلروفیل، کاروتونئید، ترکیبات فنلی، فعالیت ضد-اکسیدانی، ویتامین ث، و عناصر معدنی شش نوع سبزی (ریحان سبز، ریحان بنفش، کاهو، تربچه، شوید و گشنیز) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که خصوصیات رشدی در تمام سبزی‌ها به جز تربچه و شوید؛ ترکیبات فنلی و فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ سبزی‌های کاهو، تربچه و گشنیز؛ محتوای ویتامین ث (در هر دو شرایط کشت خاکی و آبکشت) در تمام سبزی‌ها به جز شوید و گشنیز و محتوای تمام عناصر معدنی اندازه‌گیری شده (سفره، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، آهن، روی، منگنز و مس) به جز عنصر روی در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ بیشتر بود. بر اساس نتایج این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت که تولید و پرورش گیاهان در مرحله میکروگرین می‌تواند به عنوان یک روش مناسب با ارزش غذایی بالا، مورد توجه پرورش-دهندگان سبزی قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: ترکیبات فنلی، عناصر معدنی، فعالیت ضد اکسیدانی، کاروتونئید

### شیوه‌های جدیدی در کشت، نحوه ارائه به بازار و مصرف سبزی‌ها

در جهان وجود دارد که یکی از این شیوه‌ها پرورش و عرضه میکروگرین‌ها است. میکروگرین مرحله‌ای از رشد گیاه است که قسمت‌های قابل استفاده آن شامل ساقه، لپه‌ها و دو برگ حقیقی می‌باشد و ارتفاع آن‌ها به سه الی هشت سانتی‌متر می‌رسد (۲۹). گزارش شده است که میکروگرین‌ها به دلیل تنوع در رنگ، شکل، عطر و طعم سبب ایجاد تنوع در وعده‌های غذایی انسان می‌گردد. برداشت سبزی‌ها در مرحله میکروگرین به دلیل ارزش غذایی بالا و داشتن ویتامین‌های مختلف (C، K<sub>1</sub> و B<sub>9</sub>)، کاروتونئیدها (لوتین، ویلوزانتین، زاکسانتین و بتاکاروتون) و ترکیبات فنلی بیشتر نسبت به مرحله بالغ از اهمیت بسیاری برخوردار است (۲۹). طی بررسی انجام شده روی گیاه ماش و سویا مقدار ویتامین C و کاروتونئید در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ در هر دو گیاه بیشتر بود (۴). همچنین گزارش شده است که مقدار فعالیت ضد اکسیداسیونی ۲۵ گونه گیاهی در مرحله میکروگرین در مقایسه با مرحله برداشت استاندارد (گیاهان بالغ) حدود ۱۰ برابر بالاتر می‌باشد (۳). همچنین در مورد کلم قرمز مقدار ویتامین C و K در مرحله میکروگرین در مقایسه با مرحله بالغ به ترتیب حدود شش، ۴۰۰ و ۶۰ برابر بیشتر

سبزی‌ها گیاهان بسیار ارزشمندی هستند که قسمت‌های مختلف آن‌ها مانند برگ، غنچه، ساقه، ریشه، غده، پیاز، گل، میوه و دانه به صورت خام، پخته، خشک شده، پودر شده، بخزده و یا کنسرو شده در تغذیه انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند (۸). امروزه از سبزی‌ها در تغذیه روزمره استفاده فراوان می‌شود به طوری که براساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی مقدار سرانه مصرف سبزی در دنیا از ۲۰۰ گرم به ۴۰۰ گرم در روز افزایش یافته است (۵). سبزی‌ها همچنین به دلیل دارا بودن آب و الکترولیت‌های قلایابی (کمک به حفظ تعادل اسید و باز بدن)، املاح معدنی، انواع مختلفی از ویتامین‌ها (ویتامین‌های C، A، D و B)، فیبر و رنگدانه‌ها (کلروفیل و کاروتونئید) و ترکیبات فنلی که نقش ضد اکسیداسیونی در گیاه ایفا می‌کنند، حائز اهمیت هستند (۷).

۱۸ گلدان به منظور برداشت در مرحله بلوغ بذر سبزی‌ها مورد نظر کشت شد و در ۳۶ گلدان آبکشت نیز به همین ترتیب عمل شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل: سه فاکتور، شرایط کشت (کشت خاکی و آبکشت) به عنوان فاکتور اول و نوع سبزی (ریحان سبز، ریحان بنفش، کاهو، تربچه، شوید و گشنیز) به عنوان فاکتور دوم و مرحله رشد سبزی شامل میکروگرین و بالغ به عنوان فاکتور سوم با سه تکرار اجرا گردید. در این آزمایش گیاهان در شرایط کشت خاکی روزانه در دو نوبت با آب مقطر آبیاری شدند و سبزی‌ها در شرایط آبکشت با محلول غذایی نیم هوگلندر در دو نوبت تغذیه شدند.

در پایان هر مرحله برداشت، صفات رویشی و کیفی همچون وزن تر و خشک ریشه (برای مقایسه میزان توسعه ریشه در دو سیستم کشت خاکی و آبکشت)، وزن تر و خشک اندام هوایی، سطح برگ، ترکیبات فنلی، ویتامین C، مقدار کلروفیل کل، فعالیت ضدآسیداسیونی، عناصر معدنی پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن، روی، منگنز و مس اندازه‌گیری شدند.

### خصوصیات رشدی

ده روز پس از جوانه‌زنی برای هر گونه سبزی اندام هوایی هر دانه‌ال در داخل گلدان از محل طوفه جدا شد و سپس وزن تر هر کدام به صورت جداگانه با ترازو اندازه‌گیری شدند (تعداد ۲۰-۳۰ گیاه از هر گلدان اندازه‌گیری شد و سپس میانگین وزن آن‌ها محاسبه گردید). برای اندازه‌گیری وزن خشک، نمونه‌ها را داخل پاکت کاغذی گذاشته و به مدت ۴۸ ساعت در آون با دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد قرار داده و دوباره وزن شدند و وزن خشک آن‌ها بدست آمد. سطح برگ نیز بعد از برداشت توسط دستگاه سنجش سطح برگ (CI-202, USA) اندازه‌گیری شد.

### ویتامین ث

برای اندازه‌گیری مقدار اسید آسکوربیک از روش دیپتو و همکاران (۱۹۹۹) استفاده شد. شدت جذب در طول موج ۵۲۵ نانومتر قرائت شد. استاندارد، محلولی حاوی ۳۰۰ میکرولیتر متافسفویریک اسید ۵ درصد بود. برای محاسبه غلظت از منحنی استاندارد آسکوربیک اسید استفاده شده و میزان آن بر حسب وزن خشک محاسبه گردید.

### کلروفیل و کاروتینوئید کل

برای اندازه‌گیری کلروفیل کل و کارتنوئیدها از روش لیچتالر (۱۹۸۷) استفاده شد. میزان جذب نور محلول‌های به دست آمده با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر (مدل UV/VIS T80) ساخت کشور چین) در طول موج‌های ۴۷۰، ۶۴۶، ۶۵۲ و ۶۶۳ نانومتر قرائت گردید.

است (۲۹).

تولید میکروگرین در محیط رشد مناسب که عناصر غذایی مناسب و کافی را برای رشد گیاهی فراهم می‌کند، لازم و ضروری است (۱۰). از طرف دیگر به دلیل حساس بودن مراحل رشد اولیه به فعالیت‌های میکروبی، کشت سبزی‌ها در محیط عاری از عوامل بیماری‌زا، نقش مهمی در حفظ کیفیت و بازارسازی محصولات ایفا می‌کند (۳۰). کشت آبکشت (آبکشت) گیاهان، یک راه کار منطقی برای رسیدن به این هدف می‌باشد و حتی در بعضی موارد، جایگزین خوبی برای کشت خاکی بوده است. سیستم آبکشت یکی از روش‌های کاشت گیاهان می‌باشد که به دلیل کارآیی مصرف آب بسیار مورد توجه تولیدکنندگان سبزی‌های گلخانه‌ای قرار گرفته است (۳۰). مزایای فوق العاده کشت‌های آبکشت در تولید میزان بالای محصول به همراه کیفیت و کمیت بالا می‌باشد که سال‌هاست دانشمندان به اهمیت آن بی‌برده‌اند. همچنین از مزیت‌های دیگری که تولید در شرایط آبکشت نسبت به کشت خاکی دارد می‌توان به کاهش عوامل بیماری‌زا اشاره نمود و همچنین با تغییر در محلول غذایی می‌توان کیفیت محصول را افزایش داد (۱۶). گزارش شده است که ویژگی‌های عملکردی، کیفیت و رشدی گیاه کدو در شرایط آبکشت به طور معنی‌داری نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود (۲۱). همچنین گزارش شده است که مقدار ترکیبات فلی ارقام مختلف ریحان در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط کشت آبکشت در تمام ارقام بیشتر بود (۲۲). این پژوهش به منظور ارزیابی تولید میکروگرین برخی از سبزی‌های برگی در شرایط کشت خاکی و آبکشت می‌باشد. همچنین مقایسه برخی از ویژگی‌های رشد، ترکیبات زیست فعال و مقدار عناصر معدنی برگ سبزی‌ها در مرحله میکروگرین و مرحله بالغ مورد بررسی قرار گرفت.

### مواد و روش‌ها

#### روش اجرای آزمایش

بذر سبزی‌های ریحان سبز و ریحان بنفش (Ocimum sativum)، کاهو (*Raphanus sativus*), تربچه (*Lactuca sativum*)، شوید (*Coriandrum sativus*) و گشنیز (*Anethum graveolens*) در شرایط آبکشت و کشت خاکی برای ارزیابی و بررسی خصوصیات کمی و کیفی سبزی‌ها در مراحل اولیه رشد (میکروگرین) و در مرحله بلوغ، کشت شدند. ۳۶ گلدان از ۷۲ گلدان با مخلوطی از خاک مزرعه و ماسه با نسبت دو به یک پر شدند. در هر گلدان پنج کیلویی حدود ۵۰۰ گرم زهکش (۲۰۰ گرم پوکه معدنی و ۳۰۰ گرم ماسه) و مابقی از مخلوط خاکی ریخته شد. در بستر کشت آبکشت از کوکوپیت و پرلیت به نسبت یک به یک استفاده گردید. از ۳۶ گلدان ۱۸ گلدان آن به منظور برداشت گیاه در مرحله میکروگرین و

هوایی شوید و ریحان بنفس در مرحله میکروگرین تحت تاثیر شرایط کشت قرار نگرفت. وزن تر اندام هوایی کاهو، تربچه، شوید و گشنیز در مرحله بلوغ در شرایط آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود در حالی که وزن تر اندام هوایی ریحان بنفس و ریحان سبز در مرحله بالغ تحت تاثیر شرایط کشت قرار نگرفت (جدول ۱).

در مرحله میکروگرین وزن خشک اندام هوایی کاهو، شوید و گشنیز در شرایط کشت آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود و وزن خشک اندام هوایی تربچه در مرحله میکروگرین در شرایط آبکشت نسبت به شرایط خاکی بیشتر بود ولی تفاوت معنی داری از لحاظ وزن خشک اندام هوایی ریحان بنفس و ریحان سبز در مرحله میکروگرین بین شرایط کشت آبکشت و خاکی مشاهده نشد (جدول ۱). نتایج همچنین نشان داد که وزن خشک اندام هوایی سبزی های ریحان سبز، کاهو، شوید و گشنیز در مرحله بالغ در آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود در حالی که در وزن خشک اندام هوایی ریحان بنفس و تربچه در مرحله بالغ که در سیستم آبکشت و شرایط خاکی رشد کرده بودند تفاوت معنی داری مشاهده نشد (جدول ۱).

نتایج بدست آمده بیانگر آن است که شرایط کشت (آبکشت و کشت خاکی) تاثیر معنی داری بر سطح برگ گیاهان ریحان سبز، ریحان بنفس، کاهو، تربچه شوید و گشنیز در مرحله میکروگرین نداشت (جدول ۱) ولی سطح برگ گیاه ریحان سبز، کاهو، تربچه و گشنیز در مرحله بالغ که در شرایط آبکشت رشد کرده بودند نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود، در حالی که سطح برگ ریحان بنفس و شوید در شرایط کشت خاکی بیشتر از شرایط کشت آبکشت بود (جدول ۱).

## کلروفیل کل

مقدار کلروفیل کل برگ ریحان بنفس، ریحان سبز، کاهو و شوید در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ بیشتر بود، در حالی که گیاه گشنیز در مرحله بالغ از مقدار کلروفیل کل برگ بیشتری نسبت به مرحله میکروگرین برخوردار است. مقدار کلروفیل کل برگ تربچه در مرحله بالغ در شرایط آبکشت تفاوتی مشاهده نشد ولی در شرایط کشت خاکی گیاه گشنیز در مرحله بالغ گیاه نسبت مرحله میکروگرین از مقدار کلروفیل برگ بیشتری برخوردار بود (شکل ۱). نتایج همچنین نشان داد که مقدار کلروفیل کل برگ گیاه ریحان بنفس، کاهو و گشنیز در مرحله میکروگرین در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط آبکشت بیشتر بود در حالی که مقدار کلروفیل کل برگ ریحان سبز، تربچه و شوید در مرحله میکروگرین تفاوتی بین شرایط کشت مشاهده نشد. مقدار کلروفیل کل برگ گیاهان ریحان سبز، ریحان بنفس، کاهو و تربچه در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط کشت آبکشت بیشتر بود در حالی که وزن تر اندام هوایی گیاه تربچه در مرحله میکروگرین در شرایط آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی افزایش

و با استفاده از فرمول های مربوطه محاسبه شد.

## ترکیبات فنلی و فعالیت ضدآکسیداسیونی

تعیین فعالیت ضدآکسیداسیونی با استفاده از DPPH به روش ژیل و توماس (۲۰۰۰) انجام شد. برای ترکیبات فنلی پس از عصاره گیری از ۴ گرم بافت سبزی توسط محلول های  $K_2HPO_4$  و  $ULTRA-TURRAX$  محلول های به دست امده با معرف فولین تیمار و سپس میزان جذب نور با دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۷۶۰ نانومتر اندازه گیری شد. میزان ترکیبات فنلی با استفاده از استاندارد گالیک اسید بر حسب معادل میلی گرم اسید گالیک در ۱۰۰ گرم وزن تر محاسبه گردید (۱).

## عناصر معدنی

در این پژوهش عناصر فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز و مس در اندام هوایی اندازه گیری شد. عصاره، به دست آمده از نمونه های خشک شده پودر شدنده و پس از تبدیل به خاکستر با اسیدهای لازم عصاره گیری شدند. عنصر پتاسیم توسط دستگاه شعله سنج، فسفر به روش آمونیوم مولیبدات و آمونیوم و انانادات، عناصر منیزیم، آهن، روی و مس با استفاده از دستگاه جذب اتمیک و کلسیم به روش تیتراسیون عصاره اشباع خاک انجام شد.

## تجزیه تحلیل داده ها

در پایان آزمایش داده های به دست آمده از این آزمایش با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین تیمارها در سطح احتمال یک درصد با آزمون LSD محاسبه گردید. رسم نمودارها نیز به وسیله نرم افزار اکسل صورت پذیرفت.

## نتایج

### خصوصیات رشدی

وزن تر ریشه سبزی های ریحان سبز، ریحان بنفس، کاهو، تربچه و شوید در مرحله میکروگرین و بالغ تحت تاثیر شرایط کشت قرار نگرفت ولی وزن تر ریشه گیاه گشنیز در مرحله میکروگرین و بالغ در شرایط کشت آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود (جدول ۱). وزن خشک ریشه گیاهان کاهو و شوید در مرحله بالغ در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط آبکشت بیشتر بود و همانطور که در جدول یک نشان داده شده است وزن خشک ریشه گیاه تربچه و گشنیز در شرایط کشت آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود.


وزن تر اندام هوایی گیاهان در ریحان سبز، کاهو و گشنیز در مرحله میکروگرین در شرایط آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود در حالی که وزن تر اندام هوایی گیاه تربچه در مرحله میکروگرین در شرایط کشت آبکشت کاهش یافت. وزن تر اندام

بافت (شکل ۱).

جدول ۱- تاثیر روش کشت بر مجموعه کشتات روپوش سبزه ها  
Table 1- Interaction of growth stage × cultural system on vegetative characteristics of vegetables

Growth stage مرحله رشد	Vegetables سبزه ها	Culture condition روش کشت	گزند		گزند		گزند		گزند	
			Root dry weight (mg/plant)	Root fresh weight (mg/plant)	Shoot fresh weight (g/plant)	Shoot dry weight (g/plant)	Leaf area (cm <sup>2</sup> )			
Microgreen	<i>Green Bean</i> بازاری	Soil	-0.00102 **	81±0.0011 *b	0.44±0.05 *a	0.02±0.0001 *b	4.178±0.051			
		Hydroponic	6±0.0001 *b	79±0.0003 *a	0.49±0.04 *a	0.03±0.0002 *a	5.01±0.051			
	<i>Purple Bean</i> گلابی	Soil	2.41±0.0023 *b	71±0.0012 *b	0.37±0.04 *b	0.022±0.0002 *b	5.21±0.051			
		Hydroponic	3±0.0001 *b	36±0.0013 *b	0.47±0.03 *ca	0.027±0.0003 *bc	5.57±0.051			
	<i>Lettuce</i> لوبیا	Soil	31.0±0.0023 *b	61±0.0011 *b	0.53±0.05 *c	0.034±0.0004 *b	21.11±0.051			
		Hydroponic	4±0.0002 *b	69±0.0013 *b	0.39±0.04 *de	0.073±0.0003 *b	16.2±0.051			
	<i>Radish</i> رهی	Soil	7.41±0.0032 *d	77±0.0014 *d	0.36±0.03 *e	0.025±0.0002 *d	6.18±0.051			
		Hydroponic	5±0.0001 *d	75±0.0013 *d	0.34±0.03 *a	0.023±0.0001 *b	12.8±0.051			
	<i>Dill</i> دیل	Soil	3±0.0002 *b	36±0.0014 *b	0.11±0.03 *ep	0.007±0.0003 *b	3.23±0.051			
		Hydroponic	2±0.0002 *b	52±0.0012 *a	0.26±0.02 *p	0.026±0.0012 *a	1.97±0.051			
Mature	<i>Coriander</i> کریان	Soil	8±0.00028 *	116±0.0023 *a	0.34±0.02 *en	0.014±0.0013 *b	7.03±0.051			
		Hydroponic	11±0.0001 *b	160±0.0022 *	0.63±0.123 *e	0.037±0.002 *b	3.54±0.051			
	<i>Green Bean</i> بازاری	Soil	11±0.0002 *	100±0.0011 *a	0.37±0.02 *en	0.052±0.0012 *a	33.2±0.051			
		Hydroponic	12.10±0.0012 *c	120±0.0013 *c	0.74±0.102 *b	0.07±0.002 *b	85.2±0.051			
	<i>Purple Bean</i> گلابی	Soil	8±0.0002 *b	90±0.0012 *b	0.37±0.03 *a	0.016±0.0013 *b	59.23±0.051			
		Hydroponic	8±0.0001 *b	69±0.0011 *b	0.67±0.03 *p	0.0339±0.002 *d	41.23±0.051			
	<i>Lettuce</i> لوبیا	Soil	2±0.0011 *b	130±0.03 *c	1.44±0.08 *b	0.077±0.003 *b	17.2±0.051			
		Hydroponic	5±0.0002 *b	150±0.03 *c	2.23±0.05 *c	0.0168±0.0002 *a	23.2±0.051			
	<i>Radish</i> رهی	Soil	10±0.0001 *d	140±0.02 *cd	0.65±0.03 *b	0.051±0.001 *d	4.78±0.051			
		Hydroponic	17±0.0002 *c	150±0.03 *c	1.03±0.03 *cd	0.051±0.003 *b	21.6±0.051			
	<i>Dill</i> دیل	Soil	12±0.0011 *c	250±0.03 *d	0.28±0.02 *bc	0.032±0.002 *b	98.34±0.051			
		Hydroponic	8±0.0002 *b	150±0.01 *c	0.85±0.05 *ef	0.052±0.003 *d	23.8±0.051			
	<i>Coriander</i> کریان	Soil	18±0.0001 *b	250±0.03 *b	0.56±0.02 *cl	0.067±0.003 *e	16.35±0.051			
		Hydroponic	27±0.0001 *a	350±0.02 *	1.45±0.05 *b	0.079±0.002 *b	25.5±0.051			

\* p < LSD 0.05  
Columns with different letters are significantly different at  $p \leq 0.05$  (LSD).



شکل ۱- برهمکنش مرحله رشد × نوع کشت بر مقدار کلروفیل کل برگ سبزی‌های مختلف ستون‌ها با حروف متفاوت اختلاف در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD دارند.

Figure 1- Interaction of growth stage ×cultural systems on total chlorophyll content of vegetables leaf  
Columns with different letters are significantly different at  $p \leq 0.05$  (LSD).

مرحله میکروگرین در شرایط خاکی و آبکشت بیشتر بود در حالی که مقدار ترکیبات فلئی برگ مرحله بلوغ گیاهان ریحان سبز، ریحان بنفس و شوید نسبت به مرحله میکروگرین در شرایط کشت خاکی و آبکشت بیشتر بود. نتایج همچنین نشان داد که کشت خاکی گیاهان ریحان سبز، ریحان بنفس و شوید سبب افزایش مقدار ترکیبات فلئی برگ نسبت به شرایط کشت آبکشت گردید در حالی که مقدار ترکیبات فلئی کاهو و گشنیز و تربچه در شرایط کشت آبکشت نسبت به کشت خاکی بیشتر بود (شکل ۳).

فعالیت ضد اکسیداسیونی گیاه ریحان بنفس، و شوید در شرایط کشت خاکی در مرحله بالغ نسبت به مرحله میکروگرین بیشتر بود در حالی که فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ تربچه در شرایط کشت خاکی مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ بیشتر بود. نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معنی داری بین مرحله میکروگرین و بالغ از لحاظ فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ ریحان سبز، کاهو و گشنیز در شرایط کشت خاکی مشاهده نشد. فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ ریحان سبز، ریحان بنفس و شوید در مرحله بالغ نسبت به مرحله میکروگرین در شرایط کشت خاکی مشاهده نشد. فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ ریحان سبز، ریحان بنفس و شوید در مرحله تحت تاثیر مرحله رشد قرار نگرفت برگ تربچه در شرایط آبکشت تحت تاثیر مرحله رشد قرار نگرفت (شکل ۴). نتایج همچنین نشان داد که فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ ریحان سبز و ریحان بنفس در مرحله میکروگرین در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط آبکشت بیشتر بود در حالی که فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ در مرحله میکروگرین در شرایط کشت آبکشت

#### کاروتنوئیدها


برگ ریحان سبز، ریحان بنفس، کاهو و شوید در مرحله میکروگرین که در شرایط آبکشت رشد کرده بودند از مقدار کاروتوئید بیشتری نسبت به مرحله بالغ برخوردار بودند در حالی که مقدار کاروتوئید برگ بیشتری در گیاه گشنیز و تربچه در مرحله بالغ نسبت به مرحله میکروگرین در شرایط آبکشت مشاهده گردید. نتایج همچنین نشان داد که در شرایط کشت خاکی مقدار کاروتوئید برگ گشنیز در مرحله میکروگرین نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود ولی مقدار کاروتوئید برگ گیاهان کاهو و ریحان سبز در شرایط کشت خاکی در مرحله بالغ نسبت به مرحله میکروگرین بالاتر بود، با این وجود تفاوت معنی داری بین مراحل میکروگرین و بالغ در گیاهان ریحان بنفس تربچه و شوید در شرایط کشت خاکی مشاهده نشد (شکل ۲). نتایج همچنین حاکی از آن بود که مقدار کاروتوئید برگ گیاهان ریحان بنفس، کاهو، تربچه و گشنیز در مرحله میکروگرین در شرایط کشت خاکی بیشتر از شرایط کشت آبکشت بود در حالی که مقدار کاروتوئید برگ در گیاهان ریحان سبز و شوید در مرحله میکروگرین در شرایط کشت خاکی نسبت به کشت آبکشت بیشتر بود. مقدار کاروتوئید برگ ریحان سبز، بنفس، کاهو، تربچه و شوید در مرحله بالغ در شرایط کشت خاکی نسبت به آبکشت بیشتر بود در حالی که مقدار کاروتوئید برگ در مرحله بالغ در شرایط کشت آبکشت نسبت به کشت خاکی افزایش یافت (شکل ۲).

#### ترکیبات فلئی و فعالیت ضد اکسیداسیونی

مقدار ترکیبات فلئی کاهو، تربچه و گشنیز در مرحله بالغ نسبت به


کشت خاکی و آبکشت یکسان بود ولی فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ ریحان بنفش و کاهو در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط آبکشت بیشتر بود (شکل ۴).

نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود. فعالیت ضد اکسیداسیون برگ کاهو، تربچه و شوید در مرحله میکروگرین تحت تاثیر شرایط کشت قرار نگرفت. نتایج همچنین نشان داد که فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ ریحان سبز، تربچه، شوید و گشنیز در مرحله بالغ در شرایط




شکل ۲- برهمکنش مرحله رشد × نوع کشت بر مقدار کاروتونوئید برگ سبزی‌های مختلف ستون‌ها با حروف متفاوت اختلاف در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD دارند.

Figure 2- Interaction of growth stage ×cultural systems on carotenoid content of some vegetables leaf  
Columns with different letters are significantly different at  $p \leq 0.05$  (LSD).



شکل ۳- برهمکنش مرحله رشد × نوع کشت بر مقدار ترکیبات فلی برگ سبزی‌های مختلف ستون‌ها با حروف متفاوت اختلاف در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD دارند.


Figure 3- Interaction the effect of growth stage ×cultural systems on leaf phenolic compounds content of vegetables  
Columns with different letters are significantly different at  $p \leq 0.05$  (LSD).



شکل ۴- برهمکنش اثر مرحله رشد × نوع کشت بر فعالیت ضد اکسیداسیونی برگ سبزی‌های مختلف ستون‌ها با حروف متفاوت اختلاف در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD دارند.

Figure 4- Interaction effect of growth stage ×cultural systems on antioxidant activity of some vegetables leaf  
Columns with different letters are significantly different at  $p \leq 0.05$  (LSD).

مرحله بالغ نسبت به مرحله میکروگرین بیشتر بود. نتایج همچنین حکای از آن بود که مقدار ویتامین ث برگ ریحان سبز، ریحان بنفسن، کاهو تربچه، شوید و گشنیز در شرایط کشت آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود (شکل ۵).



شکل ۵- برهمکنش مرحله رشد × نوع کشت بر مقدار ویتامین ث برگ سبزی‌های مختلف ستون‌ها با حروف متفاوت اختلاف در سطح احتمال ۵ درصد بر اساس آزمون LSD دارند.

Figure 5- Interaction of growth stage ×cultural systems on vitamin C of vegetables leaf  
Columns with different letters are significantly different at  $p \leq 0.05$  (LSD).

#### ویتامین ث

نتایج مقایسه میانگین بین تیمارها نشان داد که مقدار ویتامین ث برگ ریحان سبز، بنفسن، کاهو، تربچه در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ بیشتر بود در حالی که مقدار ویتامین ث شوید و گشنیز در

## عناصر معدنی

شوید و گشینیز در مرحله میکروگرین در شرایط کشت آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود (جدول ۲).

مقدار آهن برگ در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ در تمام سبزی‌های مورد بررسی بیشتر بود. نتایج همچنین نشان داد که مقدار آهن برگ ریحان سبز و ریحان بنفسن در مرحله میکروگرین در شرایط آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود در حالی که مقدار آهن برگ شوید در مرحله میکروگرین در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط آبکشت بیشتر بود. نتایج همچنین حاکی از آن بود که مقدار آهن برگ ریحان بنفسن، کاهو، تربچه و شوید در مرحله بالغ در شرایط کشت آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود (جدول ۳).

مقدار روی در مرحله بالغ نسبت به مرحله میکروگرین بیشتر بود. نتایج همچنین نشان داد که مقدار روی برگ ریحان سبز، کاهو، تربچه و گشینیز در شرایط آبکشت نسبت به شرایط خاکی در مرحله بالغ بیشتر بود. در حالی که مقدار روی در مرحله میکروگرین ریحان بنفسن، کاهو و تربچه در شرایط آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود (جدول ۳).

مقدار منگنز برگ سبزی‌ها در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ بیشتر بود. نتایج همچنین نشان داد که مقدار منگنز برگ ریحان سبز، ریحان بنفسن، گشینیز در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط آبکشت در مرحله میکروگرین و بالغ بیشتر بود (جدول ۳). مقدار مس برگ ریحان سبز، ریحان بنفسن و گشینیز در شرایط آبکشت نسبت به شرایط خاکی بیشتر بود در حالی که مقدار مس برگ کاهو، تربچه و شوید در شرایط آبکشت و خاکی تفاوتی نداشت (جدول ۳).

## بحث

سبزی‌ها در مرحله میکروگرین ارزش غذایی بالایی دارند که نقش مهمی در سبد غذایی انسان ایفا می‌کنند (۲۴)، ولی به دلیل کوتاه بودن دوره رشد از زمان سبز شدن تا زمان برداشت (هفت الی ۱۴ روز) خصوصیات رشدی گیاه مانند وزن گیاه، ارتفاع گیاه و سطح برگ نسبت به مرحله بالغ کمتر می‌باشد (۲۲). هرچند خصوصیات رشدی مانند وزن تر، در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ خیلی کمتر است اما معمولاً به دلیل کشت با تراکم بالا در واحد سطح، وزن تر سبزی و عملکرد بیولوژیکی در این موارد نسبت به مرحله بالغ قابل کنترل می‌باشد (۳).

مقدار فسفر برگ ریحان سبز، ریحان بنفسن، کاهو، تربچه، شوید و گشینیز در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ در شرایط آبکشت و کشت خاکی بیشتر بود (جدول ۲). نتایج همچنین نشان داد که مقدار فسفر برگ گیاهان ریحان سبز و ریحان بنفسن، در مرحله میکروگرین در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط آبکشت بیشتر بود. در حالی که مقدار فسفر برگ کاهو در مرحله میکروگرین تحت تاثیر شرایط کشت قرار نگرفت. مقدار فسفر برگ تربچه، شوید و گشینیز در مرحله میکروگرین در شرایط آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود (جدول ۲). همانطور که در جدول دو نشان داده شده است مقدار فسفر برگ ریحان سبز، کاهو، تربچه و شوید در مرحله بالغ در شرایط کشت آبکشت نسبت به شرایط کشت آبکشت بیشتر بود ولی تفاوتی بین مقدار فسفر برگ گیاهان ریحان بنفسن، و تربچه در مرحله بالغ بین شرایط کشت خاکی و آبکشت مشاهده نشد. مقدار کلسیم برگ ریحان بنفسن، کاهو و شوید در شرایط کشت خاکی در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ بیشتر بود ولی مقدار کلسیم برگ در شرایط کشت خاکی در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ کمتر بود و تفاوت معنی‌داری بین مرحله میکروگرین و بالغ گیاهان ریحان سبز و کاهو در شرایط کشت خاکی از لحاظ مقدار کلسیم برگ مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که مقدار کلسیم برگ مرحله میکروگرین گیاهان ریحان سبز، ریحان بنفسن، شوید و گشینیز در شرایط هیدرپونیک نسبت به مرحله بالغ بیشتر بود ولی تفاوت معنی‌داری بین مقدار کلسیم برگ کاهو در مرحله میکروگرین و بالغ در شرایط آبکشت مشاهده نشد (جدول ۲). مقدار کلسیم برگ ریحان سبز، ریحان بنفسن، تربچه و گشینیز در مرحله میکروگرین و بالغ در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط آبکشت بیشتر بود در حالی که مقدار کلسیم برگ کاهو در هر دو مرحله از رشد در شرایط کشت آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود (جدول ۲).

مقدار پتاسیم در شرایط کشت خاکی در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ در تمام سبزی‌ها بیشتر بود. در شرایط آبکشت مقدار پتاسیم برگ ریحان بنفسن و ریحان سبز تحت تاثیر مراحل رشد قرار گرفت ولی سایر سبزی‌ها مرحله میکروگرین از مقدار پتاسیم بیشتری برخوردار بودند (جدول ۲). نتایج همچنین حاکی از آن بود که مقدار پتاسیم برگ در مرحله بالغ در شرایط آبکشت نسبت به شرایط خاکی بیشتر می‌باشد، ولی مقدار پتاسیم برگ در مرحله میکروگرین در سبزی‌های ریحان سبز، ریحان بنفسن و کاهو در شرایط کشت خاکی نسبت به شرایط آبکشت بیشتر بود در حالی که مقدار پتاسیم برگ

جدول ۲- برهمکشن اثر مرحله رشد و نوع کشت بر مقدار عناصر پر مصرف بروگ سبزی های مختلف

Table 2- Interaction of growth stage and cultural system on leaf macro-elements content of vegetables

مرحله رشد	سبزی Vegetables	شرایط کشت Culture condition	P (% DW)	Ca (% DW)	Mg (% DW)	K(% DW)
میکرگرین	<b>Green Basil</b> برگ سبز	Hydroponic Soil	0.25±0.008 <sup>j</sup>	1.02±0.1 <sup>gi</sup>	0.58±0.02 <sup>a</sup>	4.24±0.23 <sup>th</sup>
Microgreen	<b>Purple basil</b> برگ سبز	Hydroponic Soil	0.24±0.009 <sup>cf</sup>	1.39±0.1 <sup>a</sup>	0.63±0.03 <sup>a</sup>	3.44±0.22 <sup>jk</sup>
ریحان بخشش		Hydroponic Soil	0.22±0.008 <sup>h</sup>	1.1±0.1 <sup>f</sup>	0.54±0.01 <sup>a</sup>	5.08±0.23 <sup>bc</sup>
لوبیا	Lettuce	Hydroponic Soil	0.20±0.01 <sup>i</sup>	1.06±0.09 <sup>fg</sup>	0.56±0.02 <sup>a</sup>	4.11±0.23 <sup>fi</sup>
کاهو		Hydroponic Soil	0.21±0.03 <sup>hi</sup>	1.01±0.1 <sup>i</sup>	0.55±0.01 <sup>a</sup>	4.51±0.27 <sup>df</sup>
رشید	Radish	Hydroponic Soil	0.21±0.02 <sup>hi</sup>	1.21±0.1 <sup>c</sup>	0.58±0.03 <sup>a</sup>	4.85±0.28 <sup>c</sup>
زیزیف		Hydroponic Soil	0.21±0.02 <sup>hi</sup>	1.13±0.1 <sup>de</sup>	0.5±0.02 <sup>u</sup>	5±0.78 <sup>bc</sup>
دill	Dill	Hydroponic Soil	0.31±0.01 <sup>b</sup>	1.02±0.09 <sup>hi</sup>	0.60±0.03 <sup>a</sup>	4.68±0.33 <sup>ce</sup>
نموده		Hydroponic Soil	0.25±0.01 <sup>fg</sup>	1.05±0.08 <sup>fh</sup>	0.54±0.02 <sup>a</sup>	4.93±0.87 <sup>c</sup>
کورینڈر	Coriander	Hydroponic Soil	0.35±0.03 <sup>a</sup>	1.04±0.09 <sup>gi</sup>	0.57±0.03 <sup>a</sup>	5.4±0.48 <sup>ab</sup>
گشنیز		Hydroponic Soil	0.22±0.02 <sup>gh</sup>	1.16±0.09 <sup>d</sup>	0.60±0.04 <sup>a</sup>	4.28±0.21 <sup>kl</sup>
غیر	<b>Green Basil</b> برگ سبز	Hydroponic Soil	0.27±0.02 <sup>c</sup>	0.91±0.08 <sup>k</sup>	0.60±0.02 <sup>a</sup>	5.71±0.34 <sup>a</sup>
میوه		Hydroponic Soil	0.15±0.01 <sup>k</sup>	1.04±0.1 <sup>gi</sup>	0.60±0.01 <sup>a</sup>	2.71±0.45 <sup>m</sup>
لوبیا	Lettuce	Hydroponic Soil	0.12±0.01 <sup>n</sup>	0.89±0.09 <sup>l</sup>	0.62±0.01 <sup>a</sup>	3.2±0.48 <sup>k</sup>
زیزیف		Hydroponic Soil	0.13±0.02 <sup>lm</sup>	0.87±0.08 <sup>kl</sup>	0.56±0.02 <sup>a</sup>	2.73±0.57 <sup>lm</sup>
کاهو	<b>Purple basil</b> برگ سبز	Hydroponic Soil	0.13±0.01 <sup>m</sup>	0.94±0.06 <sup>j</sup>	0.57±0.03 <sup>a</sup>	3.87±0.71 <sup>hi</sup>
رشید		Hydroponic Soil	0.17±0.01 <sup>j</sup>	0.88±0.08 <sup>kl</sup>	0.54±0.02 <sup>a</sup>	3.84±0.47 <sup>ij</sup>
کاهو	Radish	Hydroponic Soil	0.15±0.03 <sup>k</sup>	1.21±0.1 <sup>c</sup>	0.56±0.01 <sup>a</sup>	4.6±0.41 <sup>cd</sup>
رشید		Hydroponic Soil	0.15±0.02 <sup>k</sup>	1.09±0.04 <sup>ef</sup>	0.59±0.02 <sup>a</sup>	2.04±0.25 <sup>n</sup>
دill	Dill	Hydroponic Soil	0.1±0.01 <sup>o</sup>	1.08±0.05 <sup>g</sup>	0.60±0.02 <sup>a</sup>	2.75±0.33 <sup>lm</sup>
نموده		Hydroponic Soil	0.22±0.02 <sup>gh</sup>	0.96±0.03 <sup>j</sup>	0.59±0.03 <sup>a</sup>	4.06±0.4 <sup>gi</sup>
کورینڈر	Coriander	Hydroponic Soil	0.16±0.02 <sup>k</sup>	1.28±0.01 <sup>b</sup>	0.60±0.02 <sup>a</sup>	4.22±0.5 <sup>lh</sup>
گشنیز		Hydroponic Soil	0.15±0.01 <sup>k</sup>	0.52±0.003 <sup>n</sup>	0.61±0.02 <sup>a</sup>	3.13±0.8 <sup>kl</sup>
						4.37±0.2 <sup>dg</sup>

ستون ها با حروف متفاوت اختلاف در سطح احتمال نهاده بر اساس آزمون LSD.  
Columns with different letters are significantly different at  $p \leq 0.05$  (LSD).

جدول ۳- برهمکش مراحل رشد و نوع کشت بر مقدار عناصر که مصرف برق سبزی‌های مختلف

Table 3- Interaction of growth stage and cultural systems on leaf micro-elements content of vegetables

مراحل رشد	سبزی	سبزی	Culture condition	Fe (mg.g <sup>-1</sup> DW)	Cu (mg.g <sup>-1</sup> DW)	Zn (mg.g <sup>-1</sup> DW)	Mn (mg.g <sup>-1</sup> DW)
<b>Green Basil</b> درختان سبز	Soil			166.67±10.32 <sup>ce</sup>	34.0±2.23 <sup>c</sup>	47.5±2.02 <sup>fh</sup>	114.2±2.12 <sup>b</sup>
	Hydroponic			186.8±12 <sup>bc</sup>	39.8±3.12 <sup>b-d</sup>	43±4.03 <sup>gh</sup>	69.4±3.32 <sup>g</sup>
<b>Purple basil</b> درختان بنفش	Soil			121±11.25 <sup>b-j</sup>	34.0±2.36 <sup>ks</sup>	39.66±5.02 <sup>k</sup>	81.8±2.45 <sup>f</sup>
	Hydroponic			130±14.34 <sup>hi</sup>	40.8±3.87 <sup>b</sup>	43.16±3.01 <sup>j</sup>	67.4±3.85 <sup>g</sup>
<b>Lettuce</b> ترپت	Soil			221±15.12 <sup>u</sup>	37.8±3.75 <sup>d</sup>	40.16±4.21 <sup>k</sup>	108.4±4.46 <sup>c</sup>
	Hydroponic			238.33±14.12 <sup>a</sup>	38.8±2.42 <sup>cd</sup>	53±4.02 <sup>e</sup>	129.4±3.12 <sup>a</sup>
<b>Microgreen</b> سبزی	Soil			176.33±14.21 <sup>cd</sup>	18.48±3.32 <sup>g</sup>	49.8±3.01 <sup>ef</sup>	87±2.14 <sup>e</sup>
	Hydroponic			222.02±16.45 <sup>a</sup>	17.2±2.42 <sup>g</sup>	52.33±2.78 <sup>d</sup>	61.92±2.1 <sup>h</sup>
<b>Radish</b> سبزی	Soil			197±16.65 <sup>b</sup>	40.2±4.68 <sup>ks</sup>	43.5±4.45 <sup>j</sup>	105.2±3.12 <sup>c</sup>
	Hydroponic			152.67±13.77 <sup>cg</sup>	41.42±6.47 <sup>b</sup>	37±2.21 <sup>l</sup>	101.4±4.12 <sup>d</sup>
<b>Coriander</b> سبزی	Soil			143.33±9.87 <sup>lh</sup>	30.2±1.45 <sup>c</sup>	25±3.11 <sup>m</sup>	69±2.2 <sup>h</sup>
	Hydroponic			158.33±5.47 <sup>df</sup>	45.2±3.23 <sup>a</sup>	23.5±4.03 <sup>m</sup>	63±2.4 <sup>g</sup>
<b>Green Basil</b> درختان سبز	Soil			112.33±8.19 <sup>i-k</sup>	34.0±2.87 <sup>e</sup>	46.66±1.11 <sup>hi</sup>	51.6±3.12 <sup>j</sup>
	Hydroponic			126.67±9.20 <sup>b-j</sup>	39.8±3.78 <sup>b-d</sup>	63.66±2.78 <sup>a</sup>	32.2±4.11 <sup>o</sup>
<b>Purple basil</b> درختان بنفش	Soil			96±4.17 <sup>k</sup>	34.0±4.36 <sup>ks</sup>	49.5±3.87 <sup>eg</sup>	49.4±4.3 <sup>jk</sup>
	Hydroponic			137±12.45 <sup>fh</sup>	40.8±3.45 <sup>b</sup>	48.5±2.87 <sup>fh</sup>	39±1.42 <sup>n</sup>
<b>Lettuce</b> ترپت	Soil			111±5.36 <sup>ik</sup>	37.8±5.33 <sup>d</sup>	44.5±4.75 <sup>ij</sup>	45.8±2.21 <sup>lm</sup>
	Hydroponic			141±5.45 <sup>fh</sup>	38.8±2.35 <sup>ed</sup>	48±3.21 <sup>fh</sup>	57±2.12 <sup>i</sup>
<b>Mature</b> سبزی	Soil			106.2±12.45 <sup>lk</sup>	18.48±2.78 <sup>g</sup>	46±3.45 <sup>hi</sup>	62±3.02 <sup>h</sup>
	Hydroponic			165.67±8.36 <sup>cc</sup>	17.2±4.47 <sup>g</sup>	51.67±2.36 <sup>dc</sup>	48.2±3.02 <sup>kl</sup>
<b>Radish</b> سبزی	Soil			97±7.12 <sup>k</sup>	40.2±2.23 <sup>bc</sup>	48±3.34 <sup>ih</sup>	44±2.03 <sup>m</sup>
	Hydroponic			133.33±6.23 <sup>gh</sup>	41.4±23.45 <sup>b</sup>	47.33±4.34 <sup>gh</sup>	45.6±2.03 <sup>lm</sup>
<b>Coriander</b> سبزی	Soil			95.33±6.42 <sup>k</sup>	30.2±3.21 <sup>e</sup>	41±2.33 <sup>k</sup>	51±2.01 <sup>jk</sup>
	Hydroponic			94±2.11 <sup>k</sup>	45.2±3.11 <sup>a</sup>	58±2.32 <sup>b</sup>	25±2.02 <sup>p</sup>

متوسط‌ها حروف متفاوت اختلاف در میان احتمال هر دو دسته اساس آزمون LSD دارند.  
Columns with different letters are significantly different at  $p \leq 0.05$  (LSD)

(۱۱)، کوئرستین (۱۸)، فلاونول ها (۱۰)، نئو اسید کلروجنیک (۹) و دی متوكسیسانومیل هگزوساید (۹) می باشد. در یک بررسی انجام شده در ارتباط با ترکیبات فلی کل گیاه خردل نشان داده شد که مقدار ترکیبات فلی ارقام مختلف در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ بیشتر بود (۶). همچنین گزارش شده است که مقدار ترکیبات فلی و فعالیت ضد اکسیداسیونی ریحان و چغندر در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ کمتر است (۲).

نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که مقدار ترکیبات فلی برگ سبزی ها در شرایط کشت خاکی و کشت آبکشت در سبزی های مختلف متفاوت بود. به طوری که مقدار ترکیبات فلی کاهو در شرایط کشت آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود که با نتایج اوح و همکاران (۱۷) روی کاهو مطابقت دارد. بالا بودن مقدار ترکیبات در شرایط کشت مزرعه ای (خاکی) به دلیل افزایش نرخ تبخیر تعرق نسبت داده شده است (۱۷).

ویتامین ث یک خداکسیدانت مهم فیزیولوژیکی است که می تواند ساخت و تولید سایر آنتی اکسیدان ها را در بدن تحریک کند (۱۵). تفاوت در مقدار ویتامین ث در مراحل و یا سن های فیزیولوژی گیاهان می تواند بسته به گونه های گیاهی متفاوت باشد. به طوری که گیاهانی که از خانواده چتریان هستند با افزایش سن فیزیولوژیکی گیاه مقدار ویتامین ث افزایش پیدا می کند در حالی که در سایر گونه های گیاهی با افزایش سن فیزیولوژی کاهش پیدا کرد. بررسی های انجام شده روی کاهو و چغندر (۲) نشان داد که مقدار ویتامین ث در مرحله میکروگرین نسبت مرحله بلوغ بیشتر بود. همچنین گزارش شده است که مقدار ویتامین ث با افزایش سن گیاه کاهو از مرحله میکرو گرین به مرحله بالغ کاهش یافت (۱۹). بنابراین می توان گفت که استفاده از سبزی ها در مرحله میکروگرین می تواند به عنوان یک منبع غنی از ویتامین ث در سبد غذایی انسان قرار گیرد.

مقدار ویتامین ث در شرایط آبکشت نسبت به شرایط خاکی در تمام سبزی ها بیشتر بود. که این نتایج با نتایج انجام شده روی توت فرنگی (۱۲) و کاهو (۱) مطابقت دارد. بوچانان و امایان (۱) روی ارقام مختلف کاهو نشان دادند که مقدار ویتامین ث برگ ارقام مختلف کاهو که در شرایط آبکشت رشد کرده بودند حدود سه برابر مقدار ویتامین ث برگ ارقام کاهو که در شرایط خاکی رشد کرده بودند بود. بالا بودن مقدار ویتامین ث در شرایط آبکشت را می توان به دلیل وجود مواد غذایی کافی و تاثیر آن بر مقدار این ویتامین نسبت داد (۱).

اندازه گیری عناصر معدنی در سبزی ها نقش مهمی در تعیین ارزش غذایی سبزی ها در مراحل مختلف ایفا می کند. در یک بررسی روی گیاه کلم نشان داده شد که مقدار سدیم، مس، منگنز، روی و عناصر معدنی کل گیاه کلم در مرحله جوانه، میکروگرین و بالغ

وزن تر ریشه در سبزی های مختلف در دو سیستم کشت آبکشت و کشت خاکی متفاوت است. با توجه به اینکه در شرایط آبکشت عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در دسترس می باشد در نتیجه خصوصیات رشدی گیاه افزایش پیدا می کند ولی در شرایط خاکی افزایش رشد ریشه ممکن است به دلیل جذب مواد غذایی از تمام سطح خاک باشد به همین دلیل گیاه برای جذب آب و مواد غذایی خود ریشه خود را گسترش می دهد (۲۱). از طرف دیگر برخی از گیاهان در زمان سبز شدن از محور هپیوکوتیل ضعیفتری برخوردار هستند و در شرایط کشت خاکی احتمال سبز شدن آنها پایین می باشد و در صورت سبز شدن ابتدا پریموردیا (آغازه) ریشه را توسعه میدهند و زمانی که ریشه تا حدودی توسعه پیدا کرد گیاهچه قادر به خروج از خاک می باشد که این امر منجر به توسعه بیشتر ریشه در شرایط خاک می گردد (۲۵). نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که وزن تر اندام هوایی ریحان سبز، کاهو، تربچه، شوید و گشنیز در شرایط آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود. مکنندی (۱۴) در یک بررسی روی گیاهان ریحان، کلم بیچ، هویج، اسفناج، کاهو، فلفل، جعفری و هندوانه نشان دادند که به جز گیاهان هویج و هندوانه که در آن ها تفاوتی در خصوصیات رشدی در شرایط آبکشت از ویژگی رشدی بیشتری نسبت به شرایط سبزی ها در شرایط آبکشت از ویژگی رشدی بیشتری نسبت به شرایط کشت خاکی برخوردار بودند. خصوصیات رشدی کدو تخم کاغذی شامل عملکرد و خصوصیات رشدی نظری سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و ارتفاع گیاه در شرایط آبکشت بیشتر بود ولی تفاوت معنی داری بین شرایط آبکشت و کشت خاکی از لحاظ وزن تر و خشک ریشه مشاهده نشد (۲۱).

کاروتونوئیدها با حذف رادیکال های اکسیژن تولید شده نقش آتنی - اکسیدانی از خود بروز می دهند (۹). کلروفیل نیز علاوه بر این که سبب ایجاد رنگ سبز در برگ می شود به عنوان یک آتنی اکسیدان عمل می کند (۲). بنابراین ارزیابی تغییرات در مقدار کلروفیل نقش مهمی در حفظ ارزش غذایی و بازار پسندی سبزی ها ایفا می کند (۱۳).

بخش مهمی از ارزش غذایی سبزی ها مربوط به ترکیبات فلی با فعالیت ضد اکسیداسیونی است. این ترکیبات که از طریق واکنش با رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن که برای سلول های زنده خطرناک می باشند، آسیب های اکسایشی وارد به موجود زنده را کاهش می دهند. لذا انسان با مصرف سبزی ها و میوه ها می تواند بدن خود را در برابر رادیکال های آزاد ایمن کند (۱۸). از ترکیبات فلی نظری عنوان ناجیان سلامت نیز یاد می شود به طوری که ترکیبات فلی اسیدهای فنولیک و فلاونوئیدها به عنوان عوامل کاهش دهنده رادیکال های آزاد اکسیژن فعالیت دارند و در پیشگیری و درمان انواع سرطان ها نقش مهمی را ایفا می کنند (۱۰). مهم ترین ترکیبات فلی گیاه ریحان، کاهو، تربچه، شوید و گشنیز به ترتیب اسید روزمانیک

و آبکشت بررسی شده و مشاهده شد که مقدار عناصر معدنی هر دو گونه گیاهی در شرایط بستر ورمی کمپوست نسبت به شرایط کشت آبکشت بیشتر بود (۲۷). بنابراین میزان عناصر در دسترس گیاهان می‌تواند بر مقدار عناصر غذایی تاثیرگذار باشد (۲).

### نتیجه‌گیری کلی

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رشد سبزی‌های در شرایط کشت آبکشت و کشت خاکی متفاوت بود. نتایج کلی صرفنظر از استثنایات بیانگر برتری کشت آبکشت در ارتباط با ترکیبات زیست فعال شامل ترکیبات فلزی، کاروتینوئید، ویتامین ث و فعالیت ضدآکسیداسیونی در مقایسه با کشت خاکی است. همچنین ارزش غذایی کلی سبزی‌ها در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بالغ که در شرایط کشت خاکی و آبکشت رشد کرده بودند بیشتر بود، هرچند در برخی از شاخص‌ها مقدار کلروفیل کل در گیاهانی که در شرایط کشت خاکی رشد کرده بودند بیشتر بود.

متفاوت بود، به طوری که بیشترین مقدار سدیم، مس و آهن در مرحله جوانه مشاهده گردید و با افزایش سن فیزیولوژی گیاه مقدار این عناصر کاهش پیدا کرد ولی بیشترین مقدار عناصر منگنز، روی و مواد معدنی کل در ارقام کلم در مرحله میکروگرین مشاهده شد و کمترین مقدار این عناصر در مرحله بالغ مشاهده گردید (۲۶). و بر (۲۸) در یک بررسی روی کلم بروکلی نشان داد که مقدار عناصر فسفر، پتاسیم، منیزیم، منگنز، روی، آهن، کلسیم، سدیم و مس در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بلوغ به طور معنی‌داری بیشتر بود به طوری که متوسط مقدار عناصر حدود ۱/۷۳ برابر نسبت به مرحله بلوغ بیشتر بودند. پیشنهاد شده است که تولید بروکلی در مرحله میکروگرین به عنوان منبع غنی از مواد معدنی محاسبه می‌شود (۲۸). افزون براین مقدار عناصر پتاسیم، فسفر، کلسیم، منیزیم، گوگرد، منگنز، مس، روی و سدیم گیاهان کاهو و کلم در مرحله میکروگرین نسبت به مرحله بلوغ حدود دو الی سه برابر بیشتر بود (۲۷).

نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که مقدار عناصر معدنی در شرایط آبکشت نسبت به شرایط کشت خاکی بیشتر بود. مقدار عناصر معدنی گیاه کاهو و کلم در مرحله میکروگرین در بستر ورمی کمپوست

### منابع

- 1- Buchanan D.N. and Omaye S.T. 2013. Comparative study of ascorbic acid and tocopherol concentrations in hydroponic-and soil-grown lettuces. Food and Nutrition Sciences, 4(10): 1047-1053.
- 2- Bulgari R., Baldi A., Ferrante A. and Lenzi A. 2017. Yield and quality of basil, swiss chard, and rocket microgreens grown in a hydroponic system. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 45(2): 119-129.
- 3- Di Gioia F., Renna M. and Santamaria P. 2017. Sprouts, Microgreens and “Baby Leaf” Vegetables. p. 403-432. In F. Yildiz and R. C. Wiley (eds.) Minimally Processed Refrigerated Fruits and Vegetables. Springer. Springer, Boston, MA.
- 4- Ebert A.W., Chang C.H., Yan M.R. and Yang, R.Y. 2017. Nutritional composition of mungbean and soybean sprouts compared to their adult growth stage. Food Chemistry, 237: 15-22.
- 5- Fao, I. 2014. The State of Food Insecurity in The World. 80 p.
- 6- Frazie M.D., Kim M.J. and Ku K.M. 2017. Health-promoting phytochemicals from 11 mustard cultivars at Baby Leaf and mature stages. Molecules, 22(10): 1749-1756.
- 7- Galaverna G., Di Silvestro G., Cassano A., Sforza S., Dossena A., Drioli E. and Marchelli R., 2008. A new integrated membrane process for the production of concentrated blood orange juice: Effect on bioactive compounds and antioxidant activity. Food Chemistry, 106(3): 1021-1030.
- 8- George R.A. 2009. Vegetable Seed Production. CABI. Wallingford, UK.
- 9- Jaleel C.A., Manivannan P., Wahid A., Farooq M., Al-Juburi H.J., Somasundaram R. and Panneerselvam R. 2009. Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition. International Journal of Agriculture and Biology, 11(1): 100-105.
- 10- Koley, T.K. Khan Z., Oulkar D., Singh B.K., Maurya A., Singh B. and Banerjee K. 2017. High resolution LC-MS characterization of phenolic compounds and the evaluation of antioxidant properties of a tropical purple radish genotype. Arabian Journal of Chemistry. 3:75-89.
- 11- Kruma Z., Andjelkovic M., Verhe R., Kreicbergs V., Karklina D. and Venskutonis, P.R. 2008. Phenolic compounds in basil, oregano and thyme. Foodbalt, 5(7): 99-103.
- 12- Lassley J.R., Green C. and Bemis M. 2014. Pinnacle Software LLC, Method and system for marketing and selling water rights. U.S. Patent Application 14/023,750.
- 13- Mairapetyan S., Alexanyan J., Tovmasyan A., Daryadar M., Stepanian, B. and Mamikonyan, V. 2016. Productivity, biochemical indices and antioxidant activity of peppermint (*Mentha piperita* L.) and basil (*Ocimum basilicum* L.) in condition of hydroponics. Journal of Science and Technology and Environment Information, 3(2):

191-194.

- 14- Makendi, M. 2012. A Comparative Analysis of Two Plant Growth Mediums: Hydroponic vs and soil. The Academy of Science, Research and Medicine at THE Paulding County High School. PP27
- 15- Miller N.J. and Rice-Evans, C.A. 1997. Factors influencing the antioxidant activity determined by the ABTS•+ radical cation assay. Free Radical Research, 26(3): 195-199.
- 16- Murty M.G. and Ladha J.K. 1988. Influence of Azospirillum inoculation on the mineral uptake and growth of rice under hydroponic conditions. Plant and Soil, 108(2):281-285.
- 17- Oh M.M., Carey E.E. and Rajashekhar C.B. 2011. Antioxidant phytochemicals in lettuce grown in high tunnels and open field. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 52(2): 133-139.
- 18- Pérez-López U., Sgherri C., Miranda-Apodaca J., Micaelli F., Lacuesta M., Mena-Petite A., Quartacci M.F. and Muñoz-Rueda A. 2018. Concentration of phenolic compounds is increased in lettuce grown under high light intensity and elevated CO<sub>2</sub>. Plant Physiology and Biochemistry, 123: 233-241.
- 19- Pinto E. and Ferreira I.M., 2015. Changes in the content of free and conjugated polyamines during Lettuce (*Lactuca sativa*) growth. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 63(2): 440-446.
- 20- Resh H.M. 2012. Hydroponic Food Production: a definitive guidebook for the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower. CRC Press.
- 21- Roushael Y., Colla G., Battistelli A., Moscatello S., Proietti S. and Rea E. 2004. Yield, water requirement, nutrient uptake and fruit quality of zucchini squash grown in soil and closed soilless culture. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 79(3): 423-430.
- 22- Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S. and Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(13): 3286-3291.
- 23- Sgherri C., Cecconami S., Pinzino C., Navari-Izzo F. and Izzo R. 2010. Levels of antioxidants and nutraceuticals in basil grown in hydroponics and soil. Food Chemistry, 123(2), 416-422.
- 24- Treadwell D.D., Hochmuth R., Landrum L. and Laughlin W. 2010. Microgreens: A new specialty crop. University of Florida IFAS Extension HS1164.
- 25- Treftz C. and Omaye S.T. 2016. comparision between hydroponic and soil systems for growing strawberries in a greenhouse. International Journal of Agricultural Extension, 3(3): 195-200.
- 26- Waterland N.L., Moon Y., Tou J.C., Kim M.J., Pena-Yewtukhiw E.M. and Park S. 2017. Mineral Content Differs among Microgreen, Baby Leaf, and Adult Stages in Three Cultivars of Kale. HortScience, 52(4): 566-571.
- 27- Weber C.F. 2016. Nutrient content of cabbage and lettuce microgreens grown on vermicompost and hydroponic growing pads. Journal of Horticulture, 3-4.
- 28- Weber C.F. 2017. Broccoli microgreens: A mineral-rich crop that can diversify food systems. Frontiers in Nutrition, 4: 1-9.
- 29- Xiao, Z., Lester, G.E., Luo, Y. and Wang, Q. 2012. Assessment of vitamin and carotenoid concentrations of emerging food products: edible microgreens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60(31): 7644-7651.
- 30- Xiao, Z., Nou, X., Luo, Y. and Wang, Q. 2014. Comparison of the growth of *Escherichia coli* O157: H7 and O104: H4 during sprouting and microgreen production from contaminated radish seeds. Food Microbiology, 44, 60-63.



## Comparison of Minerals and Bioactive Compounds of Six Vegetable Species in Microgreen Stage in Hydroponic and Soil Production Systems

L. Poorshahabadi<sup>1</sup>- S. H. Mirdehghan<sup>2\*</sup>- H. R. Roosta<sup>3</sup>

Received: 10-03-2018

Accepted: 16-02-2019

**Introduction:** Consumer's demand for high valuable bioactive compounds have been increased in recent years. Microgreen is a stage in the growth of vegetables that is popular among consumers for their high nutritional value. It can consider as young and tender edible seedling to enhance salad quality and safety. At the same time, it has been reported that microgreen can provide higher amount of phytonutrient (ascorbic acid, phenolics and carotenoids) and minerals. Hydroponics is defined as a system of growing plant in nutrient solution which could provide necessary micro- and macro-elements for early seedling growth. The use of hydroponic gardening by commercial growers is steadily increasing as the ability to control the growing factors while conserving space is of paramount importance to crop yields and commercial profits. It is also worth noting that hydroponic systems are good for the environment. As the water is recirculating, it is not being evaporated as readily or absorbed into the ground quickly. Therefore, it is important and valuable to study the growth of some common vegetable in hydroponics as microgreen in terms of higher bioactive compounds and minerals.

**Material and Methods:** The present study was conducted to evaluate two production systems (hydroponic and soil system) and also two growth stages (microgreen and mature) of 6 vegetable species (green basil, violet basil, lettuce, radish, dill and coriander). Different growth characteristics and bioactive compounds were measured as indices of yield and quality include: root dry/fresh weight, shoot dry/fresh weight, leaf area, ascorbic acid, total chlorophyll, carotenoids, phenolics, antioxidant activity and micro- and macro-nutrients in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. The weight of roots and shoots were measured at two stages during growth. Leaf area of vegetables were determined using a leaf area meter (CI-202, USA). Ascorbic acid determination was performed by 2, 6-dichlorophenolindophenol reagent. Chlorophyll, carotenoids, phenolics and antioxidant activity were tested spectrophotometric analysis. Samples of dry leaves were ground and dry-ashing at 550 °C for 4 h. The ashes were dissolved with 5 ml 2 N HCl and made up to 50 ml with distilled water. The concentrations of K were measured by flame photometry (Jenway, model PFP7). Analysis of Ca and P was carried out by titration and spectrophotometry (model T80 UV/VIS), respectively. The Mg, Fe, Zn and Cu were identified by atomic absorption procedure.

**Result and Discussion:** The results showed that growth characteristics of violet basil, green basil, lettuce, radish, dill and coriander were higher at the adult stage than microgreen stage. The results also showed that the growth characteristics of green basil, lettuce, radish, dill and coriander were higher in hydroponics than soil cultivation. Total chlorophyll content of violet basil, green basil, lettuce and dill were higher at microgreen stage than adult stage, while total chlorophyll content of leaf radish and dill plants were higher at the adult stage than microgreen stage. However, the chlorophyll content of the whole plants was higher in the conditions of soil cultivation than hydroponic conditions. Phenolic compounds and antioxidant activity of lettuce, radish and coriander leaves were higher at microgreen stage than adult stage, while these traits were higher in adult stage than in microgreens in violet basil, green basil and dill. Vitamin C was also higher in all vegetables in the microgreen stage compared to the mature stage in both cultures except for dill and coriander. Mineral elements content was higher at microgreen stage than in the mature stage, except for zinc element.

**Conclusion:** Based on the results of this experiment, it can be concluded that the production and cultivation of these six vegetables in the microgreen stage could be considered as a suitable method for high nutritional value.

**Keywords:** Antioxidant activity, Carotenoids, Minerals, Phenolic compounds

1, 2 and 3- MS.C student and Professors Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan

(\*- Corresponding Author Email: mirdehghan@vru.ac.ir)