

The Effect of Phosphate Solubilizing Bacteria on the Amount of Morphine, Papaverine, and Noscapine Alkaloids of *Papaver somniferum* L.

S. Samavat^{1*}, M. Salehi Vozhdehnazari², M. Yahyazadeh Balalami¹, M. Rahimifard¹

1 and 2- Assistant Professor and Ph.D., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran, respectively.

(* - Corresponding Author Email: samaneh.samavat@gmail.com)

Received: 04-12-2023
Revised: 29-01-2024
Accepted: 13-02-2024
Available Online: 13-02-2024

How to cite this article:

Samavat, S., Salehi Vozhdehnazari, M., Yahyazadeh Balalami, M., & Rahimifard, M. (2024). The effect of phosphate solubilizing bacteria on the amount of morphine, papaverine, and noscapine alkaloids of *Papaver somniferum* L.. *Journal of Horticultural Science*, 38(2), 407-418. (In Persian with English abstract).
<https://doi.org/10.22067/jhs.2024.85697.1306>

Introduction

So far, more than 40 different types of alkaloids have been known in poppy (*Papaver somniferum* L.) as a valuable medicinal plant, the most important of which are morphine, codeine, thebaine, noscapine, and papaverine. The biosynthesis of these alkaloids may be strongly influenced by a variety of biotic and abiotic elicitors. In fact, microbes as biotic elicitors can affect the production of poppy alkaloids. Among them, plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) can be noticed, which stimulate and improve plant growth through various mechanisms such as mineral phosphate solubilization, plant hormone production, siderophores secretion, nitrogen fixation, etc. The use of PGPR agents can not only lead to an increase in plant biomass, but simultaneously, due to their role as biotic elicitors, they cause to an increase in the biosynthesis of secondary metabolites in plants. These biotic elicitors target plants' defense mechanisms and result in triggering a series of metabolic changes throughout the plant. The use of PGPR agents to stimulate the plant to produce secondary metabolites has several advantages: First, in some plants, defensive metabolites are active biological compounds that lead to the induction of food production with high added-value in the plants. Secondly, physiologically, with the increase in the synthesis of secondary metabolites, the resistance of the plant against pathogens also increases. Accordingly, the present study was performed with the aim of investigating the effects of bacterial strains with the ability to solubilize inorganic phosphate as biotic elicitors on the amount of morphine, papaverine, and noscapine alkaloids in *P. somniferum*.

Materials and Methods

In this research, the solubility of inorganic phosphate by four bacterial strains including *Enterobacter xiangfangensis* S2, *Pantoea dispersa* S7, *Pantoea stewartii* S25, and *Pseudomonas canadensis* S36 was evaluated quantitatively using Sperber broth medium. Under greenhouse conditions, the effect of foliar spraying of *P. somniferum* plants with a suspension of the bacterial strains (10^8 CFU.ml⁻¹) on the amount of morphine, papaverine, and noscapine in the plants' capsules, stems, and leaves was investigated. About three weeks after the appearance of capsules in poppy plants, the aerial parts of the plants (stems, leaves, and capsules) were sprayed with the bacterial suspensions. One week after foliar spraying, poppy plants were harvested in order to determine the amount of the desired alkaloids. Three pots were considered for each treatment and there were three poppy plants in each pot. Alkaloids were extracted based on an alcoholic method and detected using HPLC. Morphine and noscapine standards were prepared at a concentration of 1000 µg.ml⁻¹ and papaverine standard at a concentration of 250 µg/ml. Then the mixture was prepared in proportions of 1, 1:50, 1:10, 1:50 and 1:100 and injected into the HPLC set to draw the calibration curve. All the experiments were conducted in a form of completely randomized design with three replications for each treatment ($P < 0.05$).



©2024 The author(s). This is an open access article distributed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/10.22067/jhs.2024.85697.1306>

Results and Discussion

The results showed that the highest ($458.67 \mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$) and the lowest ($130.47 \mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$) phosphate solubility were related to S2 and S36 strains, respectively. S7 and S25 strains were not statistically significantly different from each other and after S2 strain, they were placed in the second statistical position. In the bacterial strains' treatments, the level of morphine in the stems and leaves as well as the capsules increased significantly in most cases compared to the control. The amount of papaverine in the stems and leaves decreased significantly, but it had no significant changes in the capsule. Also, noscapine showed a significant increase in the stems and leaves and reached from $0.8 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ DW in the control to 8.12 in the S2 treatment. While, the amount of noscapine increased significantly in the capsules, only in the S2 and S36 treatments. Other strains did not show significant differences with the control for noscapine content in the capsules. The results showed that the interaction effects of the type of the alkaloids and the use of phosphate solubilizing bacterial strains on the concentration of the studied alkaloids in poppy stems, leaves and capsules are significant ($P < 0.01$).

Conclusion

It can be concluded that there is no need to apply genetic engineering to increase the production of valuable secondary metabolites by medicinal plants. Rather, this goal can be achieved much cheaper by using bacterial elicitors. Accordingly, by selecting compatible and efficient bacterial strains with phosphate solubilizing activity, the amounts of morphine, papaverine, and noscapine alkaloids in the aerial parts of *P. somniferum* as a valuable medicinal plant can be noticeably increased.

Keywords: Alkaloid, Bacterium, Elicitor, HPLC, PGPR

اثر باکتری‌های حل‌کننده فسفات بر میزان آلکالوئیدهای مورفین، پاپاورین، و نوسکاپین خشخاش (*Papaver somniferum* L.)

سمانه سماوات^{۱*} - مهدیه صالحی وزده نظری^۲ - مهدی یحیی‌زاده بلالمی^۱ - مهشید رحیمی فرد^۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

چکیده

تاکنون بیش از ۴۰ نوع آلکالوئید مختلف در گیاه دارویی و ارزش شمند خشخاش (*Papaver somniferum* L.)، شناخته شده که مهم‌ترین آن‌ها مورفین، کدین، تباین، نوسکاپین و پاپاورین است. بیوسنتز این آلکالوئیدها ممکن است به شدت تحت تأثیر انواعی از ایسیستورهای زنده و غیرزنده قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات سویه‌های باکتریایی با قابلیت حل‌کنندگی فسفات معدنی به‌عنوان ایسیستورهای زنده، بر میزان تولید آلکالوئیدهای مورفین، پاپاورین، و نوسکاپین در گیاه خشخاش انجام شده است. در این پژوهش، قابلیت حل‌کنندگی فسفات معدنی توسط چهار سویه باکتریایی *Pseudomonas canadensis* S2، *Enterobacter xiangfangensis* S7، *Pantoea dispersa* S7، *Pantoea stewartii* S25 و *Pantoea dispersa* S36 به‌روش کمی و به کمک محیط کشت مایع Sperber ارزیابی شد. در شرایط گلخانه، اثر محلول‌پاشی بوته‌های خشخاش با سوسپانسیون سویه‌های باکتریایی (10^8 CFU.ml⁻¹) بر میزان آلکالوئیدهای مورفین، پاپاورین، و نوسکاپین موجود در کپسول، ساقه، و برگ خشخاش بررسی شد. آلکالوئیدها به‌روش الکی استخراج و توسط دستگاه HPLC ردیابی شدند. تمامی آزمون‌ها در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی و با سه تکرار به‌زای هر تیمار انجام شدند ($P < 0.05$). نتایج نشان داد که بیشترین (۴۵۸/۶۷ میکروگرم بر میلی‌لیتر) و کمترین (۱۳۰/۴۷ میکروگرم بر میلی‌لیتر) میزان حل‌کنندگی فسفات به‌ترتیب مربوط به سویه‌های S2 و S36 بود. در تیمار با سویه‌های باکتریایی مشخص شد که سطح مورفین موجود در ساقه و برگ و نیز کپسول در اغلب موارد افزایش معنی‌داری در قیاس با شاهد را نشان داد. میزان پاپاورین موجود در ساقه و برگ کاهش معنی‌داری داشت، ولی در کپسول تغییرات معنی‌داری نداشت. نوسکاپین موجود در ساقه و برگ نیز افزایش معنی‌داری داشت و از ۰/۸ میلی‌گرم بر گرم وزن خشک در شاهد به ۸/۱۲ در تیمار S2 رسید. در صورتی که میزان نوسکاپین کپسول فقط در تیمار S2 و S36 افزایش معنی‌داری داشت و سایر سویه‌ها اختلاف معنی‌داری با شاهد نداشتند. به این ترتیب با انتخاب سویه‌های باکتریایی سازگار و کارآمد از گروه باکتری‌های حل‌کننده فسفات، می‌توان سطح آلکالوئیدهای مورفین، پاپاورین، و نوسکاپین در اندام‌های هوایی گیاه دارویی و ارزشمند خشخاش را به‌طور چشمگیری افزایش داد.

واژه‌های کلیدی: آلکالوئید، ایسیستور، باکتری، HPLC، PGPR

مقدمه

اروپای جنوب شرقی است و به‌راحتی از مزرعه به رویشگاه‌های طبیعی نفوذ می‌نماید و تقریباً شکل انتشار طبیعی پیدا می‌کند. به لحاظ خصوصیات گیاه‌شناختی، دارای ساقه‌هایی قائم با و یا بدون انشعاب و به رنگ سبز تا سبز مایل به خاکستری است. ریشه‌های آن سطحی و دارای برگ‌های منفرد و متناوب تخم مرغی، مستطیلی یا قلبی به رنگ سبز کدر و دارای دندانه‌های عمیق است. گل‌های آن درشت است و در

خشخاش (*Papaver somniferum* L.) گیاهی علفی و یک‌ساله به ارتفاع ۳۰ تا ۸۰ سانتی‌متر، متعلق به تیره خشخاش (Papaveraceae) است. تاکنون برای این گونه، زیرگونه و واریته‌های مختلفی معرفی شده است. منشأ این گونه به احتمالی مناطق مدیترانه‌ای است و کشت آن به دوره ماقبل تاریخ برمی‌گردد. این گیاه بومی آسیا و

۱ و ۲- به‌ترتیب استادیار و دکتری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
(*) نویسنده مسئول: (Email: samaneh.samavat@gmail.com)

Aerobacter Rhizobium Pantoea Agrobacterium و *Micrococcus Erwinia Achromobacter Burkholderia* و *Azotobacter* به عنوان عوامل PGPR مورد توجه قرار گرفته‌اند (Rodríguez & Fraga, 1999).

به کارگیری عوامل PGPR، نه تنها می‌تواند منجر به افزایش زیست‌توده گیاهی شود، بلکه به‌طور هم‌زمان به دلیل نقشی که به عنوان ایستوتورهای زنده دارند، منجر به افزایش بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه در گیاه می‌شود (Ramos-Solano et al., 2010). این ایستوتورهای زنده مکانیسم‌های دفاعی در گیاهان را مورد هدف قرار می‌دهند و منتج به تحریک یک سری تغییرات متابولیکی در سرتاسر گیاه می‌شوند و به این طریق، گیاه متابولیسم دفاعی خود را تقویت می‌کند (van Loon et al., 1998). به کارگیری عوامل PGPR به منظور تحریک گیاه به تولید متابولیت‌های ثانویه دارای مزایای متعددی است؛ نخست اینکه، در برخی از گیاهان، متابولیت‌های دفاعی ترکیبات زیستی فعالی هستند که منجر به القای تولید مواد غذایی با ارزش افزوده بالا در گیاه می‌شوند (Algar et al., 2012). به عنوان مثال، در گیاه دارویی گل انگشتانه (*Digitalis lanata* L.) (Gutiérrez et al., 2003) و نیز سویا (Algar et al., 2012) منجر به افزایش سطح ایزوفلاون‌ها^۸ می‌شوند. ثانیاً، به لحاظ فیزیولوژیکی، با افزایش سنتز متابولیت‌های ثانویه، مقاومت گیاه در برابر عوامل بیماری‌زا نیز افزایش می‌یابد (Ramos-Solano et al., 2008; Conrath et al., 2006). به‌طور مثال، این عوامل می‌توانند منجر به تقویت سیستم دفاعی در گیاه مدل *Arabidopsis thaliana* در برابر بیمارگرها شوند (Ramos-Solano et al., 2008).

تاکنون مطالعات معدودی از نقش عوامل PGPR به عنوان ایستوتورهای زنده در بهبود تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی، به‌خصوص گیاه خشخاش انجام شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات سوبیه‌هایی از عوامل PGPR با قابلیت حل‌کنندگی فسفات معدنی بر میزان تولید آلکالوئیدهای مورفین، پاپاورین و نوسکاپین در گیاه خشخاش انجام شده است.

مواد و روش‌ها

مواد گیاهی

بذور خشخاش (*P. somniferum*) از رویشگاه‌های طبیعی واقع در استان فارس در عرض جغرافیایی ۵۶° ۱۰' ۳۵" شمالی و طول جغرافیایی ۱۷° ۲۳' ۵۹" شرقی، در طی تیر ۱۴۰۱ جمع‌آوری شد.

وارته‌های مختلف به رنگ‌های سفید و یا قرمز مایل به بنفش دیده می‌شود. میوه آن از نوع کپسول کم‌بیش کروی است که در قاعده دارای یک پایک کوتاه است. این گونه دارای سلول‌های خاص یا مجراهایی است که حاوی شیرابه شیری رنگی است. این شیرابه شامل ۱۰ تا ۱۵ درصد آب، ۲۰ درصد مواد قندی، مقادیری اسیدهای آلی همچون اسید لاکتیک، اسید اگزالوستیک و اسید فوماریک است. همچنین حاوی ۱۰ تا ۲۰ درصد آلکالوئید است (Yazdani et al., 2003; Tavakkoli & Assadi, 2017).

آلکالوئیدها به دلیل سمیتی که دارند، به عنوان یک ابزار اصلی برای محافظت از گیاهان در برابر آفات عمل می‌کنند (Srivastava et al., 2022). تاکنون بیش از ۴۰ نوع آلکالوئید در خشخاش شناسایی شده است که مهم‌ترین آن‌ها مورفین^۱، کدئین^۲، تبائین^۳، نوسکاپین^۴ و پاپاورین^۵ است (Liscombe & Facchini, 2008). مورفین، آلکالوئید غالب گیاه خشخاش و یک مسکن طبیعی قوی است. کدئین و نوسکاپین به عنوان سرکوب‌کننده سرفه و پاپاورین شل‌کننده عضلات است. آلکالوئید تبائین مستقیماً برای درمان استفاده نمی‌شود، اما به صورت صنعتی جهت ساخت مسکن‌های دیگر کاربرد دارد (Meos et al., 2017). میزان بیوسنتز آلکالوئیدهای خشخاش علاوه بر خصوصیات ژنتیکی گیاه، به شدت تحت تأثیر فاکتورهای محیطی مختلف اعم از زنده و غیرزنده است (Facchini, 2001; Bourgaud et al., 2001; Szabó et al., 2008).

از عوامل غیرزنده مؤثر بر غلظت آلکالوئیدهای تولید شده در خشخاش، می‌توان به نور، دما، و انواع از ترکیبات شیمیایی اشاره کرد (Srivastava & Sharma, 1990; Bennett et al., 2004; Kim et al., 2005). از بین عوامل زنده نیز باکتری‌ها، قارچ‌ها و حشرات از اهمیت زیادی برخوردار هستند (Alcantara et al., 2005; Ramos-Solano et al., 2008; Silva et al., 2004). در واقع، عوامل میکروبی اعم از بیماریزا و غیربیماریزا در نقش ایستوتورهای زنده می‌توانند میزان تولید آلکالوئیدهای خشخاش را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله این عوامل می‌توان به باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR)^۶ اشاره کرد که از طریق مکانیسم‌های مختلفی نظیر حل‌کنندگی فسفات معدنی، تولید هورمون‌های رشد گیاهی، ترشح سیدروفورها، تثبیت نیتروژن، و غیره منجر به تحریک و بهبود رشد گیاهان نیز می‌شوند. تاکنون سوبیه‌ها و جدایه‌های متعددی از جنس‌های *Bacillus*، *Pseudomonas*، *Flavobacterium*

- 5- Papaverine
- 6- Elicitor
- 7- Plant growth promoting rhizobacteria
- 8- Isoflavones

- 1- Morphine
- 2- Codeine
- 3- Thebaine
- 4- Noscapine

سویه‌های باکتری

کلنی خود در محیط کشت Sperber (Sperber, 1958)، غربالگری و شناسایی شده بودند، از کلکسیون میکروبی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور دریافت شد. اطلاعات مربوط به سویه‌ها در جدول ۱ آورده شده است.

چهار سویه باکتریایی (S2, S7, S25, S36) که پیشتر براساس توانایی در حل‌کنندگی فسفات معدنی و ایجاد هاله شفاف در اطراف

جدول ۱- خصوصیات سویه‌های باکتریایی مورد استفاده در پژوهش حاضر
Table 1- The characteristics of the bacterial strains used in this research

سویه Strain	گونه Species	شماره دسترسی Accession number	طول توالی Sequence length (kb)
S2	<i>Enterobacter xiangfangensis</i>	MW687115	1460
S7	<i>Pantoea dispersa</i>	MW687122	1472
S25	<i>Pantoea stewartii</i>	MW704276	633
S36	<i>Pseudomonas canadensis</i>	MW687114	1464

علف‌های هرز انجام می‌شد. مرحله برداشت بوته‌های خشخاش تیمار شده در خرداد سال ۱۴۰۲ انجام گرفت.

بررسی توانایی سویه‌های باکتریایی در حل‌کنندگی فسفات معدنی به روش کمی

تیمار بوته‌های خشخاش با سویه‌های باکتریایی

در ابتدا از کشت ۴۸ ساعته سویه‌های باکتریایی بر روی محیط کشت NA سوسپانسیونی با جمعیت 10^8 CFU.ml⁻¹ تهیه شد. به منظور کاهش کثرت سطحی، به سوسپانسیون حاصل به‌میزان (V/V) ۰/۰۵ درصد توپین ۲۰ (Tween 20) اضافه شد. شاهد فقط شامل مخلوط آب مقطر استریل و توپین ۲۰ بود. حدود سه هفته پس از ظهور کپسول در بوته‌های خشخاش، اندام‌های هوایی گیاه (ساقه، برگ، و کپسول) توسط سوسپانسیون باکتری‌ها محلول‌پاشی شدند. یک هفته پس از محلول‌پاشی، بوته‌های خشخاش به‌منظور ردیابی و تعیین میزان آلکالوئیدهای مورد نظر برداشت شدند. به‌ازای هر تیمار سه گلدان در نظر گرفته شد و در هر گلدان نیز سه عدد بوته خشخاش موجود بود.

برای بررسی توان سویه‌ها در انحلال تری کلسیم فسفات به‌عنوان منبع فسفات معدنی نامحلول از محیط کشت مایع Sperber (دکستروز ۱۰ گرم بر لیتر، عصاره مخمر ۰/۵ گرم بر لیتر، کلرید کلسیم ۰/۱۴ گرم بر لیتر، سولفات منیزیم ۰/۳۲ گرم بر لیتر، تری کلسیم فسفات ۲/۵ گرم بر لیتر، آب مقطر ۱۰۰۰ میلی‌لیتر، اسیدیته ۷)، استفاده شد. ابتدا سویه‌های باکتریایی به‌مدت ۴۸ ساعت در محیط جامد Sperber در سه تکرار رشد داده شدند. سپس ۵۰ میکرولیتر از سوسپانسیون هر باکتری به ارلن ۱۰۰ میلی‌لیتری حاوی ۲۵ میلی‌لیتر محیط مایع Sperber منتقل شد. ارلن‌ها به‌مدت ۱۲۰ ساعت داخل شیکر انکوباتور با سرعت ۱۲۰ دور بر دقیقه و دمای $27 \pm 2^\circ\text{C}$ تکان داده شدند. به‌طور هم‌زمان سوسپانسیون باکتری سانتریفیوژ شده و یک میلی‌لیتر از محلول رویی با یک میلی‌لیتر از محلول مولبیدات وانادات رقیق کرده و سپس با سه میلی‌لیتر آب مقطر مخلوط گردید. بعد از گذشت یک ساعت، میزان جذب نور با استفاده از اسپکتروفوتومتر در ۴۷۰ نانومتر اندازه‌گیری شد. مقدار فسفر محلول آزاد شده توسط هر سویه براساس منحنی استاندارد تهیه شده از غلظت‌های مختلف KH_2PO_4 محاسبه شد (Alikhani et al., 2014).

استخراج آلکالوئیدها

جهت استخراج آلکالوئیدها از بافت گیاهی خشخاش‌های تیمار شده با سویه‌های باکتریایی، نمونه‌های گیاهی (ساقه، برگ، و کپسول) خشک شده با دستگاه آسیاب برقی پودر شدند. به ۳۰ میلی‌گرم از نمونه‌های گیاهی خشک و پودر شده، ۱/۵ میلی‌لیتر متانول ۸۰ درصد (pH=4) اضافه گردید. مخلوط حاصل به‌مدت ۳۰ دقیقه در دمای 50°C در داخل حمام التراسونیک (Bandelin sonorex, DL) گذاشته شد تا عصاره آن استخراج شود. بعد از هر مرحله از استخراج، نمونه‌ها جهت جداسازی ذرات معلق به‌مدت ۱۵ دقیقه در 13000 g سانتریفیوژ شدند و مجدداً تا سه مرتبه تمام مراحل استخراج جهت استخراج حداکثری آلکالوئیدها تکرار شد. در نهایت، ماحصل هر سه مرحله عصاره‌گیری با هم ترکیب و ۲۰ میکرولیتر از این مخلوط جهت جداسازی ترکیبات به دستگاه HPLC تریق شد (Paulsen et al.,

مطالعات گلخانه‌ای

در مهرماه سال ۱۴۰۱، بذور خشخاش در گلدان‌هایی با ابعاد $14\text{ cm} \times 15\text{ cm} \times 15\text{ cm}$ که محتوی بستری به وزن تقریبی ۲۲۰۰ گرم با ترکیب خاک زراعی، ماسه شسته شده، خاک برگ و کود گاوی پوسیده (۲:۱:۱) بود، کشت شدند. پس از کشت بذور، گلدان‌ها به گلخانه پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در دمای $25 \pm 2^\circ\text{C}$ ، با شدت نور ۳۰۰۰ لوکس منتقل شدند. در طی دوره داشت (۱۵۰ روز)، گلدان‌ها به‌صورت یک روز در میان آبیاری می‌شدند و وجین

خصوصیات و مقادیر استانداردها

استانداردهای مورفین و نوسکاپین به غلظت ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر و استاندارد پاپورین به غلظت ۲۵۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر تهیه شد. سپس مخلوط به نسبت‌های ۱، ۱:۵۰، ۱:۱۰، ۱:۵۰ و ۱:۱۰۰ تهیه و به دستگاه HPLC جهت رسم منحنی کالیبراسیون تزریق شد.

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

تمامی آزمایش‌ها در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی و با سه تکرار به‌ازای هر تیمار انجام شد. داده‌های حاصل از پژوهش حاضر به کمک نرم‌افزار آماری (SPSS Chicago, USA)، تجزیه و تحلیل شدند و مقایسه میانگین‌ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن انجام شد.

نتایج و بحث


توانایی سویه‌های باکتریایی در حل‌کنندگی فسفات معدنی به‌روش کمی

همان‌گونه که در شکل ۱ نشان داده شده است، هر چهار سویه باکتریایی مورد بررسی از توانایی در حل‌کنندگی فسفات معدنی برخوردار بودند. بیشترین و کمترین میزان حل‌کنندگی فسفات به‌ترتیب مربوط به سویه‌های S2 و S36 بود. سویه‌های S7 و S25 نیز به لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند و پس از سویه S2، در دومین جایگاه آماری قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده‌های مربوطه در جدول ۲ آورده شده است.

(2015). قبل از تزریق نمونه‌ها به دستگاه HPLC، مخلوطی از غلظت‌های مختلف استانداردهای آلکالوئیدی جهت رسم منحنی شیب خط به دستگاه تزریق شدند. نوع ستون مصرفی در HPLC از نوع RP-18C و حلال مورد استفاده، متانول و آب حاوی دو درصد استیک اسید بود. ردیاب از نوع ماورای بنفش و طول موج مورد استفاده ۲۸۰ نانومتر بود.

مشخصات دستگاه HPLC

تجزیه HPLC نمونه‌ها با استفاده از یک سیستم گرادینت با استفاده از ستون 100 Å Nucleosil RP-18 (5µ) توسط دستگاه Agilent سری ۱۲۰۰ انجام شد. دو حلال مورد استفاده در این سیستم گرادینت شامل A- متانول حاوی دو درصد استیک؛ B- آب حاوی دو درصد استیک بود. برنامه گرادینت HPLC در نقطه ابتدایی شامل ۱۰ درصد از حلال A و ۹۰ درصد از حلال B بود که این نسبت تا دقیقه ۵ همچنان بدون تغییر بود. از دقیقه ۵ تا دقیقه ۲۰، درصدها در مورد A و B به‌صورت گرادینت به‌ترتیب به ۸۵ درصد و ۱۵ درصد رسید. سرعت جریان و حجم تزریق نمونه‌ها به دستگاه به ترتیب یک میلی‌لیتر در دقیقه و ۲۰ میکرولیتر بود. پایش آلکالوئیدهای مورفین، پاپورین و ناسکاپین توسط آشکارساز ماورای بنفش در ۲۸۰ نانومتر انجام شد. کمی‌سازی غلظت این ترکیبات آلکالوئیدی براساس یک منحنی کالیبراسیون با استفاده از پنج رقت سریال استاندارد پاپورین بود که از ۲۵۰ میکروگرم در میلی‌لیتر تا پنج میکروگرم در میلی‌لیتر متغیر بود. استانداردهای مورد استفاده در این تحقیق از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) خریداری شده بود.



شکل ۱- مقایسه توانایی سویه‌های باکتریایی در میزان حل‌کنندگی فسفات معدنی در محیط کشت مایع Sperber

Figure 1- Comparison of the ability of bacterial strains to solubilize inorganic phosphate in Sperber broth medium (DMRT, $p < 0.05$) (n=3)

جدول ۲- تجزیه واریانس حل‌کنندگی فسفات توسط سویه‌های باکتریایی ($P < 0.05$) ($n=3$)
Table 2- ANOVA for the solubility of phosphate by bacterial strains ($P < 0.05$) ($n=3$)

منابع تغییرات S.O.V	درجه آزادی df	میانگین مربعات Mean squares	ارزش F F-value
تیمار Treatment	3	57698.6**	1820.42
تکرار Replication	2	31.5	0.99
خطا Error	6	31.7	
کل Total	11		

** معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد
** : significant at $p \leq 0.01$


S36 کاهش معنی‌داری در سطح مورفین در قیاس با شاهد منتج شد. تیمار با سویه‌های باکتریایی مورد مطالعه نیز منجر به کاهش معنی‌داری در غلظت آلکالوئید پاپاورین در ساقه و برگ خشخاش نسبت به شاهد شد. این در حالی است که میزان آلکالوئید نوسکاپین در ساقه و برگ خشخاش در تیمار با تمامی سویه‌های باکتریایی مورد مطالعه افزایش معنی‌داری در قیاس با شاهد نشان داد. بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به تیمار با سویه‌های S2، S25، S7، و S36 بود. نتایج تجزیه واریانس آورده شده در جدول ۳، نشان داد که اثر متقابل نوع آلکالوئید و به‌کارگیری سویه‌های باکتریایی حل‌کننده فسفات بر غلظت آلکالوئیدهای مورد مطالعه در ساقه و برگ خشخاش معنی‌دار است ($P < 0.01$).

براساس نتایج آورده شده در شکل ۳، به‌کارگیری سویه‌های باکتریایی حل‌کننده فسفات منجر به افزایش معنی‌داری در میزان آلکالوئید مورفین موجود در کپسول بوته‌های خشخاش در قیاس با شاهد شد ($P < 0.05$). از این نظر تیمارهای S25 و S36 در گروه اول آماری قرار گرفتند و با S2 اختلاف آماری معنی‌داری نشان ندادند. کمترین میزان آلکالوئید مورفین در کپسول خشخاش نیز مربوط به شاهد بود. این در حالی است که تیمار بوته‌های خشخاش با سویه‌های باکتریایی منجر به تغییر معنی‌داری در سطح آلکالوئید پاپاورین در کپسول خشخاش در قیاس با شاهد نشد. محلول‌پاشی سوسپانسیون سویه‌های S2 و S36 به‌طور معنی‌داری منجر به افزایش غلظت آلکالوئید نوسکاپین در کپسول خشخاش شد. این در حالی است که از این نظر تیمارهای S7 و S25 اختلاف آماری معنی‌داری با شاهد نشان ندادند (شکل ۳). نتایج تجزیه واریانس آورده شده در جدول ۴، نیز نشان داد که اثر متقابل نوع آلکالوئید و به‌کارگیری سویه‌های باکتریایی حل‌کننده فسفات بر غلظت آلکالوئیدهای مورد مطالعه در کپسول خشخاش معنی‌دار است ($P < 0.01$).

به این ترتیب، نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که سویه‌های باکتریایی بررسی شده که متعلق به گونه‌های *E. P. canadensis*، *P. stewartii*، *P. dispersa xiangfangensis* بودند، از کارآمدی مطلوبی در حل‌کنندگی فسفات معدنی برخوردار بودند و می‌توان آن‌ها را به‌عنوان باکتری‌های حل‌کننده فسفات معرفی کرد. قریشی و اعتمادی فر (Ghoreishi and Etemadifar, 2017) نیز گزارش کردند که سویه بررسی شده که متعلق به *E. xiangfangensis* بود، از توانایی در تولید اسیدفسفاتاز و در نتیجه، حل‌کنندگی فسفات معدنی برخوردار بود. چن و همکاران (Chen et al., 2014) نشان دادند که باکتری *P. dispersa* از طریق تولید انواعی از اسیدهای آلی قادر به حل‌کنندگی فسفات معدنی است. هو و همکاران (Hu et al., 2010) نیز اظهار داشتند که جدایه 6g از باکتری *P. stewartii* از کارایی بالایی به لحاظ حل‌کنندگی فسفات معدنی برخوردار بود. بلانکو-وارگس و همکاران (Blanco-Vargas et al., 2020) نیز نشان دادند که سویه‌های باکتریایی متعلق به جنس *Pseudomonas* sp. قادر به حل‌کنندگی فسفات معدنی هستند. به این ترتیب، نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج سایر پژوهشگران سازگاری دارد.

اثر سویه‌های باکتریایی بر غلظت برخی آلکالوئیدهای خشخاش

همان‌گونه که در شکل ۱ نشان داده شده است، تیمار بوته‌های خشخاش با سویه‌های باکتریایی حل‌کننده فسفات، در اغلب موارد منتج به بروز تغییرات معنی‌داری در سطح آلکالوئیدهای مورفین، پاپاورین، و نوسکاپین در ساقه و برگ خشخاش شد. در بررسی میزان آلکالوئید مورفین در ساقه و برگ خشخاش مشخص شد که تیمار با سویه‌های S2، S7، و S25 به‌طور معنی‌داری منجر به افزایش سطح مورفین در قیاس با شاهد شد ($P < 0.05$). این در حالی است که تیمار با سویه



شکل ۲- اثر سویه‌های باکتریایی حل‌کننده فسفات بر میزان آلکالوئیدهای مورفین، پاپاورین، و نوسکاپین ساقه و برگ خشک‌شده
 Figure 2- The effect of phosphate-solubilizing bacterial strains on the amount of morphine, papaverine, and noscapine alkaloids in poppy stems and leaves (DMRT, $p < 0.05$) (n=3)

جدول ۳- تجزیه واریانس اثر باکتری‌های حل‌کننده فسفات بر آلکالوئیدهای برگ و ساقه *P. somniferum*

Table 3- ANOVA for the effect of phosphate solubilizing bacteria on the alkaloids of *P. somniferum* leaves and stems


منابع تغییرات S.O.V	درجه آزادی Df	میانگین مربعات Mean squares	ارزش F F-value
آلکالوئیدها Alkaloids (A)	2	124.54**	15200.19
تیمار Treatment (T)	4	7.33**	895.19
تیمار × آلکالوئید A × T	8	8.24**	1006.18
خطا Error	30	0.01	
کل Total	44		

** معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد

** : significant at $p \leq 0.01$

احمدزاده و همکاران (Ahmadzadeh et al., 2022) گزارش کردند که تیمار بذور و یا ریشه‌های گیاهچه‌های گیاه دارویی گل پرپوش (*Catharanthus roseus*) با سویه ۱۶۹ از باکتری *Pseudomonas fluorescens* منجر به افزایش قابل توجهی در میزان آلکالوئیدهای وین بلاستین^۱ و وین کریستین^۲ که از خاصیت قوی ضدسرطان برخوردارند، در قیاس با شاهد می‌شود.

پژوهش‌های متعددی اظهار می‌دارند که عوامل PGPR از جمله باکتری‌های حل‌کننده فسفات، می‌توانند به‌عنوان الیسیتورهای زنده عمل کنند و منجر به القای تولید انواعی از متابولیت‌های ثانویه در گیاهان شوند (Sekar & Kandavel, 2010). مثال‌های متعددی از ارزیابی اثرات این عوامل میکروبی مفید بر تولید انواعی از متابولیت‌های ثانویه ارزشمند توسط برخی گیاهان دارویی موجود است. به‌عنوان مثال،



شکل ۳- اثر سویه‌های باکتریایی حل‌کننده فسفات بر میزان آلکالوئیدهای مورفین، پاپاورین، و نوسکاپین کیسول خشخاش
 Figure 3- The effect of phosphate-solubilizing bacterial strains on the amount of morphine, papaverine, and noscapine alkaloids in the poppy capsule (DMRT, $p < 0.05$) (n=3)

جدول ۴- تجزیه واریانس اثر باکتری‌های حل‌کننده فسفات بر آلکالوئیدهای کیسول *P. somniferum*

Table 4- ANOVA for the effect of phosphate solubilizing bacteria on the alkaloids of *P. somniferum* capsule

منابع تغییرات S.O.V	درجه آزادی Df	میانگین مربعات Mean squares	ارزش F F-value
آلکالوئیدها Alkaloids (A)	2	85.10**	2150.455
تیمار Treatment (T)	4	0.79**	19.980
تیمار × آلکالوئید A × T	8	0.60**	15.134
خطا Error	30	0.04	
کل Total	44		

** : معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد

** : significant at $p \leq 0.01$

شد. همچنین مامتا و همکاران (Mamta et al., 2010) اظهار داشتند که تیمار بوته‌های شیرین برگ (*Stevia rebaudiana*) با باکتری‌های حل‌کننده فسفات جداسازی شده از ریزوسفر این گیاه دارویی نه تنها منجر به افزایش رشد گیاهان شد، بلکه افزایش سطح متابولیت‌های

قربانپور و همکاران (Ghorbanpour et al., 2013) نیز نشان دادند که تیمار گیاه دارویی بذربنچ (*Hyoscyamus niger*) با باکتری‌های *Pseudomonas putida* و *P. fluorescens* منجر به افزایش معنی‌داری در میزان آلکالوئیدهای هیزوسامین^۱ و اسکوپولامین^۲ موجود در ریشه و اندام‌های هوایی گیاه در قیاس با شاهد

باکتریایی مورد مطالعه مشخص شد که میزان پاپاورین موجود در برگ و ساقه در قیاس با شاهد کاهش معنی‌داری داشت، ولی میزان آن در کپسول تغییرات معنی‌داری نداشت. میزان مورفین موجود در برگ در تمامی تیمارهای باکتریایی به جز S36 افزایش معنی‌داری را در قیاس با شاهد منتج شد. در حالی که مقدار آن در کپسول حتی در تیمار با S36، افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد نشان داد. در بررسی نوسکاپین نیز مشخص شد که میزان آن در برگ و ساقه در تمامی تیمارهای باکتریایی افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد داشت، ولی در بررسی کپسول مشخص شد که تنها تیمارهای S36 و S2 منجر به افزایش معنی‌داری در آن شدند. همچنین مشخص شد که اثر متقابل نوع آلکالوئید و به‌کارگیری سویه‌های باکتریایی حل‌کننده فسفات بر غلظت آلکالوئیدهای مورد مطالعه در کپسول، ساقه و برگ خشک‌شده معنی‌دار است. به این ترتیب، نتایج به‌دست آمده از پژوهش حاضر در موافقت با یافته‌های سایر پژوهشگران است.

نتیجه‌گیری

به این ترتیب می‌توان نتیجه‌گیری کرد که به‌منظور افزایش دستیابی به متابولیت‌های ثانویه ارزشمند گیاهان دارویی لزوماً نیازی به اعمال دستوری‌های ژنتیکی نیست، بلکه با صرف هزینه‌های بسیار پایین‌تر، می‌توان به‌کارگیری البیسیتورهای باکتریایی به این هدف دست یافت. در خصوص گیاه دارویی خشک‌شده نیز مشخص شد که با انتخاب سویه‌های باکتریایی سازگار و کارآمد از گروه باکتری‌های حل‌کننده فسفات، می‌توان سطح آلکالوئیدهای مورفین، پاپاورین، و نوسکاپین را در اندام‌های هوایی به‌طور چشمگیری افزایش داد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از همکاری پرسنل محترم مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور کمال تشکر و قدردانی می‌شود.

ثانویه‌ای چون استویوزید^۱ و ربودیوزید^۲ را نیز سبب شد. بیشترین کارایی مربوط به سویه ۱۰۲۱۶ از باکتری *Burkholderia gladioli* بود که توانست میزان استویوزید و ربودیوزید-آ را به‌ترتیب ۱۵۰ درصد و ۵۵۵ درصد در هر گیاه در قیاس با شاهد افزایش دهد. بر طبق گزارش پراکاش و آرورا (Prakash & Arora, 2019)، تیمار بوته‌های گیاه دارویی نعنای وحشی (*Mentha arvensis*) با جدایه STJP از باکتری *Bacillus sp.* که از ریزوسفر *S. rebaudiana* جداسازی شده بود و از توانایی در حل‌کنندگی فسفات معدنی برخوردار بود، منجر به افزایش عملکرد عصاره و مقدار منتول موجود در آن شد. بر طبق نتایج این پژوهش نیز ریزوباکترهای حل‌کننده فسفات معدنی مورد مطالعه توانستند به‌عنوان البیسیتورهای زنده بر میزان بیوستز آلکالوئیدهای مورفین، پاپاورین، و نوسکاپین موجود در کپسول، ساقه، و برگ خشک‌شده به‌طور معنی‌داری تأثیر بگذارند. به این ترتیب، نتایج حاصل در موافقت و هم‌راستای مثال‌های ذکر شده است.

بنیلا و همکاران (Bonilla et al., 2014) گزارش کردند که عوامل PGPR می‌توانند به‌عنوان البیسیتورهای زنده منجر به افزایش سطح برخی آلکالوئیدهای گیاه خشک‌شده (*P. somniferum*) شوند. این پژوهشگران به بررسی اثر تیمار بوته‌های خشک‌شده (*P. somniferum*) با جدایه‌های *Stenotrophomonas maltophilia* (N5.18)، *Chryseobacterium balustinum* (Aur9) و (N21.4) *P. fluorescens*، بر میزان آلکالوئیدهای مورفین، تبتائین، کدئین، و اوریپاوین^۳ موجود در برگ (محلول‌پاشی) و ریشه (افزودن به خاک) پرداختند. بر طبق نتایج به‌دست آمده، مشخص شد که سویه‌های باکتریایی مختلف می‌توانند بر سطح آلکالوئیدهای موجود در برگ و یا ریشه خشک‌شده اثرات متفاوتی نشان دهند. به گونه‌ای که محلول‌پاشی بوته‌های خشک‌شده با جدایه N5.18، منجر به افزایش معنی‌داری در سطح آلکالوئیدهای مورفین، تبتائین، و کدئین برگ شد، ولی مقدار اوریپاوین کاهش معنی‌داری داشت. همچنین تیمار با جدایه N21.4 منجر به کاهش معنی‌داری در سطح مورفین و اوریپاوین برگ شد، ولی سطح کدئین و تبتائین افزایش یافت. این در حالی بود که در تیمار با جدایه N21.4، سطح مورفین، کدئین، و تبتائین در ریشه افزایش ناچیزی داشت و سطح اوریپاوین بدون تغییر ماند. تیمار با جدایه N5.18، منجر به کاهش معنی‌داری در سطح تبتائین، کدئین و اوریپاوین موجود در ریشه شد، ولی میزان مورفین افزایش یافت. یافته‌های پژوهش حاضر نیز نشان می‌دهد که سطح آلکالوئیدهای مورد مطالعه (مورفین، پاپاورین و نوسکاپین) در برگ و کپسول بوته‌های خشک‌شده محلول‌پاشی شده با جدایه‌های باکتریایی مورد مطالعه یکسان نبود. در تیمار با سویه‌های

References

- 1- Ahmadzadeh, M., Keshtkar, A.H., Moslemkhany, K., & Ahmadzadeh, M. (2022). Effect of the plant probiotic bacteria on terpenoid indole alkaloid biosynthesis pathway gene expression profiling, vinblastine and vincristine content in the root of *Catharanthus roseus*. *Molecular Biology Reports*, 49(11), 10357-10365. <https://doi.org/10.1007/s11033-022-07841-z>
- 2- Alcantara, J., Bird, D.A., Franceschi, V.R., & Facchini, P.J. (2005). Sanguinarine biosynthesis is associated with the endoplasmic reticulum in cultured opium poppy cells after elicitor treatment. *Plant Physiology*, 138(1), 173-183. <https://doi.org/10.1104/pp.105.059287>
- 3- Algar, E., Gutierrez-Mañero, F.J., Bonilla, A., Lucas, J.A., Radzki, W., & Ramos-Solano, B. (2012). *Pseudomonas fluorescens* N21.4 metabolites enhance secondary metabolism isoflavones in soybean (*Glycine max*) calli cultures. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 60(44), 11080-11087. <https://doi.org/10.1021/jf303334q>
- 4- Alikhani, H.A., Allah Dadi, I., Rashtbari, M., & Rajabpour, B. (2014). Applied methods of soil biology laboratory. University of Tehran Press, Tehran, Iran. 271 p. (In Persian)
- 5- Bennett, J.O., Yu, O., Heatherly, L.G., & Krishnan, H.B. (2004). Accumulation of genistein and daidzein, soybean isoflavones implicated in promoting human health, is significantly elevated by irrigation. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 52(25), 7574-7579. <https://doi.org/10.1021/jf049133k>
- 6- Blanco-Vargas, A., Rodríguez-Gacha, L.M., Sánchez-Castro, N., Garzón-Jaramillo, R., Pedroza-Camacho, L.D., Poutou-Piñales, R.A., Rivera-Hoyos, C.M., Díaz-Ariza, L.A., & Pedroza-Rodríguez, A.M. (2020). Phosphate-solubilizing *Pseudomonas* sp., and *Serratia* sp., co-culture for *Allium cepa* L. growth promotion. *Heliyon*, 6(10), e05218. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05218>
- 7- Bonilla, A., Sarria, A.L.F., Algar, E., Muñoz Ledesma, F.J., Ramos-Solano, B., Fernandes, J.B., & Gutierrez Mañero, F.J. (2014). Microbe associated molecular patterns from rhizosphere bacteria trigger germination and *Papaver somniferum* metabolism under greenhouse conditions. *Plant Physiology and Biochemistry*, 74, 133-140.
- 8- Bourgaud, F., Gravot, A., Milesi, S., & Gontier, E. (2001). Production of plant secondary metabolites: a historical perspective. *Plant Science*, 161(5), 839-851. [https://doi.org/10.1016/S0168-9452\(01\)00490-3](https://doi.org/10.1016/S0168-9452(01)00490-3)
- 9- Chen, Y., Fan, J.B., Du, L., Xu, H., Zhang, Q.H., & He, Y.Q. (2014). The application of phosphate solubilizing endophyte *Pantoea dispersa* triggers the microbial community in red acidic soil. *Applied Soil Ecology*, 84, 235-244. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2014.05.014>
- 10- Conrath, U., Beckers, G.J.M., Flors, V., García-Agustín, P., Jakab, G., & Mauch, F. (2006). Priming: getting ready for battle. *Molecular Plant-Microbe Interactions*, 19(10), 1062-1071. <https://doi.org/10.1094/MPMI-19-1062>
- 11- Facchini, P.J. (2001). Alkaloid biosynthesis in plants: biochemistry, cell biology, molecular regulation, and metabolic engineering applications. *Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology*, 52, 29-66. <https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.52.1.29>
- 12- Ghorbanpour, M., Hatami, M., & Khavazi, K. (2013). Role of plant growth promoting rhizobacteria on antioxidant enzyme activities and tropane alkaloid production of *Hyoscyamus niger* under water deficit stress. *Turkish Journal of Biology*, 37, 350-360. <https://doi.org/10.3906/biy-1209-12>
- 13- Ghoreishi, F.S., & Etemadifar, Z. (2017). Heavy metal removal by phosphate-solubilizing *Enterobacter xiangfangensis* isolated from rhizosphere. *Journal of Microbial World*, 10(2), 145-156. (In Persian)
- 14- Gutiérrez Mañero, F.J., Ramos, B., Lucas García, J.A., Probanza, A., & Barrientos Casero, M.L. (2003). Systemic induction of terpenic compounds in *Digitalis lanata*. *Journal of Plant Physiology*, 160, 105- r130.
- 15- Hu, X.J., Li, Z.J., Cao, Y.C., Zhang, J., Gong, Y.X., & Yang, Y.F. (2010). Isolation and identification of a phosphate-solubilizing bacterium *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* g6, and effects of temperature, salinity, and pH on its growth under indoor culture conditions. *Aquaculture International*, 18(6), 1079-1091. <https://doi.org/10.1007/s10499-010-9325-8>
- 16- Kim, S.H., Jung, W.S., Ahn, J.K., Kim, J.A., & Chung, I.M. (2005). Quantitative analysis of the isoflavone content and biological growth of soybean (*Glycine max* L.) at elevated temperature, CO₂ level and N application. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 85(15), 2557-2566. <https://doi.org/10.1002/jsfa.2294>
- 17- Liscombe, D.K., & Facchini, P.J. (2008). Evolutionary and cellular webs in benzyloisoquinoline alkaloid biosynthesis. *Current Opinion in Biotechnology*, 19(2), 173-180. <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2008.02.012>
- 18- Mamta, R.P., Pathania, V., Gulati, A., Singh, B., Bhanwra, R.K., & Tewari, R. (2010). Stimulatory effect of phosphate-solubilizing bacteria on plant growth, stevioside and rebaudioside-A contents of *Stevia rebaudiana* Bertoni. *Applied Soil Ecology*, 46, 222-229.
- 19- Meos, A., Saks, L., & Raal, A. (2017). Content of alkaloids in ornamental *Papaver somniferum* L. cultivars growing in Estonia. *The Proceedings of the Estonian Academy of Sciences*, 66(1), 34. <http://doi.org/10.3176/proc.2017.1.04>
- 20- Paulsen, J., Yahyazadeh, M., Hänsel, S., Kleinwächter, M., Ibrom, K., & Selmar, D. (2015). 13,14- dihydrocoptisine- the genuine alkaloid from *Chelidonium Majus*. *Phytochemistry*, 111, 149-153. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2015.01.006>

- 21-Prakash, J., & Arora, N.K. (2019). Phosphate-solubilizing *Bacillus* sp. enhances growth, phosphorus uptake and oil yield of *Mentha arvensis* L. *3 Biotechnology*, 9(4), 126. <https://doi.org/10.1007/s13205-019-1660-5>
- 22-Ramos-Solano, B., Barriuso Maicas, J., La Pereyra de Iglesia, M.T., Domenech, J., & Gutiérrez Mañero, F.J. (2008). Systemic disease protection elicited by plant growth promoting rhizobacteria strains: Relationship between metabolic responses, systemic disease protection, and biotic elicitors. *Phytopathology*, 98(4), 451-457. <https://doi.org/10.1094/PHYTO-98-4-0451>
- 23-Ramos-Solano, B., Algar, E., García-Villaraco, A., García-Cristóbal, J., Lucas García, J.A., & Gutierrez-Mañero, F.J. (2010). Biotic elicitation of isoflavone metabolism with plant growth promoting rhizobacteria in early stages of development in *Glycine max* var. *Osumi*. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 58(3), 1484-1492. <https://doi.org/10.1021/jf903299a>
- 24-Rodríguez, H., & Fraga, R. (1999). Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion. *Biotechnology Advances*, 17(4-5), 319-339.
- 25-Sekar, S., & Kandavel, D. (2010). Interaction of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and endophytes with medicinal plants for phytochemicals. *Journal of Phytology*, 2(7), 91-100.
- 26-Silva, H.S.A., Da Romeiro, R.S., Macagnan, D., Halfeld-Vieira, B.D.A., Pereira, M.C.B., & Mounteer, A. (2004). Rhizobacterial induction of systemic resistance in tomato plants: Non-specific protection and increase in enzyme activities. *Biological Control*, 29(2), 288-295. [https://doi.org/10.1016/S1049-9644\(03\)00163-4](https://doi.org/10.1016/S1049-9644(03)00163-4)
- 27-Sperber, J.I. (1958). Solubilization of apatite by soil microorganisms producing organic acids. *Australian Journal of Agricultural Research*, 9, 782-787. <https://doi.org/10.1071/AR9580782>
- 28-Srivastava, P. (2022). Chapter 13 Use of alkaloids in plant protection. In Ravindra Soni, Deep Chandra Suyal, Reeta Goel (Eds.): *Plant Protection: De Gruyter*, pp. 337–352
- 29-Srivastava, N.K., & Sharma, S. (1990). Effect of triacontanol on photosynthesis, alkaloid content and growth in opium poppy (*Papaver somniferum* L.). *Plant Growth Regulation*, 9(1), 65-71. <https://doi.org/10.1007/BF00025280>
- 30-Szabó, B., Lakatos, A., Koszegi, T., & Botz, L. (2008): Investigation of abiogenic stress-induced alterations in the level of secondary metabolites in poppy plants (*Papaver somniferum* L.). *Acta Biologica Hungarica*, 59(4), 425-438. <https://doi.org/10.1556/ABiol.59.2008.4.4>
- 31-Tavakkoli, Z., & Assadi, M. (2017). Papaveraceae. In: *Flora of Iran*. Vol: 127. Research Institute of Forests and Rangelands Press, Tehran, Iran. p. 79. (In Persian)
- 32-van Loon, L.C., Bakker, P.A., & Pieterse, C.M. (1998). Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. *Annual Review of Phytopathology*, 36, 453-483. <https://doi.org/10.1146/annurev.phyto.36.1.453>
- 33-Yazdani, D., Rezazadeh, S., & Shahnazi, S. (2003). Review of poppy (*Papaver somniferum* L.). *Journal of Medicinal Plants*, 2(5), 1-12. (In Persian)