

بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه

رحمت الله غلامی^۱ - عیسی ارجی^۲ - محمد گردکانه^{*۳}

تاریخ دریافت: ۹۰/۱۲/۱۴

تاریخ پذیرش: ۹۱/۹/۷

چکیده

به منظور بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر رشد رویشی زیتون رقم سویالانا آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان و مکان با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در ۳ تکرار با دو عامل، مالچ (کرت اصلی) در ۳ سطح: پلی اتیلن، کاه و کلش و بدون مالچ (شاهد) و دور آبیاری (کرت فرعی) در ۳ سطح: ۳ روز یکبار، ۶ روز یکبار (شاهد) و ۱۰ روز یکبار در ایستگاه تحقیقات زیتون دلاهه شهرستان سرپل ذهاب به انجام رسید. این تحقیق در پاییز ۱۳۸۴ با کشت نهال‌های زیتون رقم مذکور شروع شد و زمان اعمال تیمارهای مختلف از فروردین ۱۳۸۷ بعد از استقرار نهال‌های زیتون شروع و دو سال ادامه یافت. درختان کاشته شده در فاز رویشی (به علت عدم میوه‌دهی درختان زیتون) مورد مقایسه قرار گرفتند. اندازه‌گیری‌ها در مرحله فاز رویشی شامل ارتفاع نهال، قطر تنہ و میزان رشد سالیانه (رشد فصل جاری) بود که در انتهای فصل رشد اندازه‌گیری و مقایسه گردیدند. سپس داده‌های آماری با استفاده از نرم افزار MSTAC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که، مالچ باعث افزایش ارتفاع نهال، قطر تنہ و رشد سال جاری سبب به تیمار بدون مالچ گردید، از طرفی دور آبیاری ۳ روزه نیز باعث افزایش ارتفاع نهال، قطر تنہ و رشد سال جاری و تیمار آبی ۱۰ روزه باعث کاهش مقدار ارتفاع نهال، قطر تنہ و رشد سال جاری گردید. اثر متقابل مالچ و دور آبیاری نیز بر روی صفات اندازه‌گیری شده در تیمارهای مختلف در سطح ۵ درصد معنی‌داری بوده به طوری که بیشترین مقدار ارتفاع نهال، قطر تنہ و رشد سال جاری مربوط به تیمار مالچ کاه و کلش و دور آبیاری ۳ روزه می‌باشد. تیمار دور آبیاری ۶ روزه همراه با مالچ در مقایسه با تیمار دور آبیاری ۳ روزه بدون مالچ تاثیر بیشتری بر روی این صفات داشت.

واژه‌های کلیدی: زیتون، دور آبیاری، مالچ، رشد رویشی

مقدمه

(کشت دیم)، ۳۳، ۶۶ و ۱۰۰ درصد مقادیر برآورد شده تبخیر و تعرق گیاه قرار گرفتند، افزایش میانگین وزن میوه و تعداد میوه در هر درخت در ارتباط با افزایش میزان آب آبیاری بود. در این آزمایش ترکیبات اسید چرب زیتون تحت تاثیر رژیم‌های آبیاری قرار نگرفت در حالیکه مقدار پلی‌فنل‌ها با افزایش میزان آب آبیاری کاهش یافت (۶). در زیتون، میزان رشد رویشی، تولید میوه و روغن با افزایش میزان آب آبیاری افزایش می‌یابد (۸). در درختان بالغ زیتون میزان رشد شاخه‌ها با افزایش میزان آب آبیاری افزایش می‌یابد (۱۲). در بررسی که بر روی زیتون رقم روغنی صورت گرفت نهال‌های زیتون تحت تنش خشکی تیمار ۲۰ و ۴۰ درصد تبخیر و تعرق هیچ رشد رویشی نداشتند (۴). گزارش شده که تنش خشکی در زیتون رقم کوراتینا منجر به کاهش وزن خشک نهال و کاهش سطح برگ می‌شود (۱۴). در آزمایشی که توسط محققان بر روی رشد و حرکت ریشه تحت رژیم‌های مختلف آب خاک انجام گرفت، عکس العمل درختان سه ساله زیتون رقم مانزانیلا مورد بررسی قرار گرفت آنها نتیجه گرفتند

زیتون (*Olea europaea* L.) درختی همیشه سبز، مقاوم به خشکی (۵) و یکی از مهم‌ترین میوه منطقه مدیترانه است که از لحاظ تهییه کنسرو و روغن مورد توجه اکثر کشورها می‌باشد (۱۶). به دلیل وجود شرایط مستعد برای پرورش زیتون و نیاز کشور به تولید روغن، این محصول از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. برای توسعه کشت زیتون یکی از مهم‌ترین مسائل آن تأمین آب مورد نیاز آبیاری درختان می‌باشد. با توجه به خطر جدی خشکی و کمبود آب بتویله طی چند سال اخیر، اتخاذ روش‌های مناسب در بهره‌برداری بهینه از منابع آبی مورد نیاز می‌باشد که استفاده از مالچ و تعیین زمان‌های بحرانی آبیاری درختان زیتون از روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب می‌باشد.

در تحقیقی که درختان زیتون تحت چهار تیمار آبیاری شاهد ۱، ۲ و ۳ اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه (Email: Mgerdakaneh@gmail.com) نویسنده مسئول:

با ۲ فاکتور مالج در ۳ سطح بدون مالج، مالج پلی اتیلن و مالج کاه و کلش و دوره‌های مختلف آبیاری در ۳ سطح دور آبیاری ۳ روز، دور آبیاری ۶ روز و دور آبیاری ۱۰ روزه از فروردین تا آبان ماه هر سال در سه تکرار به انجام رسید. در این تحقیق فاصله ۶ روز یکبار آبیاری و بدون مالج به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و اثرات مالج و زمان‌های مختلف آبیاری بوسیله اندازه‌گیری صفات رشد سالیانه (رشد فصل جاری)، ارتفاع درخت و قطر تنه صورت گرفت.

به منظور انجام این تحقیق در پاییز ۱۳۸۴ زمینی به مساحت ۶۰۴۸ متر مربع گونیا و تستیح گردید. عملیات شخم و آماده‌سازی زمین جهت مبارزه با علفهای هرز انجام شد و سپس در پاییز ۱۳۸۴ اقدام به کشت نهال‌های زیتون گردید. سپس در سال‌های بعد اقدام به هرس فرمدهی و یک تنه نمودن درختان کاشت شده گردید. مبارزه با علفهای هرز به صورت مکانیکی و شیمیایی صورت گرفت طوریکه بین ردیف‌ها با تراکتور شخم گردید و روی ردیف‌ها با علف‌کش گراماکسون (پاراکوات) با غلظت ۲ در هزار سم پاشی شد. برای کشت نهال‌ها از مخلوط خاک، کود حیوانی و ماسه به نسبت ۱:۱:۱ استفاده شد. مقدار کود مورد استفاده بر اساس آزمون خاک (جدول ب) محاسبه و در قسمت سایه انداز درخت در زیر خاک قرار گرفت. سپس از فروردین ۱۳۸۷ تا آبان ماه ۱۳۸۸ بر روی نهال‌های زیتون استقرار یافته در خاک، تیمارهای مختلف اعمال گردید. در این تحقیق مقدار آب آبیاری برای تمامی تیمارها به میزان ۵۰ لیتر بر اساس نیاز آبی نهال‌های کاشته شده زیتون در استان کرمانشاه (۳) برای هر نهال در نظر گرفته شد که کیفیت آب آبیاری به شرح جدول پ بود. نایلون پلی‌اتیلن شفاف معمولی و به مساحت ۲ متر مربع و مالج کاه و کلش به مساحت ۱/۲ متر مربع و به ضخامت ۴ سانتی‌متر برای هر نهال در نظر گرفته شد. درختان کاشته شده در فاز رویشی (به علت عدم میوه‌دهی درختان زیتون) مورد مقایسه قرار گرفتند. اندازه‌گیری‌ها در مرحله فاز رویشی شامل ارتفاع نهال، قطر تنه و میزان رشد سالیانه (رشد فصل جاری) در انتهای فصل رشد اندازه‌گیری و مقایسه گردید. داده‌های ثبت شده در واحد متريک (سانتی‌متر) بوسیله متر اندازه‌گیری و ثبت گردیدند. سپس داده‌های آماری با استفاده از نرم افزار MSTAC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن انجام شد.

نتایج و بحث

جدول تجزیه واریانس (جدول ۱) و مقایسه میانگین‌ها (جدول ۲ و ۳) به روش دانکن در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که تیمار مالج و دور آبیاری در سطح ۵ درصد تفاوت معنی‌داری از نظر صفات رویشی مانند رشد شاخه سال جاری، قطر تنه و ارتفاع نهال داشته و نیز اثر متقابل بین مالج و دور آبیاری در سطح احتمال ۵

که ارتباط نزدیکی بین رشد ریشه و میزان آب خاک در سراسر فصل رشد وجود دارد (۷). گزارش شده که سیستم ریشه درختان زیتون رقم کالامون عتا ۷ برابر در نواحی مرتبط نزدیک به قطره چکان‌ها نسبت به نواحی با رطوبت کم یا بدون رطوبت متراکم‌تر بودند (۱۳).

میرزاعلیان (۲) اظهار داشت که با استفاده از مالج پلی اتیلن می‌توان با تغییر دور آبیاری از هفت روز به چهارده روز در طالبی ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب مقدار عملکرد را نیز به میزان قابل توجهی افزایش داد. استفاده از مالج‌های آلی باعث تعديل دمای خاک کاهش رشد علف‌های هرز، حفظ رطوبت موجود در خاک، کاهش آبیاری و نیز کاهش تنش آبی می‌شود ولی بر روی مقدار اکسیژن خاک تاثیر ندارد (۹). یکی از راههای مهم برای جلوگیری از مصرف نامناسب آب و صرفه‌جویی در منابع موجود آب برای کشاورزی استفاده از گیاهان مقاوم به کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک شناخت ارتباط کمبود آب خاک و رشد محصولات در هر مرحله، بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و روابط مفید داخلی گیاه در مقابله با تنش، و نیز استفاده از مالج و کندکننده‌های رشد مانند هورمون پکلوبوترازول که باعث افزایش کارآیی مصرف آب در درختان می‌شود (۴ و ۱۱).

در این راستا علاوه بر اینکه تعیین زمان‌های بحرانی آبیاری اهمیت داشته، خاصیت مالج‌ها نیز از طریق کاهش تبخیر از سطح خاک در بهینه نمودن مصرف آب در شرایط کم آبی بر اهمیت اجرای طرح می‌افزاید. از طرفی با توجه به اینکه خشکی از ویژگی‌های بارز جغرافیایی کشور ما است و از این پدیده طبیعی و غیر قابل اجتناب راه گریزی نیست و با توجه به شرایط خشک و نیمه خشک کشور و کاهش نزولات آسمانی در طی سال‌های اخیر بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف آب باید هر چه بیشتر مد نظر قرار گیرد. لذا هدف از اجرای این پژوهش استفاده از مالج‌های مختلف به منظور افزایش دور آبیاری جهت کاهش مصرف آب در باغات زیتون بود.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در ایستگاه تحقیقات زیتون دلاهه شهرستان سریل ذهاب انجام گرفت. این منطقه دارای طول جغرافیائی ۴۵ درجه و ۵۱ دقیقه شرقی و عرض جغرافیائی ۳۴ درجه و ۳۰ دقیقه شمالی است. ارتفاع آن از سطح دریا ۶۳۳ متر می‌باشد که برخی از پارامترهای شرایط آب و هوایی منطقه در طی دوره آزمایش به شرح جدول الف می‌باشد.

برای اجرای این تحقیق ابتدا نهال‌های زیتون رنگ سویلانا به فاصله ۵×۵ در پاییز ۸۴ کاشته شدند بدین منظور اثر مالج پلی اتیلن و کاه و کلش و زمان‌های آبیاری بر رشد رویشی زیتون مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشی اسپلیت پلات در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی

درصد معنی دار گردید.

جدول الف- میانگین ماهانه داده های هواشناسی گرفته شده از ایستگاه هواشناسی شهرستان سریل ذهاب (سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸)

(mm) بارندگی	میزان تبخیر ماهانه (mm)		رطوبت نسبی (%)		درجة حرارت (C)		ماه
	سال	سال	سال	سال	سال	سال	
۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۷
۵۴/۱۰	۱/۴۰	۹۷/۳۰	۱۵۰/۷۰	۶۲/۲۵	۴۲	۱۴/۴۰	۱۹/۷۰
۱	۲/۶۰	۲۱۷/۴۰	۲۲۴/۹۰	۴۵/۲۹	۳۷	۲۲	۲۳/۶۰
.	.	۳۴۲/۷۰	۳۴۶/۸۰	۲۳/۸۰	۲۵	۲۹/۶۰	۲۹/۳۰
.	.	۳۷۷/۱۰	۳۹۶/۳۰	۲۳/۴۸	۲۳	۳۲/۸۰	۳۲/۹۰
.	.	۳۹۷/۲۰	۳۹۲/۹۰	۲۴/۴۸	۲۷	۳۲	۳۳/۳۰
۷/۸۰	۰/۲۰	۲۸۹/۳۰	۳۲۷/۲۰	۳۳	۲۸	۲۸/۳۰	۳۱/۵۰
۱/۵۰	.	۱۶۲/۹۰	۱۸۹/۱۰	۳۶/۶۶	۳۸	۲۲/۳۰	۲۳/۶۰
۱۳۰/۲۰	۹۶/۲۰	۶۰/۸۰	۷۲/۶۰	۶۴	۶۲	۱۶/۶۰	۱۶
							آبان

جدول ب- مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش (آزمایشگاه خاک شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی)

نمونه	عمق	دربند سیلت	دربند شن	دربند شن	دربند شن	پتانسیم قابل جذب (ppm)	فسفر قابل جذب (ppm)	ازت کل درصد	کربن آلی درصد	کربنات کلسیم درصد	اسیدیته خاک
۱	-۳۰	۴۴	۲۴	۴۰	۳۲۰	۱۱/۸۰	۰/۱۷	۱/۹۵	۳۳	۷/۳۰	
۲	-۶۰	۳۷	۲۷	۴۹	۱۰۰	۶	۰/۰۵	۱/۲۰	۳۵	۷/۵۰	

جدول پ- مشخصات آب محل آزمایش (آزمایشگاه خاک شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی)

هدایت الکتریکی	مجموع املاح محلول (mg/l)	کربنات	بی کربنات	کلر	سولفات	کلسیم (meq/l)	سدیم (meq/l)	اسیدیته
۵۵۰	۳۵۲	۰/۰	۴/۶۰	۱/۹۰	۰/۳۰	۶/۶۰	۰/۲۰	۷/۲۸

جدول ۱- تجزیه واریانس رشد سالیانه (رشد فصل جاری)، قطر تنہ و ارتفاع نهال رقم سویالانا تحت مالج و رژیم های مختلف آبیاری (سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷)

میانگین مربعات (MS)							منابع تغییرات
ارتفاع نهال (cm)	قطر تنہ (cm)	رشد سالیانه (cm)	درجہ آزادی				
۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۸	تکرار
۲۹۵/۷۲	۱۴/۶۱	۰/۳۶	۰/۲۰	۰/۱۸	۰/۲۸	۲	
۵۷۳/۱۵**	۳۹۹/۹۴**	۱/۶۶**	۰/۷۵**	۷/۴۱**	۸/۴۳*	۲	مالج
۱۲/۴۶	۱۰/۲۸	۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۳۴	۰/۵۰	۴	خطای اصلی
۱۹۳۳/۹۷**	۱۲۳۴/۲۵*	۷/۱۰**	۳/۱۸**	۳۰/۳۷**	۳۲/۱۱**	۲	دور آبیاری
۷۸/۶۷*	۵۵/۳۸*	۰/۰۳**	۰/۰۱**	۰/۶۸**	۰/۸۹*	۴	اثر متقابل مالج در دور آبیاری
۱۸/۰۳	۱۲/۲۶	۰/۲۲	۰/۰۹	۰/۲۳	۰/۲۷	۱۲	خطای فرعی
۲/۸۲	۲/۷۹	۹/۸۴	۹/۷۶	۳/۳۱	۳/۶۴	-	ضریب تغییرات (درصد)

* در سطح ۵ درصد و ** در سطح ۱ درصد مطابق آزمون F معنی دار است.

مالج‌های آلی باعث تعديل دمای خاک و کاهش رشد علفهای هرز می‌گردد. استفاده از مالج در باغات باعث کاهش رشد علفهای هرز، حفظ رطوبت موجود در خاک، کاهش آبیاری و نیز کاهش تنفس آبی می‌شود (۹).

اثر دور آبیاری بر صفات رویشی

بر اساس جداول تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌های بدست آمده در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بین تیمارهای آبیاری از نظر صفات رویشی اندازه‌گیری شده تفاوت معنی‌داری وجود دارد به طوریکه تیمار آبیاری ۳ روزه باعث افزایش رشد رویشی درختان کاشته شده گردید (جدول ۱ و ۳). نتایج این جداول نشان می‌دهد که تاثیر تیمار آبیاری (جدول ۱) و تیمار آبیاری ۳ روزه باعث افزایش سال جاری شاخه سال درختان زیتون رقم سویلانا گردید. بین تیمارهای آبیاری نیز از نظر قطر تنه تفاوت معنی‌داری وجود داشت به نحوی که تیمار ۶ روزه باعث افزایش قطر تنه درختان زیتون مورد آزمایش گردید گرچه بین تیمار ۳ و ۶ روزه در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت ولی بین تیمار آبیاری ۱۰ روزه با تیمارهای ۳ و ۶ روزه در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی‌داری وجود داشت به نحوی که این تیمار باعث کاهش قطر درختان مورد آزمایش گردید. همچنین تاثیر تیمارهای آبیاری بر ارتفاع نهال معنی‌داری بود و تیمار آبیاری ۳ روزه باعث افزایش و تیمار آبیاری ۱۰ روزه باعث کاهش در ارتفاع درختان مورد آزمایش گردید.

اثر مالج بر صفات رویشی

بر اساس داده‌های جداول تجزیه واریانس (جدول ۱) و مقایسه میانگین‌ها (جدول ۲) بدست آمده در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بین تیمار مالج (در ۳ سطح پلی‌اتیلن، کاه و کلش و بدون مالج) از نظر صفات رویشی اندازه‌گیری شده اختلاف معنی‌داری وجود داشت. به طوری که تیمار کاه و کلش باعث افزایش صفات رویشی درختان زیتون رقم سویلانا گردید. نتایج نشان داد که در بین مالج‌های مختلف از لحاظ رشد سال جاری شاخه، قطر تنه و ارتفاع نهال تفاوت معنی‌داری وجود دارد به طوری که مالج کاه و کلش باعث افزایش رشد سال جاری شاخه، قطر تنه و ارتفاع نهال نسبت به بقیه تیمارها گردیده است گرچه بین مالج کاه و کلش و پلی‌اتیلن اختلاف معنی‌داری وجود نداشت و در یک کلاس قرار گرفتند. مالج با ایجاد شرایط مناسب از جمله حفظ رطوبت خاک، کاهش رشد علفهای هرز و از بین بردن رقابت بین علفهای هرز و گیاه اصلی باعث رشد رویشی بیشتر در درختان زیتون گردید حفظ رطوبت خاک در اثر کاربرد مالج باعث می‌شود که میزان رشد اندام‌های مختلف به علت وجود آب کافی در خاک مناسب باشد.

بهره‌گیری استفاده از تکنیک بقاء حیات گیاهان (استفاده از مالج) برای کشت و استقرار نهال‌های جوان بادام می‌تواند در استقرار درختان نقش به سزاوی را ایفا نماید (۱). استفاده از مالج‌های آلی مانند برگ خشک نیشکر-شلتوك-برنج-خاک اره و برگ خشک درختان می‌تواند فاصله آبیاری را از ۵ به ۱۱ روز افزایش دهد (۱۵). استفاده از

جدول ۲- مقایسه میانگین اثر مالج بر رشد سالیانه (رشد فصل جاری)، قطر تنه و ارتفاع نهال در سطح ۵ درصد (سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸)


نوع مالج	رشد سالیانه (cm)					
	سال	سال	سال	سال	سال	سال
بدون مالج	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۷
پلی‌اتیلن	۱۴۲B	۱۱۸B	۴/۲۵C	۲/۹۰C	۱۳/۷۸B	۱۳/۳۷B
کاه و کلش	۱۵۳A	۱۲۷/۱۰A	۴/۸۳B	۳/۲۰B	۱۴/۹۵A	۱۴/۷۴A
	۱۵۷/۵۰A	۱۳۰/۹۰A	۵/۲۱A	۳/۴۰A	۱۵/۴۲A	۱۵/۲۳A

مطابق آزمون دانکن، حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده غیر معنی‌دار بودن تفاوت بین تیمارها می‌باشد.


جدول ۳- مقایسه میانگین اثر دور آبیاری بر رشد سالیانه (رشد فصل جاری)، قطر تنه و ارتفاع نهال در سطح ۵ درصد (سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸)

دور آبیاری	رشد سالیانه (cm)					
	سال	سال	سال	سال	سال	سال
۳ روزه	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۷
۶ روزه	۱۶۵/۹۰A	۱۳۷/۹۰A	۵/۵۹A	۳/۷۳A	۱۶/۵۱A	۱۶/۳۳A
۱۰ روزه	۱۴۹/۹۰B	۱۲۴/۵۰B	۴/۹۷A	۳/۳۲A	۱۴/۸۰B	۱۴/۴۶B
	۱۳۶/۷۰C	۱۱۳/۶۰C	۳/۸۴B	۲/۵۶B	۱۲/۸۴C	۱۲/۵۶C

مطابق آزمون دانکن، حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده غیر معنی‌دار بودن تفاوت بین تیمارها می‌باشد.



شکل ۱- اثر متقابل مالج در دور آبیاری بر رشد سالیانه (رشد فصل جاری) در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ (به ترتیب نمودار بالا و پایین).



شکل ۲- اثر متقابل مالج در دور آبیاری بر قطر تنہ در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ (به ترتیب نمودار بالا و پایین).

روی رشد شاخه سال جاری موثرتر بود (شکل ۱). از طرفی اثر متقابل مالج و دور آبیاری بر قطر تن، تیمار ۳ روزه با سطوح مالج مختلف در کلاس‌های متفاوتی قرار گرفتند و تیمار ۳ روزه همراه با مالج کاه و کلش موجب بیشترین رشد قطر تن در درختان مورد آزمایش شد. بین تیمار دور آبیاری ۶ روزه همراه با سطوح مختلف مالج اختلاف معنی‌داری ثبت شد. اگر چه تیمار ۶ روزه مالج پلی‌اتیلن و ۶ روزه کاه و کلش در یک کلاس قرار گرفتند ولی تیمار دور آبیاری ۶ روزه و کاه و کلش تاثیر بیشتری بر روی افزایش قطر تن داشت و حتی از نظر تاثیر بر روی این صفت این تیمار در کلاس بالاتری نسبت به تیمار ۳ روزه بدون مالج قرار گرفت (شکل ۲).

از نظر اثر متقابل مالج و دور آبیاری بر ارتفاع نهال، تیمار ۳ روزه مالج پلی‌اتیلن و ۳ روزه کاه و کلش و نیز تیمار ۳ روزه بدون مالج، ۶ روزه مالج پلی‌اتیلن و ۶ روزه کاه و کلش در یک کلاس قرار گرفتند و نیز تیمار ۶ روزه مالج پلی‌اتیلن و ۶ روزه کاه و کلش و نیز تیمار ۶ روزه بدون مالج، ۱۰ روزه مالج پلی‌اتیلن و ۱۰ روزه کاه و کلش در یک کلاس قرار (شکل ۲).

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه تیمار ۳ روزه بدون مالج، ۶ روزه مالج پلی‌اتیلن و ۶ روزه کاه و کلش در یک کلاس قرار گرفتند و نیز تیمار ۶ روزه بدون مالج، ۱۰ روزه مالج پلی‌اتیلن و ۱۰ روزه کاه و کلش بر روی مقدار ارتفاع نهال، قطر تن و رشد سال جاری در یک کلاس قرار گرفتند بر این اساس می‌توان با استفاده از مالج‌های کاه و کلش و نیز پلی‌اتیلن دور آبیاری را بدون صدمه به درختان زیتون افزایش داد و از این طریق در مصرف آب آبیاری صرفه‌جویی کرد.

با توجه به نتایج بدست آمده از جداول مربوطه (جداول ۱ تا ۳) صفات اندازه‌گیری شده در تیمارهای مختلف آبیاری با میزان آب آبیاری ارتباط داشته و افزایش میزان آبیاری موجب افزایش رشد اندام‌های رویشی گردید. به عبارتی گیاهانی که تحت تنش آبی قرار می‌گیرند به علت کاهش تورسانس سلولی و عدم آب کافی جهت رشد و تقسیم سلولها، میزان رشد و نمو اندام‌های مختلف در آنها کاهش می‌یابد. اعمال تنش خشکی در زیتون رقم مانزانیلا^۱ باعث کاهش وزن تر و خشک ریشه و شاخه، تعداد و سطح برگ و ارتفاع نهال می‌گردد (۱۰ و ۱۱). در بررسی که توسط ارزانی و ارجی^۲ بر روی زیتون رقم روغنی صورت گرفت نهال‌های زیتون تحت تنش خشکی تیمار ۲۰ و ۴۰ درصد تبخیر و تعرق هیچ رشد رویشی نداشتند. تنش خشکی در زیتون رقم کوراتینا^۳ منجر به کاهش وزن خشک نهال و کاهش سطح برگ می‌شود (۱۶). میزان آب آبیاری در رشد رویشی زیتون موثر بوده و با افزایش میزان آب آبیاری رشد رویشی افزایش خواهد یافت (۸). در تحقیق ۵ ساله بر روی درختان زیتون رقم کalamon^۴، نتایج نشان داد که پارامترهای رشدی مانند ارتفاع و حجم تاج و قطر تن در درختان بدون آبیاری در مقایسه با شاهد بطور معنی‌داری نسبت به گیاهان شاهد کمتر بود (۱۳).


اثر متقابل مالج و دور آبیاری بر صفات رویشی
نتایج مقایسه میانگین‌های شکل‌های ۱ تا ۳ در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که اثر متقابل مالج و دور آبیاری بر صفات رویشی رشد شاخه سال جاری، قطر تن و ارتفاع نهال در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار بود.

از نظر اثر متقابل مالج و دور آبیاری بر رشد شاخه سال جاری، تیمار دور آبیاری ۳ روزه مالج پلی‌اتیلن و دور آبیاری ۳ روزه کاه و کلش در هر دو سال در یک کلاس قرار گرفتند ولی اختلاف معنی‌داری با تیمار ۳ روزه بدون مالج داشتند. بین تیمار دور آبیاری ۶ روزه همراه با مالج پلی‌اتیلن، کاه و کلش و بدون مالج اختلاف معنی‌داری ثبت شد و تیمار دور آبیاری ۶ روزه و کاه و کلش رشد تاثیر بیشتری بر روی رشد شاخه سال جاری داشت و حتی از نظر تاثیر بر روی این صفت تیمار دور آبیاری ۶ روزه و مالج کاه و کلش در کلاس بالاتری نسبت به تیمار ۳ روزه بدون مالج قرار گرفت. اگر چه اثر متقابل تیمار دور آبیاری ۱۰ روزه با سطوح مختلف مالج نسبت به سایر تیمارها در کلاس پایین‌تری قرار گرفتند اما در بین آنها نیز اختلاف معنی‌داری مشاهده شد به نحوی که آبیاری ۱۰ روزه همراه با مالج کاه و کلش بر

1- Manzanillo

2- Coratina

3- Kalamon



شکل ۳- اثر متقابل مالج در دور آبیاری بر ارتفاع نهال در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ (به ترتیب نمودار بالا و پایین).

منابع

- 1- بیناباجی م. و مختاری ع. ۱۳۷۹. استفاده از تکنیک بقاء حیات گیاهان برای کشت و استقرار نهالهای جوان. دومین کنگره علوم باگبانی ایران. صفحه ۴۳۷
- 2- میرزاعلیان ع، کاشی ع. و سهرابی ت. ۱۳۷۹. بررسی اثرات دور آبیاری و مالج پلی اتیلن سیاه بر رشد و عملکرد طالبی. دومین کنگره علوم باگبانی ایران. صفحه ۴۳۷
- 3- غلامی ر، ارجی ع. و حاجی امیری ا. ۱۳۸۸. بررسی و مطالعه اثرات دور آبیاری بر روی خصوصیات رویشی ژنتیک‌های برتر بومی زیتون استان کرمانشاه در شرایط مزرعه. ششمین کنگره علوم باگبانی ایران.
- 4- Arzani K. and Arji I. 2000. The effect of water stress and deficit irrigation on young potted olive cv. Local-Roghani Roodbar. *Acta Horticulture*, 537: 879-885.
- 5- Bacelar A.E., Santos D.L., Moutinho-Pereira J.M., Goncalves B.C., Ferreira H.F. and Correia CM. 2006. Immediate responses and adaptive strategies of three Olive cultivars under contrasting water availability regimes: Changes on structure and chemical composition of foliage and oxidative damage. *Plant Science*, 170: 596-605.
- 6- D'Andria R., Morelli G., Patumi M. and Fontanazza G. 2000. Irrigation regime effects yield and oil quality of olive trees. *4th International symposium on olive growing*. Valenzano (Bari) Italy, Pp. 136.
- 7- Fernandez J.E., Moreno F., Cabrera F., Arrue J.L. and Martin-Aranda J. 1991. Drip irrigation, soil characteristics and the root distribution and root activity of olive trees. *Plant and Soil*, 133: 239-251.
- 8- Girona J., Luna M., Arbones A., Mata M., Rufat J. and Marsal J. 2000. Young olive trees cv. Arbequina response to different water supplies. Water function determination. *4th International Symposium on olive growing*. Valenzano (Bari) Italy, Pp. 136.
- 9- Greenly K.M. and Rakow D.A. 1995. The effect of wood mulch type and depth on weed and tree growth and certain soil parameters. *Journal of Arboriculture*, 21 (5): 225-232.

-
- 10-Gholami R., Arzani K. and Arji I. 2004. Effect of paclobutrazol (PBZ) on vegetative growth and performance of young olive plants CV. Manzanillo. 5th International Symposium on Olive Growing, 27 September-2 October, Izmir, Turkiye, P: 9.
 - 11-Gholami R., Arzani K. and Arji I. 2004. Effect of different irrigation amounts on vegetative growth of young potted olive (*Olea europaea* L) cv. Manzanillo. 5th International Symposium on Olive Growing, 27 September-2 October, Izmir, Turkiye, p: 210.
 - 12-Goldhamer D.A., Dunai J. and Ferguson L.F. 1993. Water use requirements of Manzzanillo olives response to sustained deficit irrigation. *Acta Horticulture*, 335: 365-371.
 - 13-Michelakis N. 1995. Effect of water availability the growth and yield of olive trees. *Olivae*, 56:29-39.
 - 14-Nuzzo V., Xiloyannis C., Dichio B., Montonaro G. and Celano G. 1997. Growth and yield in irrigated and non irrigated olive trees cv. Coratina. *Acta Horticulture*, 449: 74-82.
 - 15-Srivatata B.K., Sharma A.K., Singh A.K. and Pandey V.B. 1984. Effects of organic mulches and irrigation levels on soil temperature water economy and yield of summe tomato. *Vegetable Science*, 11: 1-9.
 - 16-Zuccherelli G. and Zuccherelli S. 2002. In vitro propagation of 50 olive cultivars. *Acta Horticulture*, 586: 931-934.