



ارزیابی خسارت سرمای بهاره در تیپ‌های مختلف ارقام بادام و زردآلو

جلیل دژمپور

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۳/۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۲/۲۲

چکیده

سرما و یخیندان بسته به زمان وقوع و مرحله فنولوژیکی درخت خسارات جبران ناپذیری به درختان میوه وارد می‌نماید. بادام (*Prunus armeniaca* L.) و زردآلو (*amygdalus* B.) از زودگل ترین و حساس‌ترین درختان میوه به سرما محسوب می‌شوند. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر سرمازدگی و نوسانات باردهی از سال ۱۳۷۹ روی تیپ‌های مختلف بادام و زردآلو اجرا گردید. در این آزمایش شش رقم بادام خیلی دیرگل (سنه‌ده، شکوفه و آ. ۲۰)، دیرگل (تونو و سوپرنو)، و زودگل (منقا) و شش رقم زردآلو از تیپ‌های مختلف داخلی (اردباد، نصیری و عسکرآباد) و خارجی (کانیتو، رویال و تلتون) انتخاب و برخی از صفات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به سرما در یک دوره ۱۰ ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد خسارت سرما فقط مربوط به سرمازی زیر صفر نبوده و شرایط نامساعد جوی در زمان گلدهی و مکانیسم باروری قرار گرفت. نتایج مستقیم و غیر مستقیم موجب اختلال در فرآیند باروری گل‌ها و تشکیل میوه می‌گردد. ارقام خیلی دیرگل و خودسازگار (SC) بادام نظر سنه‌ده، آ. ۲۰، تونو، سوپرنو و یا ارقام خودسازگار و پرمحصلو زردآلو نظیر کانیتو، رویال و تلتون از ارقامی بودند که کمتر از سرمای بهاره خسارت دیدند و در اکثر سال‌ها از محصول‌دهی عادی برخوردار بودند. در حالی که ارقام زودگل و خودسازگار در اکثر سال‌ها از سرما آسیب دیده بودند. در این پژوهش زمان گلدهی، زمان و مدت خواب فیزیولوژیکی، خودسازگاری گل‌ها، مقاومت به سرماهای زایشی، دوره گرده افسانی موثر (EPP)، طول دوره گلدهی، عکس العمل دمایی جوانه‌های گل از عواملی بودند که بسته به نوع رقم هر یک به شکلی در سرمازدگی و باردهی موثر بودند.

واژه‌های کلیدی: سرما، بخ زدگی، زردآلو، بادام، ارقام

مقدمه

سرماهای زودرس پائیزه و یخیندان‌های شدید زمستان قبل از ورود درختان به خواب فیزیولوژیکی و همچنین نوسانات دمایی و بالا رفتن دما به صورت کوتاه مدت در زمستان موجب خشکیدگی سرشاخه‌ها، ایجاد ترک در پوست تنه و افزایش میزان شانکر در درختان شده و در نهایت موجب ازبین رفتن کل درخت می‌گردد (۶ و ۲۰). سرماهای دیررس بهاره نیز بیشتر از طریق انجام آب میان بافتی و انهدام غشاء سلولی در اندام‌های زایشی گل و میوه‌های تازه تشکیل شده موجب ازبین رفتن محصول می‌گردد. همچنین از طریق اختلال در سامانه گرده افسانی، رشد لوله گرده و کاهش فعالیت زنبور‌های عسل، درصد تشکیل میوه و محصول را به شدت کاهش می‌دهد (۱، ۲ و ۶).

برخی از تغییرات بیوشیمیابی که در ایجاد مقاومت به سرما در گیاهان اتفاق می‌افتد، تغییر در مقادیر اسیدهای آمینه آزاد، میزان پروتئین کل، چربی‌های غیر اشباع، نشاسته، مقادیر RNA، DNA و فسفهای غیرآلی و اسیدهای آلی می‌باشند (۶). در این رابطه گروهی از پژوهشگران عقیده دارند که مقاومت جوانه‌های گل در هلو با

سرمازدگی درختان میوه مناطق معتدل و سردسیر از اساسی‌ترین چالش‌های باغداران در فرآیند تولید بشمار می‌رود و در این میان به جهت زودگل بودن درختان میوه هسته‌دار در اکثر سال‌ها خسارت جبران ناپذیری به تولید کنندگان وارد می‌شود (۶). در منابع برای مبارزه با سرمای دیررس بهاره و سرمازی زودرس پائیزه روش‌های مختلفی ارائه شده که معمولاً با ایجاد تغییرات در میکرو کلیمای باغ یا درخت ممکن بوده است (۶). در چند دهه اخیر با پیشرفت علم اصلاح نبات در برخی گونه‌ها نظیر بادام برای فرار از سرماهای بهاره ارقام دیرگل معرفی شده است. ولی متأسفانه در برخی گونه‌ها نظیر زردآلو این پدیده کمتر بوده و در میان ارقام تفاوت در زمان گلدهی بسیار کم است (۶ و ۹).

سرمای گونه های گیاهی محسوب می شود (۶ و ۱۹). در این پژوهش اثرات سرما در از بین رفتن محصول و ایجاد خسارت در درختان بادام و زردآلو در شرایط باغ و در یک دوره ده ساله بررسی و عوامل بیولوژیکی و فیزیولوژیکی که می توانند در این خصوص تاثیر گذار باشند ارزیابی گردیده است.

مواد و روش‌ها

این بررسی از سال ۱۳۷۹ بر روی اثرات سرمای زمستانه و بهاره بر عملکرد و باردهی ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام و زردآلو در یک دوره ده ساله در باغ کلکسیون بادام و زردآلوی ایستگاه تحقیقات باگبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی اجرا گردید. این ایستگاه در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی تبریز قرار دارد. حداکثر و حداقل دمای اتفاق افتاده به ترتیب -28°C و $+42^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد، متوسط بارندگی سالیانه $250-350$ میلی متر، ارتفاع از سطح دریا 1377 متر و دارای خاک لومی - شنی می باشد. درختان آزمایش هم سن و هم اندازه بوده و شرایط نگهداری و عملیات باگبانی مشابه ای بر آنها حاکم بود. در این مطالعه رقم بادام به نام های سهند، شکوفه و آلو 200 به عنوان ارقام خیلی دیرگل، تونو و سوپرناوا بعنوان ارقام دیرگل و خودسازگار و یک رقم زود گل بنام منقا انتخاب شدند. همچنین 6 رقم زردآلو از تیپ های مختلف داخلی (اربداد، نصیری و عسکرآباد) و خارجی (کانینو، رویال و تلتون) انتخاب و بعنوان ارقام شاخص و تمایز از نظر صفات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با میزان تحمل به سرما و نوسانات باردهی سالیانه مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش صفاتی نظیر، زمان گلدهی، خودسازگاری و خودناسازگاری^۱ (SI) (با استفاده از ایزو لاسیون گلهای تلقیح مصنوعی)، طول دوره گلدهی (مدت زمان لازم از شروع گلدهی تا پایان گلدهی)، عکس المعل دمایی جوانه ها (ثبت مرحله فنولوژیکی با روند باز شدن جوانه گل از مرحله A (جوانه بسته) تا مرحله F (تمام گل)), خواب فیزیولوژیکی (با استفاده از مدل واحد سرمایی یوتا)، دوره گرده افزانی موثر (با استفاده از روش بورگوس و همکاران ۱۹۹۱ و نجاتیان و همکاران ۱۳۸۱) و خسارت سرما به جوانه های گل (با تعیین درصد مادگی های قهقهه ای شده و از بین رفته) مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور تعیین عوامل موثر در تشکیل میوه، باردهی و تحمل به سرما در هر یک از عوامل مذکور به صورت جداگانه بررسی گردید. نمونه گیری برای هر رقم از سه درخت و از هر درخت سه شاخه از جهات مختلف و در هر شاخه 20 نمونه انجام گرفت. هر یک از آزمایشات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا و میانگین ها

میزان قند کل همبستگی دارد با اینکه معمولاً "تحمل جوانه های گل انتهایی شاخه به سرما با کربوهیدرات کل و یا نشاسته همبستگی ندارد (۲۰). ایمانی و طلایی همبستگی مثبت و معنی داری بین میزان پروتئین شکوفه ها و مقاومت آنها به سرما در ژنوتیپ های بادام عنوان نمودند (۱) و چاپلین و لاشین گزارش نمودند که میزان پروتئین بالا، قند بیشتر و اسید های آمینه آزاد با مقاومت جوانه ها همبستگی دارد (۲۰).

در درختان میوه سرما و یخندهان به طرق مختلف بسته به زمان وقوع و مرحله فنولوژیکی درخت خسارت متفاوتی را به درختان و محصول آن وارد می نماید. ارقام مختلف بادام و زردآلو از زودگل ترین و حساس ترین درختان میوه هستند که در بهار از سرما آسیب می بینند (۵ و ۱۰)، نوسانات باردهی و نداشتن عملکرد ثابت در برخی از ارقام بادام و زردآلو از جمله عوارض این پدیده می باشند که تولید این محصولات را با چالش های جدی روبرو ساخته است. عوامل محیطی دیگر نظیر وزش باد و سرما با تأثیر روی فعالیت زنبور عسل و گرده افسانی و خطر سرما از طریق کاهش تعداد جوانه ها، گلهای خسارت آن را بیشتر نمایان می سازد (۲، ۴ و ۷). همچنین باران و رطوبت نسبی بالا می تواند از طریق محدود نمودن گرده افسانی و شیوع بیماری های گل در طول گلدهی اثر نموده و این مشکل را حادتر نماید.

عوامل متعددی نظیر درجه حرارت محیط، کمبود برخی عناصر غذایی مثل ازت، بر (B) و روی (Zn) با تأثیر در زمان پذیرش دانه گرده توسط گل ها و رشد لوله گرده، دوره گرده افسانی موثر (EPP) را تغییر می دهند (۲۰). برخی از پژوهشگران عقیده دارند عدم تأمین نیاز سرمایی جوانه های گل از طریق ریزش جوانه ها، روی عملکرد اثر می گذارد (۸ و ۱۱). این عوامل در اکثر ارقام زردآلو جزو عوامل فیزیولوژیکی هستند که باعث کم باردهی، افت عملکرد و نوسانات باردهی بشمار می آیند (۳ و ۱۷).

در اکثر مناطق بخصوص در ایران نداشتن عملکرد ثابت در تولید میوه یکی از مشکلات اساسی در ارقام بادام و زردآلو می باشد (۳ و ۶). بررسی های متعددی در روی ارقام زردآلو نشان می دهد همبستگی منفی بین محصول دهی و درجه حرارت بالا قبل از گلدهی وجود دارد. بر عکس دمای های پایین قبل از گلدهی با محصول دهی بالا همبستگی مثبتی نشان داده است (۲۵). در جنس پرونوس اطلاعات در این خصوص ضد و نقیض و کم است. با این حال دماهای بالا قبل از گلدهی تشکیل میوه گیلاس را در درختان جوان کاهش می دهد ولی افزایش دما در شاخه های ایزو لوله شده بادام تأثیری در درصد تشکیل میوه نداشت (۱۸ و ۲۵). با توجه به اثر متقابل و پیچیده عوامل فیزیولوژیکی و آب و هوایی در مقاومت به سرمای گیاهان چند ساله و درختان، بررسی های مزروعه ای بعنوان روشنی مطمئن، کاربردی و ساده برای ارزیابی میزان مقاومت به

با آزمون دانکن مقایسه شدند.

دیرگل می باشدند (جدول ۱) نسبت به سرمای بهاره مقاومت نسبی از خود نشان دادند و از عملکرد بالا و باردهی ثابتی برخوردار بودند. به طوریکه در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ علیرغم اینکه در زمان گلهای دما به زیر صفر (-۲-۱) درجه سانتی گراد رسیده بود (جدول ۳) باردهی عادی داشتند. در حالیکه ارقام خیلی دیرگل سهند، آ۲۰۰ و شکوفه باردهی ۲۰-۵۰ درصد و ارقام زودگل منطقه از جمله منقاً صدرصد خسارت دیده و هیچ محصولی نداشتند(جدول ۳ و شکل ۴،۵ و ۶).

بطوریکه در شکل ۱ دیده می شود ارقام سهند شکوفه و تونو عکسل المعل دمایی بسیار کندی داشته و با نوساتات دمایی اواخر اسفند یا اوایل بهار باز شدن گلهای سریع اتفاق نمی افتد ولی ارقامی نظیر منقاً به افزایش دما حساس بوده و سریعاً گلهای به حالت نیمه باز یا تمام گل در می آید. این موضوع بیشتر با نیاز سرمایی و نیاز حرارتی این ارقام مربوط می باشد. بطوریکه در جداول ۱ و ۲ و شکل های ۱ و ۲ دیده می شود مقادیر نیاز سرمایی و نیاز حرارتی ارقام دیرگل بسیار بیشتر از ارقام زودگل است و از طرفی رکود و خواب فیزیولوژیکی ارقام دیرگل طولانی و عمیق است. عبارت دیگر این ارقام دیرتر از مرحله رکود حقیقی خارج شده و دیرتر نیاز حرارتی آنها برای باز شدن گلهای تامین می گردد. در این میان برخی از ارقام نظیر شکوفه استثناء بوده و با وجود رکود کوتاه مدت دیرگل می باشد به نظر سه عامل زیر در دیرگلهای یک چنین ارقام دخیل باشد:

۱- ورود دیروقت به خواب فیزیولوژیکی و در تیجه پایان دیر وقت رکود و به تبع آن زمان گلهای به تاخیر می افتد.

۲- بالا بودن صفر گیاهی در این ارقام که باعث به تاخیر افتادن تامین نیاز حرارتی و زمان گلهای می گردد.

۳- عکسل العمل بسیار کند جوانه های گل به دماهای بالا که تاخیر در باز شدن گلهای را باعث می شود

در خصوص ارقام زودگل نظیر منقاً رکود بسیار سطحی و کوتاه مدت بوده و دارای نیاز حرارتی کمتری می باشند. بنابراین تنها عامل باز دارنده باز شدن گلهای در این ارقام پایین بودن دمای محیط از صفرگیاهی آنهاست که در تقسیم بندی رکود ار آن بعنوان رکود تحمیلی یاد می شود. بدین جهت در صورت مساعد بودن شرایط محیطی حتی در آیان و آذر ماه نیز گل می دهنند.

مقایسه درصد گلهای سالم و درصد تشکیل میوه در شکل های ۴،۵ و ۷ بیانگر این نکته است که با وجود اینکه در ارقامی نظیر سهند و آ۲۰۰ درصد گلهای سالم با ارقام تونو و سوپرنوا اختلاف معنی دار است، با این وجود اگر شرایط مساعد گرده افشاری و رشد لوله گرده فراهم باشد اصولاً "نایاب در تشکیل میوه کاهش معنی داری رخ می داد، ولی مقایسه ارقام خودسازگار و خودناسازگار نشان

نتایج و بحث

ارزیابی شاخص های انتخاب شده در این پژوهش نشان داد تفاوت بسیار فاحشی در مقاومت به سرما و اثرات سرمایی در باردهی ارقام تحت مطالعه بدام و زردآلو وجود دارد. ارقامی نظیر سهند و سوپرنوا به ترتیب با ۴۴۲ و ۴۰۰ واحد سرمایی^۱ (C.U.) و با ۸۲۰۰ درجه ساعات رشد^۲ (G.D.H.) بالاترین نیاز سرمایی و مجموعه حرارتی داشتند. همچنین این ارقام با دارا بودن دوره گلهای طولانی (جدول ۱ و ۲) و عکس العمل دمایی کند (شکل ۱) غالباً از خطر سرمایی بهاره در امان بودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ارقام خودسازگار نظیر تونو، سوپرنوا، کانینو، رویال و تلتون که مشکل دگرگرده افشاری نداشته و از EPP بالاتری برخوردار بودند نیز کمتر مشکل سرمادگی بهاره دارند. در خصوص سرمایهای زودرس پائیزه نتایج نشان داد مقاومت به سرمای پائیزه در ارقام تقریباً یکسان بوده و در یک دوره ده ساله خسارت قابل توجهی در درختان مشاهده نشد. به استثنای بدام رقم شکوفه که به جهت خزان دیرتر و آغاز دیر هنگام خواب فیزیولوژیکی و رکود در سال هایی که سرمای زودرس پائیزه شدید بود (سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳) شاخه های ضعیف و سرشاخه ها در برخی مناطق استان آسیب دیده و گاهی موجب خشکیدگی آنها می گردد (شکل ۲).

خدمات ناشی از یخنдан های زمستانه بیشتر زمانی قابل توجه بود که دما به زیر -۲۰ درجه سانی گراد رسیده باشد در این سال ها "معمولًا" پوست تنہ درختان، سرشاخه ها، شاخه های ضعیف و نیمه خشبي آسیب دیده (نظیر بدام رقم شکوفه و زردآلی قرمز شاهزاد و در برخی ارقام ریزش جوانه های گل (نظیر بدام رقم یلدا) اتفاق می افتد. در خسارت زمستانه درختان نوسانات دمایی و از بین رفتن مقاومت بافت، تغذیه گیاهی، توقف آبیاری و القای رشد رویشی (دادن رکود ازته و آبیاری) در آخر فصل زراعی در ایجاد خسارت بسیار موثر بود.

در بررسی اثرات سرمایی دیررس بهاره روی درختان بدام و زردآلو نتایج نشان داد که عوامل بسیار متعددی در ایجاد خسارت و کاهش باردهی و از بین رفتن محصول در اوایل بهار دخیل هستند. این امر بطور مستقیم یا غیر مستقیم متأثر از سرمادگی اعضاء زایشی گل و سایر عوامل نامساعد جوی نظیر بادهای سرد، بارندگی، رطوبت بالا و هوای سرد در زمان گلهای بخصوص در زمان گرده افشاری می باشند (جدول ۳). ارقام بدام تونو و سوپرنوا که جزو ارقام خودسازگار و

1- Chill Unit

2- Growth Degree Hours

شکل ۸ درصد تشکیل میوه در صفر تا ۸ روز پس از آمادگی پذیرش مادگی، دوره گرده افشاری موثر را برای زرداًلو و بادام نشان می دهد. در مورد زرداًلو نصیری بعنوان رقم داخلی و خودناسازگار از EPP (دوره گرده افشاری موثر) کمتری در مقایسه با رقم کانینو بعنوان رقم خارجی و خودسازگار برخوردار می باشد. در مورد بادام ارقام منقأ، سهند بعنوان ارقام داخلی خودناسازگار نیز دارای EPP مقایسه با توتو بعنوان خارجی و خودسازگار می باشند.


می دهد دو تیپ مختلف در درصد تشکیل میوه باهم اختلاف معنی داری (در سطح احتمال ۵٪) دارد. همچنین این موضوع در مورد زرداًلو رقم عسکرآباد در مقایسه با ارقام کانینو و رویال صادق است. بنابراین بخوبی مشخص می گردد که علاوه بر مقاومت جوانه های گل به سرما ی بهاره، مساعد نبودن شرایط گرده افشاری و رشد لوله گرده بدليل سرد بودن هوا و کاهش فعالیت زنبور عسل می تواند از عوامل بسیار مهم در از دست رفتن محصول در اکثر سال ها می باشد.

جدول ۱- برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی ارقام تجاری داخلی و خارجی بادام


رقم	زمان گلدهی	باروری	نیاز سرمایی (C.U.)	نیاز حرارتی (G.D.H.)	طول دوره گلدهی (روز)
سهند	خیلی دیرگل	خودناسازگار	۴۴۲	۸۲۰۰	۱۲
توتو	خیلی دیرگل	خودناسازگار	۳۴۷	۷۵۰۰	۱۲
منقا	دیرگل	خودناسازگار	۲۲۵	۵۵۰۰	۱۰
رویال	زودگل	خودناسازگار	۷۰	۴۵۰۰	۳
شکوفه	دیرگل	خودناسازگار	۳۷۰	۸۰۰۰	۸
کانینو	دیرگل	خودسازگار	۴۰۰	۸۲۰۰	۸
سوپر نوا	دیرگل	خودسازگار			

جدول ۲- برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی ارقام تجاری داخلی و خارجی زرداًلو


رقم	زمان گلدهی	باروری	نیاز سرمایی (C.U.)	نیاز حرارتی (G.D.H.)	طول دوره گلدهی (روز)
نصیری	میان گل	خودناسازگار	۸۲۰	۳۵۰۰	۴-۵
اردباد	میان گل	خودناسازگار	۹۰۰	۳۳۰۰	۴-۵
عسکر آباد	میان گل	خودناسازگار	-	-	۴
رویال	میان گل	خودسازگار	۷۱۰	۳۲۰۰	۵
تلتون	میان گل	خودسازگار	۶۷۰	۳۸۰۰	۵
کانینو	میان گل	خودسازگار	۶۵۰	۴۱۰۰	۵




شکل ۱- عکس العمل دمایی جوانه های گل چند رقم بادام تجاری در اوایل بهار




شکل ۲- زمان ورود و خروج از خواب فیزیولوژیکی در ارقام بادام




شکل ۳- زمان ورود و خروج از خواب فیزیولوژیکی در ارقام زردالو




شکل ۴- میانگین درصد گلهای سالم در ارقام مختلف بادام در سالهای ۱۳۸۸ (راست) و ۱۳۸۹ (چپ)



شکل ۵- میانگین درصد گل های سالم در ارقام مختلف زردآلو در سال ۱۳۸۹




شکل ۶- میانگین درصد تشکیل میوه در ارقام مختلف بادام در سال های ۱۳۸۸ (چپ) و ۱۳۸۹ (راست)



شکل ۷- میانگین درصد تشکیل میوه در ارقام مختلف زردآلو در سال ۱۳۸۹

ارقام کاتینو و تونو از درصد تشکیل میوه بیشتر و EPP بالاتر برخوردار بودند. نجاتیان و همکاران (۱۳۸۱) مشابه این نتایج را در ارقام زردآلو گزارش نمودند و اظهار نمودند در ارقام تحت مطالعه خود پذیرش مادگی برای گرده افشاری در روزهای ۲ و ۴ بعد از بلوغ گلها بیشتر از روزهای صفر بود و پس از روز ۴ کاهش شدید درصد تشکیل میوه اتفاق می افتد (۷).

بطوریکه در شکل ۸ بخوبی دیده می شود درصد تشکیل میوه بالا، نوسانات باردهی کمتر و نهایتاً حساسیت کمتر به سرما در زمان گلدهی و لفاح می تواند به طولانی بودن دوره گرده افشاری موثر، رقم کاتینو و رقم تونو مربوط باشد. بیشترین میوه بندی برای کاتینو در روزهای ۲ و ۴، برای نصیری روز دوم، برای تونو روز چهارم و برای سهند و منقا روز ۲ و ۴ بود. بطوری که با سایر روز های آزمایش شده دارای اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد می باشد. در کل



شکل ۸- درصد تشکیل میوه در روز های صفر، ۲، ۴، ۶ و ۸ پس از مرحله پاپ کورن در برخی ارقام زردالو (چپ) و بادام (راست)

بومی نظیر اردباد، نصیری و منقا در سرمایهای نزدیک به صفر خسارت دیده و به دلیل خودناسازگار بودن و دوره گرده افشاری موثر پائین و حساسیت اعضای زایشی گل به سرما از نوسانات و بی نظمی باردهی سالیانه برخوردار بودند. بنابراین در مقابله به سرما علاوه بر استفاده از روش های مختلف زراعی و محافظتی (که معمولاً هزینه بر و مشکل است) بهترین روش در درختان میوه اصلاح ژنتیکی نبات و معروف ارقام مقاوم به سرما، دیرگل، خودبارور و انتخاب محل مناسب است.

اکثر ارقام بادام و زردالو موجود در ایران به جهت خودناسازگاری برای تولیدمحصول نیاز به ارقام گرده دهنده و دگرگرده افشاری دارد (جدول ۱ و ۲) که این عمل ۹۰٪ توسط زنبور عسل صورت می گیرد (۱۲ و ۱۶). زمان گلدهی در اوایل بهار غالباً مصادف است با شرایط نامساعد آب و هوایی که دگرگرده افشاری و تشکیل میوه را دچار اختلال می نمایند در صورتی که دوره گرده افشاری موثر بیشتر و رقم خودناسازگار باشد این مشکل کمتر بروز می نماید (۱۲).

بررسی ده ساله اطلاعات هواشناسی منطقه و نوسانات باردهی ارقام نشان می دهد که عوامل زیادی در گرده افشاری و عدم تشکیل میوه دخالت داشته و تنها سرمایهای زیر صفر عامل از بین رفتن محصول نمی باشد (جدول ۳)، از دیگر عوامل جوی که بسیار موثر در صد تشکیل میوه و باردهی بودند عبارتند از:

- وزش بادهای شدید که باعث اختلال در فعالیت زنبور عسل و پایین آمدن دما و خشک شدن کالاهه می شود.

- بارندگی و بالا بودن میزان رطوبت هوا که باعث عدم جوانه زنی دانه گرده و کاهش فعالیت زنبور عسل می شود.
- سرد بودن هوا و کاهش جوانه زنی دانه گرده و کند شدن رشد لوله گرده (دمایی در فصل گلدهی و از بین رفتن مقاومت به سرمای اندام ها).

نتایج این پژوهش نشان می دهد سرمای شدید زیر صفر در فصل

ارقام خودناسازگار نظیر تونو و سوپرنوا علیرغم اینکه ۷-۵ روز زودتر از ارقام شکوفه و سهند گل می دهند (جدول ۱) با این وجود متتحمل به سرما بوده و کمتر از سرمای بهاره خسارت می بینند. با اینکه مکانیسم های مقاومت در گیاهان بسیار متفاوت می باشد اما در این پژوهش اختلاف در نوسانات باردهی سالیانه در میان ارقام خودناسازگاری، دوره گرده افشاری موثر، زمان گلدهی و مقاومت اندامهای زایشی این ارقام مربوط بود. در این رابطه بورگوس و همکاران (۱۴)، آله و بورگوس (۱۸)، نجاتیان و همکاران (۲) در موردارقام باردهی را در موردارقام زردالو و گودینی و همکاران (۲) در موردارقام بادام به این عوامل ربط دادند.

در مورد زردالو ارقام دیرگل حداقل در ایران تا حال شناسایی نشده است به طوریکه در میان ارقام داخلی و خارجی و دیگر ژنتیک های موجود در کشور و منطقه حداقل گلدهی در بین ارقام ۴-۵ روز بود و این تفاوت در سالهای مختلف ثابت نبوده و از سالی به سال دیگر فرق می نماید (۵). با این حال علیرغم وجود زمان گلدهی مشابه در میان ارقام برخی نظیر کانینو، رویال، تلتون کافونا، سان کاستریز (ارقام جدید وارداتی) از ارقام اروپایی و خودناسازگار و رقم عسگرآباد از ارقام داخلی نسبت به سرمای بهاره و شرایط نامساعد جوی که عامل بازدارنده دگرگرده افشاری، رشد لوله گرده و تشکیل میوه هستند، مقاوم بوده و از نوسانات باردهی سالانه کمتری برخورد بودند و از عملکرد بیشتری برخورد هستند. میدی و همکاران (۱۳۸۴) اختلاف ارقام در تحمل به سرمیلی اعضای زایشی را به عوامل بیولوژیکی نظیر غلظت بالای قدها، قابلیت افزایش اسید آمینه پرولین و پایین بودن آب میان بافتی اعضاء زایشی ربط دادند (۶). ایمانی و طلایی (۱۳۷۶) بین میزان پروتئین موجود در بافت جوانه های گل و تحمل به سرما همبستگی مثبتی را گزارش نمودند (۱). ارزیابی ده ساله نشان داد (جدول ۳) ارقام متتحمل به سرما فقط در سال هایی خسارت دیدند که درجه حرارت در زمان شکوفه دهی و نمو میوه پایین تر از ۲ درجه سانتی گراد بود. در حالیکه اکثر ارقام

خسارت صدرصد می بینند. در حالیکه با بکارگیری ارقام اصلاح شده و متحمل به سرما در توسعه باغات درختان بادام و زردآلو که معمولاً از دو ویژگی بسیار مهم فیزیولوژیکی، خودسازگاری و دیرگلی نیز برخوردار هستند می توان خسارت سرمادگی را به یک چهارم کاهش داد. ارقام جدید خارجی و دورگ های ایجاد شده با این خصوصیت هم اکنون در کشور موجود بوده و در حال معرفی می باشند و تولید کنندگان و باغداران می توانند در توسعه باغات از یک چنین ارقامی استفاده نمایند. همچنین می توان در برنامه های اصلاحی بمنظور تولید دورگ های متحمل به سرما با عتمدید بالا از ارقام مذکور بعنوان والد استفاده نمود. با این تفاسیر توصیه می شود در درختان میوه بخصوص در مورد بادام و زردآلو جهت مبارزه با سرمادگی در وهله اول از ارقام مقاوم و در کنار آن از سایر روش های باگی و محافظتی استفاده گردد.

گلدهی که عامل محدود کننده محصول باشد معمولاً "کمتر اتفاق افتاده و عامل اصلی ار بین رفتن محصول نمی باشد بلکه خسارت و کاهش عملکرد غالباً" در اثر بروز شرایط نامساعد جوی در زمان گرده افشاری است که از طریق ایجاد اختلال در گرده افشاری، تلقیح و کاهش تشکیل میوه است که در مورد ارقام خودسازگار حداقل و در مورد ارقام خودسازگار حداقل می باشد(۲۱ و ۲۲).

جدول ۳ بخوبی نشان می دهد که سرما و شرایط نامساعد آب و هوایی در یک دوره ده ساله محصول ارقام بومی بادام و زردآلو را بیش از ۴ سال یعنی تقریباً هر یک سال در میان از بین برد و لی در مورد ارقام اصلاح شده فقط یک سال برای بادام و دو سال برای زردآلو خسارت اقتصادی وارد شده است. بعبارت دیگر در سالهای که در زمان گلدهی درجه حرارت زیر صفر بوده و یا در زمان گرده افشاری شرایط جوی نامساعد بود کلیه باغداران به جهت استفاده از ارقام و زنوتیپ های بومی که غالباً زود گل و خودسازگار می باشند

جدول ۳- خسارات ناشی از سرمای بهاره و نوسانات باردهی ده ساله ارقام بادام و زردآلو

میزان باردهی		زادگل				شرط نامساعد جوی در زمان گلدهی (°C)	حداقل دما در زمان گلدهی	سال	ردیف
زردآلو	SC	SC	SI	دیرگل	بادام				
نرمال*	.	-	-	%۷۰	.	+	صفرا	۱۳۸۰	۱
نرمال	.	-	-	%۵۰	۰	+	صفرا	۱۳۸۱	۲
نرمال	نرمال	-	-	نرمال	نرمال	-	+۳	۱۳۸۲	۳
.	.	%۵۰	%۵۰	%۲۰	۰	+	-۱/۵	۱۳۸۳	۴
نرمال	نرمال	نرمال	نرمال	نرمال	نرمال	-	+۲	۱۳۸۴	۵
نرمال	نرمال	نرمال	نرمال	نرمال	نرمال	-	+۱	۱۳۸۵	۶
نرمال	نرمال	%۷۰	نرمال	%۵۰	نرمال	+	صفرا	۱۳۸۶	۷
نرمال	نرمال	.	نرمال	نرمال	نرمال	-	+۴	۱۳۸۷	۸
.	.	نرمال	%۳۰-۲۰	۰	نرمال	+	-۲	۱۳۸۸	۹
نرمال	.	نرمال	%۵۰-۳۰	۰	نرمال	+	-۰/۵	۱۳۸۹	۱۰

*منظور از نرمال، مقدار باردهی است که برای میانگین چند ساله آن ارقام ثبت شده است

منابع

- ایمانی ع. و طلایی ع. ۱۳۷۶. بررسی نقش پروتئین در افزایش مقاومت شکوفه های بادام به سرما بهاره، مجله نهال و بذر، جلد ۱۳ شماره ۳.
- Rahimi M. ۱۳۷۵. گرده افشاری و تشکیل میوه، انتشارات دانشگاه شیراز.
- دزم پور ج. ۱۳۸۰. تعیین نیاز دمایی در چند رقم تجاری زردآلو در تبریز. مجله نهال و بذر. جلد ۱۷. شماره ۱.
- دزم پور ج، رهنمون ح و گریکوریان و. ۱۳۸۲. بررسی برخی عوامل موثر در سازگاری کلیمایی ارقام تجاری بادام. مجموعه مقالات اولین همایش ملی خشکبار کشور.
- دزم پور ج. و رهنمون ح. ۱۳۸۸. خصوصیات میوه واریته های زردآلوی موجود در ایران، نشر آموزش کشاورزی.
- میبدی م. محمد ع. و ترکش اصفهانی س. ۱۳۸۴. حفاظت مزارع و باغ های میوه در برابر سرمادگی، مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمادگی، انتشارات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد.
- نجاتیان، م. ۱۳۸۱. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام زردآلو. رساله دوره دکتری علوم باگبانی. دانشگاه تربیت مدرس.

- 8- Acka, Y., and Sen S. M. 1999. Studies on selection of apricot with food fruit quality and resistance to late spring in Genas Plain. *Acta Horticulturae*. 488: 135 – 137.
- 9- Alburquerque, N., Burgos L. and Egea J. 2003. Apricot flower bud development and abscission related to chilling, irrigation and type of shoots. *Scientia Horticulturae*. 98: 265 – 276.
- 10- Bailey G. H. and Hough L. F. 1996. Apricots. In: *Advances in fruit breeding*. (Janick, J. and J. N. Moore, Eds.). Purdue University Press, West Lafayette, Indiana. USA. 367 – 383.
- 11- Bassi, D., Andalo G., Bartolozzi F., Gulcan R. and Aksoy U. 1995. Tolerance of apricot to winter temprature fluctuation and spring frost in Northerb Italy. *Acta Horticulturae*. 384: 315 – 321.
- 12- Benedek, P., Nyeki J., Szabo Z., Gulcan R. and Aksoy U. 1995. Bee pollination of apricot: variety features affecting bee activity. *Acta Horticulturae*. 384: 329 – 332.
- 13- Bolat, I. and Lutfi P. 1999. Effects of some chemical substances on pollen germination and tube growth in apricot. *Acta Hort.* 488: 341 – 343.
- 14- Burgos, L., Egea J. and Dicenta F. 1991b. Effecrve pollination period in apricot (*Prunus armeniaca L.*) varieties. *Annals of Applied Biology*. 119 (3): 533 – 539.
- 15- Burgos, L. and Egea J. 1993. Apricot embryo – sac development in relation to fruit set. *Journal of Horticultural Science*. 68: 203 – 208.
- 16- Burgos, L. and Perez – Tornero O. 1999. Review of self – incompatibility in apricot. *Acta Horticulturae*. 488: 267 – 271.
- 17- Dejampour, J., and Grigorian V. 2000. Assessing the dormancy characteristics of some commercial almond cultivars for different climates, Iran Agricultural research, Vol. 19. No, 2.
- 18- Egea, J and Burgos L. 1992. Effective pollination period as related to stigma receptivity in apricot. *Scientia Horticulturae*.
- 19- Egea, J and Burgos L. 1994. Year - to - year variation in the development stage of the embryo sac at anthesis in flowers of apricot. *Journal of Horticultural Science*. 69 (2): 315 – 318.
- 20- Faust, M. 1989. *Physiology of temprate – zone fruit trees*. John Wiley and Sons. New York. USA. 388 p.
- 21- Lillecrapp, A. M., Wallwotk M. A. and Sedgley M. 1999. Female and male sterility cause low fruit set in a clone of 'Trevatt' variety of apricot (*Prunus armeniaca*). *Scientia Horticulturae*. 82: 255 – 263.
- 22- McLaren, G. F., Fraser J. A. and Grant J. E. 1992. Pollination of apricots. *Orchardist of New Zealand*. 65 (8): 22 – 23.
- 23- Rodrigo, J. and Herrero M. 1996. Evaluation of pollination as the cause of erratic fruit set in apricot 'Moniqui'. *Journal of Horticultural Science*. 71: 801 – 805.
- 24- Rodrigo, J. and Herrero M. 2001. Effects of pre – blossom temperatures on flower development and fruit set in apricot. *Scientia Horticulturae*. 92: 125 – 135.
- 25- Martinez-Gomez, P., Dandekar, A.M., Lopez, M., Batlle, I., and Gradziel, T.M. 2003. Identification of self-incompatibility Alleles in almond and related *Prunus* species using PCR. *Proc. XXVI IHC. Genetics and Breeding of Tree Fruit and Nuts*. 211: 461-464.